CS

Karta pacienta

WELIREG® ▼ (belzutifan)

70123231/00-1/5331

- Neužívejte přípravek WELIREG na von Hippelovu-Lindauovu chorobu, pokud jste těhotná.
- Pokud jste těhotná a potřebujete léčbu karcinomu ledviny, poraďte se o užívání přípravku WELIREG se svým lékařem.
- Přípravek WELIREG může poškodit dítě a může vést k potratu. Pokud jste těhotná, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat.

SK

Karta pacienta

WELIREG® ▼ (belzutifan)

- Neužívajte WELIREG na von Hippel-Lindauovu chorobu, ak ste tehotná.
- Ak ste tehotná a potrebujete liečbu pre karcinóm z renálnych buniek (renal cell carcinoma, RCC), porozprávajte sa o použití WELIREGU so svojím lekárom.
- WELIREG môže ublížiť dieťaťu a môže spôsobiť spontánny potrat. Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek.

SL

Kartica za bolnico

WELIREG® ▼ (belzutifan)

- Če ste noseči, ne jemljite zdravila WELIREG za zdravljenje von Hippel-Lindauove bolezni.
- Če ste noseči in potrebujete zdravljenje proti raku ledvičnih celic, se o uporabi zdravila WELIREG posvetujte z zdravnikom.
- Zdravilo WELIREG lahko škoduje otroku in lahko povzroči splav. Če ste noseči, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo.

- Před tím, než začnete přípravek WELIREG užívat, provede u Vás lékař těhotenský test.
- Během užívání přípravku WELIREG nesmíte otěhotnět.

Kontrola početí (antikoncepce)

- Pokud jste žena, která může otěhotnět:
  - Antikoncepce obsahující hormony – jako jsou antikoncepční pilulky, injekce nebo transdermální náplasti – nemusí během užívání přípravku WELIREG tak dobře fungovat.
  - Během užívání přípravku WELIREG a po dobu nejméně 1 týdne po poslední dávce máte:
    - používat účinnou formu nehormonální kontroly početí (antikoncepce) nebo
    - přesvědčit svého partnera, aby používal kondom.
- Poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem o metodách antikoncepce, které pro Vás mohou být vhodné během užívání přípravku WELIREG.
- Okamžitě informujte svého lékaře, pokud otěhotníte nebo si myslíte, že jste mohla otěhotnět během léčby.

Další informace naleznete v příbalové informaci přípravku WELIREG obsahující informace pro pacienta.

Důležité kontaktní údaje

Jméno lékaře _____

Telefon do ordinace _____

Telefon mimo pracovní dobu _____

Moje jméno _____

- Váš lekár vám urobí tehotenský test predtým, ako začnete užívať WELIREG.
- Počas užívania WELIREGU nesmiete otehotnieť.

Kontrola počatia (antikoncepcia)

- Ak ste žena v plodnom veku:
  - metódy kontroly počatia, ktoré obsahujú hormóny – ako sú antikoncepčné tablety, injekcie alebo transdermálne (kožné) náplaste – nemusia počas užívania WELIREGU dostatočne účinkovať;
  - počas užívania WELIREGU a minimálne po dobu 1 týždňa po vašej poslednej dávke musíte:
    - používať účinnú formu nehormonálnej kontroly počatia (antikoncepcia) alebo
    - zaistiť, aby váš mužský partner používal prezervatív.
- Porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom o metódach kontroly počatia, ktoré pre vás môžu byť vhodné počas užívania WELIREGU.
- Ak počas liečby otehotniete alebo si myslíte, že ste mohli otehotnieť, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

Viac informácií nájdete v písomnej informácii pre používateľa WELIREGU obsahujúcej informácie pre pacienta.

Dôležité kontaktné informácie

Meno lekára _____

Tel. č. do ambulancie _____

Tel. č. mimo ordinačných hodín _____

Moje meno _____

MSD

- Zdravnik bo opravil test nosečnosti, preden boste začeli jemati zdravilo WELIREG.
- Med jemanjem zdravila WELIREG ne smete zanositi.

Kontracepcija

- Če ste ženska, ki bi lahko zanosila:
  - kontracepcijske metode, ki vsebujejo hormone – kot so kontracepcijske tablete, injekcije ali transdermalni obliži – morda ne bodo tako učinkovite med jemanjem zdravila WELIREG.
  - med jemanjem zdravila WELIREG in vsaj še 1 teden po zadnjem odmerku:
    - morate uporabljati učinkovito metodo nehormonske kontracepcije ali pa
    - mora vaš moški partner uporabljati kondom.
- Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom o kontracepcijskih metodah, ki bi lahko bile primerne za vas med jemanjem zdravila WELIREG.
- Takoj obvestite zdravnika, če zanosite ali menite, da ste med zdravljenjem morda zanosili.

Za več informacij preberite Navodilo za uporabo zdravila WELIREG, ki vsebuje informacije za bolnika.

Pomembno Kontaktni podatki

Ime zdravnika _____

Službena telefonska številka _____

Telefonska številka izven delovnega časa _____

Moje ime_____

MSD