


Rekonštitúcia bortezomibu 3,5 mg prášok na injekčný roztok injekčné liekovky na subkutánne (SC) alebo intravenózne (IV) použitie



- Objem rozpúšťadla použitého na rekonštitúciu bortezomibu pri SC podaní je rozdielny ako objem rozpúšťadla použitý pri IV podaní. V dôsledku rozdielnych pridaných objemov sa koncentrácia liečiva vo výslednom roztoku líši.
- Bortezomib musí byť rekonštituovaný zdravotníckym pracovníkom za prísneho dodržania aseptických techník, pretože liek neobsahuje žiadnu konzervačnú látku.
- Rekonštituovaný roztok sa má použiť hneď po príprave. Chemická a fyzikálna stabilita rekonštituovaného roztoku počas používania bola preukázaná počas 8 hodín pri teplote 25°C a relatívnej vlhkosti 60 % na tmavom mieste pri uchovávaní v injekčnej liekovke a polypropylénovej injekčnej striekačke.
- Aby sa vyhol nesprávnemu podaniu, injekčné striekačky pre SC podanie majú byť označené iným spôsobom ako pre IV podanie.*
- **Len na SC alebo IV použitie. Nepodávajte inými spôsobmi.**
- Akékoľvek nežiaduce udalosti zistené počas podávania bortezomibu sa musia okamžite nahlásiť.

*Označenie (nálepky) nie sú súčasťou balenia lieku Bortezomib Sandoz