

Pravítko na výpočet dávky


Edukačný materiál pre Bortezomib Sandoz podľa EU RMP verzia 3.0

SANDOZ A Novartis
Division


POKYNY:

Nastavte telesnú hmotnosť a výšku v príslušných jednotkách.

Odčítajte príslušnú plochu povrchu tela (BSA) pod šípkou ▼



Plocha povrchu tela
BSA (m²)



Podľa vzorca Dubois a Dubois,
Arch Intern Med 1916;17:863

Tabuľka 1: Rekonštitúcia bortezomibu

subkutánna injekcia (SC)		intravenózna injekcia (IV)	
Pridať 1,4 ml 0,9% NaCl	2,5 mg/ml finálna koncentrácia	Pridať 3,5 ml 0,9% NaCl	1 mg/ml finálna koncentrácia
Informácia pre lekára na zadnej strane			

Len na subkutánne alebo intravenózne použitie. Nepodávajte inými spôsobmi (Intratekálne podanie vedie k úmrtiu).

Spôsob podávania

IV podávanie:

Rekonštituovaný roztok sa podáva ako 3 – 5 sekundový bolus intravenózne cez periférny alebo centrálny intravenózný katéter s následným preplachom katétra so sterilným 9 mg/ml (0,9 %) roztokom chloridu sodného.

SC podávanie:

Rekonštituovaný roztok sa podáva subkutánne do stehna (pravé alebo ľavé, proximálna a distálna časť) alebo do brušnej steny (vpravo alebo vľavo, horný alebo dolný kvadrant). Miesta sa majú pri každom podaní striedať.

Tabuľka 2: Vzor podávaných objemov

BSA m ²	Dávka (1,3 mg/m ²)	Objem pre IV podanie (ml)	Objem pre SC podanie (ml)
1,5	1,95	1,95	0,78
1,6	2,08	2,08	0,83
1,7	2,21	2,21	0,88
1,8	2,34	2,34	0,94
1,9	2,47	2,47	0,99
2,0	2,60	2,60	1,04
2,1	2,73	2,73	1,09

Dátum prípravy materiálu: december 2018, číslo materiálu: 1090654_12_2018_OHO, exspirácia materiálu: december 2019

SANDOZ d.d. – organizačná zložka, Žižkova 22B, 811 02 Bratislava, tel.: 02/50 706 111

Schválené ŠUKL: dňa 27. 12. 2018