



Edukačný materiál pre užívateľku Afternor 1,5 mg tablety

- 1/ **AKO UŽÍVAŤ:** Užite tabletu čo najskôr po nechránenom pohlavnom styku, avšak nie neskôr ako 72 hodín po! Čím skôr ju užijete, tým je Afternor účinnejší!
Ak do 3 hodín od užitia tablety vraciate alebo máte hnačku, užite ďalšiu tabletu.
Po užití Afternoru je potrebné do začatia ďalšieho menštruačného cyklu používať metódu bariérovej antikoncepcie (kondóm). Afternor nebude účinkovať, pokiaľ budete mať opakovane nechránený pohlavný styk pred začatím nasledujúceho cyklu. Ak pravidelne užívate antikoncepciu, môžete v jej užívaní pokračovať podľa rozpisu.

- 2/ **OPAKOVANÉ PODÁVANIE:** Afternor je núdzová antikoncepcia, ktorá sa užíva iba vo výnimočných prípadoch. Opakované podávanie sa neodporúča. Afternor je menej účinný ako iné dlhodobé metódy antikoncepcie a opakované podávanie počas toho istého menštruačného cyklu môže viesť k poruchám menštruačného cyklu. Ak potrebujete dlhodobú metódu antikoncepcie, poraďte sa so svojím gynekológom.

- 3/ **POD DOHĽADOM LEKÁRA BY STE MALI AFTERNOR UŽÍVAŤ ak:**
 - ste mladšia ako 16 rokov,
 - užívate lieky, ktoré môžu ovplyvniť účinnosť Afternoru (napr. barbituráty, ľubovník bodkovaný, cyklosporín, antiepileptické lieky, lieky proti TBC, antimykotické lieky a lieky proti HIV),
 - máte ochorenie pečene alebo čriev,
 - ste niekedy mali mimomaternicové tehotenstvo alebo zápal vajcovodov,
 - ste mali nechránený pohlavný styk pred viac ako 72 hodinami,
 - si myslíte, že by ste už mohli byť tehotná.

Adamed Slovakia s.r.o.

Dúbravská cesta 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves, Slovakia

Tel.: +421 254 651 005 • Fax: +421 254 791 1190

IČ: 35836385

e-mail: Adamed.sk@adamed.com.pl

www.adamed.com.pl/sk





- 4/ NEUŽÍVAJTE Afternor, ak už ste tehotná alebo ak ste niekedy mali alergickú reakciu na levonorgestrel (účinná zložka Afternoru) alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek, uvedených v písomnej informácii pre používateľku. V takýchto prípadoch sa poraďte so svojim gynekológom.
- 5/ MOŽNÉ VEDĽAJŠIE ÚČINKY: Keď užijete Afternor, môže sa dostaviť nevoľnosť, citlivosť prsníkov, bolesť hlavy, bolesť brucha a únava. Tieto vedľajšie účinky počas niekoľkých dní vymiznú. Pri ďalšom menštruačnom cykle môže dôjsť k nepravidelnému krvácaniu alebo špineniu. Po užití levonorgestrelu sú menštruačné cykly zvyčajne normálne a začínajú v predpokladaný deň. Niekedy sa môžu dostaviť o niekoľko dní skôr alebo neskôr než sa očakáva. Ak sa Váš cyklus začne o viac ako 5 dní neskôr, než ste očakávali, alebo v tom čase dôjde k nezvyčajne slabému alebo nezvyčajne silnému krvácaniu, alebo ak si myslíte, že ste tehotná, bezodkladne kontaktujte svojho gynekológa.

Podozrenia na vedľajšie účinky majú byť hlásené Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv (podrobnosti o vedľajších účinkoch, vrátane formulára na ich hlásenie nájdete na webovej stránke ústavu – www.sukl.sk).

- 6/ **Afternor nechráni pred pohlavne prenosnými chorobami, na ochranu pred pohlavne prenosnými chorobami použite kondóm.**

Držiteľ registračného rozhodnutia: Adamed Czech Republic s.r.o., Thámová 137/16, 186 00 Praha 8 – Karlín, Česká republika.

Pre ďalšie informácie môžete kontaktovať:

Adamed Slovakia s.r.o., Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava - Karlova Ves
tel.: +421 914 182 603
e-mail: vaclav.kosek@adamed.com.pl

S úctou

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "A. Kassayová".

Ing. Andrea Kassayová
Regulatory Affairs Manager

Adamed Slovakia s.r.o.

Dúbravská cesta 2, 841 04, Bratislava - Karlova Ves, Slovakia

Tel.: +421 254 651 005 • Fax: +421 254 791 1190

IČ: 35836385

e-mail: Adamed.sk@adamed.com.pl

www.adamed.com.pl/sk

