

Pripomenutie požadovaných krvných testov

Zapamätajte si

Pri užívaní Agomelatínu Stada je dôležité, aby ste absolvovali pravidelne krvné testy.

Tabuľka nižšie vám pomôže sledovať požadované termíny na krvné testy.

Agomelatín Stada 25 mg - Dátum prvého užitia:	
Termíny na krvné testy pečeňových enzýmov	Dátum
1. test (na začiatku liečby)	
2. test (po približne 3 týždňoch liečby)	
3. test (po približne 6 týždňoch liečby)	
4. test (po približne 3 mesiacoch liečby)	
5. test (po približne 6 mesiacoch liečby)	
Zvýšenie dávky na 50 mg - Dátum prvého užitia:	
Termíny na krvné testy pečeňových enzýmov	Dátum
1. test (na začiatku liečby 50 mg)	
2. test (po približne 3 týždňoch liečby)	
3. test (po približne 6 týždňoch liečby)	
4. test (po približne 3 mesiacoch liečby)	
5. test (po približne 6 mesiacoch liečby)	

Váš lekár sa môže rozhodnúť vykonať ďalšie krvné testy. Nezabudnite si so sebou k lekárovi priniesť túto príručku.

Agomelatín

na liečbu epizód veľkej depresie
u dospelých

Príručka pre pacienta

Agomelatín Stada je antidepresívum, ktoré môže pomôcť v liečbe depresie.

S cieľom optimalizovať vašu lekársku starostlivosť postupujte podľa odporúčania svojho lekára týkajúcimi sa liečby Agomelatínom Stada (dávka, dĺžka liečby, príslušné následné kontrolné vyšetrenia, krvné testy).

Odporúčania, ako zabrániť vedľajším účinkom súvisiacim s pečeňou

Agomelatín Stada môže spôsobovať vedľajšie účinky, ktoré môžu zahŕňať zmeny v tom, ako vaša pečeň pracuje.

Táto príručka poskytuje odporúčania, ako zabrániť vzniku vedľajších účinkov súvisiacich s pečeňou a poradí, čo robiť, ak sa vedľajšie účinky vyskytnú počas liečby Agomelatínom Stada.

O ďalšie informácie požiadajte svojho lekára.

Detailnejšie informácie si pozrite v písomnej informácii pre používateľa v balení lieku Agomelatín Stada.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárniku alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, Fax: + 421 2 507 01 237, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Lieky/Bezpečnosť liečiv. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Čo robiť pred užitím Agomelatínu Stada?

Povedzte svojmu lekárovi, ak viete, že máte problémy s pečeňou: v takomto prípade neužívajte Agomelatín Stada.

Existujú aj iné dôvody, **prečo Agomelatín Stada môže byť pre vás nevhodný.**

V nasledovných prípadoch sa poraďte so svojim lekárom:

- ak ste už niekedy mali problémy s pečeňou
- ak máte obezitu alebo nadváhu
- ak máte cukrovku
- ak nadmerne konzumujete alkohol
- ak užívate iné lieky (niektoré sú známe tým, že ovplyvňujú pečeň).

Čo robiť, aby ste sa vyhli problémom s pečeňou počas liečby?

Chodte na pravidelné krvné testy

Prečo?

Lekár má **pred začatím liečby** skontrolovať, či vaša pečeň pracuje správne pomocou krvných testov. Výsledky lekárovi ukážu, **ako pracuje vaša pečeň** a rozhodne, či je pre vás liek Agomelatín Stada vhodný.

Počas liečby Agomelatínom Stada môžu mať niektorí pacienti zvýšené hladiny pečeňových enzýmov v krvi. Hladiny týchto pečeňových enzýmov poukazujú na to, ako správne pracuje vaša pečeň a sú pre lekára pri sledovaní liečby nevyhnutné.

Kedy?

	Pred začatím liečby alebo pri zvýšení dávky	Približne po 3 týždňoch liečby	Približne po 6 týždňoch liečby	Približne po 3 mesiacoch liečby	Približne po 6 mesiacoch liečby
Krvné testy	✓	✓	✓	✓	✓

Ak vám lekár zvýši dávku na 50 mg, testy sa musia znovu zopakovať podľa schémy.

Nezabudnite priniesť lekárovi túto príručku na **pripomenutie požadovaných krvných testov** (pozri ďalšiu stranu).

Ak máte informácie, že sa zvýšili vaše pečeňové enzýmy v krvi počas liečby, okamžite po povedzte svojmu lekárovi.

Všimajte si prejavy naznačujúce problémy s pečeňou

Ak spozorujete akýkoľvek z nasledovných prejavov, vaša pečeň nemusí pracovať správne:

- zožltnutie kože/očí
- stmavnutie moču,
- svetlo sfarbená stolica,
- bolesť v hornej časti brucha,
- nezvyčajná únava (najmä v súvislosti s vyššie uvedenými príznakmi)

Vyhľadajte okamžite pomoc lekára, ktorý vám poradí, ako ďalej postupovať v liečbe.

Verzia č.1, Dátum schválenia: 27. 2. 2019