

Agomelatine Glenmark 25 mg

agomelatín

ODPORÚČANIA NA ZABRÁNENIE VEDĽAJŠÍCH ÚČINKOV SÚVIACICH S PEČEŇOU

Agomelatine Glenmark môže spôsobovať vedľajšie účinky, ktoré môžu zahŕňať zmeny vo fungovaní pečene.

Táto príručka poskytuje odporúčania, ako zabrániť vedľajším účinkom súvisiacim s pečeňou a poradí, čo robiť, ak sa tieto vedľajšie účinky vyskytnú počas liečby Agomelatinom Glenmark. Pre ďalšie informácie sa poraďte s lekárom.

Agomelatine Glenmark je antidepresívum, ktoré Vám môže pomôcť liečiť depresiu.

Za účelom optimalizácie Vašej lekárskej starostlivosti sa riadte odporúčaniami svojho lekára, ktoré sa týkajú sa užívania Agomelatinu Glenmark (dávka, trvanie liečby, príslušné kontrolné vyšetrenia, ako sú plánované návštevy lekára, analýza krvných testov).

ČO ROBIŤ PRED UŽITÍM AGOMELATINU GLENMARK?

- Ak viete, že Vaša pečeň nefunguje správne, povedzte o tom svojmu lekárovi a v takomto prípade neužívajte Agomelatine Glenmark.
- Existujú aj iné dôvody, prečo môže byť pre Vás Agomelatine Glenmark nevhodný. V nasledujúcich prípadoch sa, prosím, poraďte so svojím lekárom:
 - ak ste už niekedy mali problémy s pečeňou,
 - ak máte obezitu alebo nadváhu,
 - ak máte cukrovku,
 - ak nadmerne konzumujete alkohol,
 - ak užívate iné lieky (niektoré sú známe tým, že ovplyvňujú pečeň).

ČO ROBIŤ, ABY STE SA POČAS VAŠEJ LIEČBY VYHLI PROBLÉMOM S PEČEŇOU?

■ CHOĎTE NA PRAVIDELNÉ KRVNÉ TESTY

- Prečo?

Váš lekár mal pred začatím liečby skontrolovať, či Vaša pečeň funguje správne. Krvné testy urobené Vaším lekárom mu ukážu, ako Vaša pečeň pracuje a rozhodne, či je pre Vás Agomelatine Glenmark vhodný.

Počas liečby Agomelatínom Glenmark môžu mať niektorí pacienti zvýšenú hladinu pečeňových enzýmov v krvi. Hladiny týchto enzýmov poukazujú na správne alebo nesprávne fungovanie pečene a sú nevyhnutné pre lekára pri monitorovaní liečby.

- Kedy?

	Pred začatím liečby alebo pri zvýšení dávky	Približne 3 týždne liečby	Približne 6 týždňov liečby	Približne 3 mesiace liečby	Približne 6 mesiacov liečby
Krvné testy	✓	✓	✓	✓	✓

Ak vám lekár zvýši dávku na 50 mg, testy sa musia znovu zopakovať podľa schémy. Nezabudnite priniesť lekárovi svoje **PRIPOMENUTIE POŽADOVANÝCH KRVNÝCH TESTOV** (pozri ďalšiu stranu).

Ak máte akékoľvek informácie, že sa Vaše krvné pečeňové enzýmy počas liečby zvýšili, okamžite informujte svojho lekára.

■ VŠÍMAJTE SI PRÍZNAKY SVEDČIACE NA PROBLÉMY S PEČEŇOU

Ak spozorujete akýkoľvek z nasledujúcich príznakov, Vaša pečeň nemusí pracovať správne:

- zožltnutie kože/očí,
- stmavnutie moču,
- svetlo sfarbená stolica,
- bolesť v hornej časti brucha,
- nezvyčajná únava (najmä v súvislosti s vyššie uvedenými príznakmi).

➔ **Vyhľadajte okamžitú pomoc lekára, ktorý vám môže poradiť ukončenie užívania Agomelatínu Glenmark.**

PRIPOMENUTIE POŽADOVANÝCH KRVNÝCH TESTOV

ZAPAMÄTAJTE SI

Pri užívaní Agomelatínu Glenmark je dôležité, aby ste podstupovali pravidelné krvné testy.

TABUĽKA NIŽŠIE VÁM POMÔŽE SLEDOVAŤ VAŠE POŽADOVANÉ KRVNÉ TESTY.

Agomelatine Glenmark 25 mg – DÁTUM PRVÉHO UŽITIA:	
Intervaly krvných testov pečeňových enzýmov	Dátum
Dátum prvého testu (pred začatím liečby)	
Dátum druhého testu (po približne 3 týždňoch liečby)	
Dátum tretieho testu (po približne 6 týždňoch liečby)	
Dátum štvrtého testu (po približne 3 mesiacoch liečby)	
Dátum piateho testu (po približne 6 mesiacoch liečby)	

Váš lekár môže rozhodnúť o vykonaní ďalších krvných testov.

ZVÝŠENIE DÁVKY NA 50 mg – DÁTUM PRVÉHO UŽITIA:	
Intervaly krvných testov pečeňových enzýmov	Dátum
Dátum testu na začiatku užívania Agomelatínu Glenmark v dávke 50 mg	
Dátum druhého testu (po približne 3 týždňoch liečby)	
Dátum tretieho testu (po približne 6 týždňoch liečby)	
Dátum štvrtého testu (po približne 3 mesiacoch liečby)	
Dátum piateho testu (po približne 6 mesiacoch liečby)	

Váš lekár môže rozhodnúť o vykonaní ďalších krvných testov.

Váš lekár monitoruje Vaše krvné testy podľa Schémy monitorovania pečeňových funkcií. K lekárovi si nezabudnite si so sebou priniesť aj túto príručku. Pre detailnejšie informácie si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa v balení Agomelatínu Glenmark.