

Schéma monitorovania funkcie pečene pri liečbe Agomelatine Mylan 25 mg

Schválená indikácia: Liečba epizód veľkej depresie u dospelých

25mg

- Pred začatím liečby ALT..... µkat/l
AST..... µkat/l
- Týždeň 3 ALT..... µkat/l
AST..... µkat/l
- Týždeň 6 ALT..... µkat/l
AST..... µkat/l
- Týždeň 12 ALT..... µkat/l
AST..... µkat/l
- Týždeň 24 ALT..... µkat/l
AST..... µkat/l

Prosím, vykonajte test kedykoľvek, keď je klinicky indikované.

- V prípade zvýšenia dávky **na 50mg**, znovu začať monitorovaciu schému.

- Začatie liečby dávkou 50 mg ALT..... µkat/l
AST..... µkat/l
- Týždeň 3 ALT..... µkat/l
AST..... µkat/l
- Týždeň 6 ALT..... µkat/l
AST..... µkat/l
- Týždeň 12 ALT..... µkat/l
AST..... µkat/l
- Týždeň 24 ALT..... µkat/l
AST..... µkat/l

Prosím, vykonajte test kedykoľvek, keď je klinicky indikované.

Meno pacienta: _____

Dátum začatia liečby: _____

Symptómy alebo akýkoľvek prejav možného poškodenia pečene*

Sérové transaminázy (ALT, AST)

ALT a/alebo AST
>3-násobok hornej hranice normálneho rozmedzia

Zvýšenie ALT a/alebo AST
≤ 3-násobok hornej hranice normálneho rozmedzia

Normálne

Symptómy alebo akýkoľvek prejav možného poškodenia pečene*

Žiadny symptóm alebo prejav poškodenia pečene*
Zopakujte testy pečeňových funkcií do 48 hodín

ALT a/alebo AST
>3-násobok hornej hranice normálneho rozmedzia

Zvýšenie ALT a/alebo AST
≤ 3-násobok hornej hranice normálneho rozmedzia

~~**Ukončíte liečbu**~~

- Mali by sa vykonať testy pečeňových funkcií (vrátane transamináz)

~~**Ukončíte liečbu**~~

- Opakujte testy pečeňových funkcií pravidelne, kým sa sérové transaminázy nevrátia k normálu

Pokračujte v liečbe

- Dodržujte časový harmonogram pečeňových monitorovacích testov

*Ako tmavý moč, svetlo sfarbená stolica, zožltnutie kože/očí, bolesť v pravej hornej časti brucha, pretrvávajúca vzniknutá a nevysvetliteľná únava

Mylan, verzia 1 , január 2019