

Čo je AMGEVITA?

Imunitný systém zvyčajne chráni telo pred infekciou, ale pri niektorých ochoreniach (autoimunitných ochoreniach) tento systém nefunguje tak, ako by mal. AMGEVITA je liek, ktorý sa používa na liečbu niektorých autoimunitných ochorení, ako je reumatoidná artritída, psoriaza a zápalové ochorenia črev.

Cieľom tejto karty je poskytnúť vám a lekárom vášho dieťaťa informácie o bezpečnostných otázkach súvisiacich s týmto liekom.

Medzi vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť pri liečbe AMGEVITOU, patria:

- Infekcie
- Nádorové ochorenie
- Problémy s nervovým systémom

Nie sú to všetky možné vedľajšie účinky lieku AMGEVITA.

Čo mám vedieť skôr, ako moje dieťa začne liečbu liekom AMGEVITA?

Prónosy a riziká používania lieku AMGEVITA sa líšia od pacienta k pacientovi. Pred začatím liečby vášho dieťaťa AMGEVITOU sa porozprávajte s jeho lekárom o prínosoch a rizikách, ktoré pre vaše dieťa liečba predstavuje.

Pred začatím liečby vášho dieťaťa informujte jeho lekára:

- o všetkých zdravotných problémoch, ktoré má vaše dieťa,
- o všetkých liekoch, ktoré vaše dieťa užíva (vrátane liekov na predpis, voľnopredajných liekov, vitamínov a výživových doplnkov);
- ak vaše dieťa:
 - má infekciu alebo príznaky infekcie (ako je horúčka, nehojace sa vriedky, rany, pocit únavy, problémy so zubami),
 - má tuberkulózu v súčasnosti alebo ju malo v minulosti alebo bolo v úzkom kontakte s niekým, kto má tuberkulózu,
 - má nádorové ochorenie, alebo ho malo v minulosti,
 - sa u neho niekedy vyskytla necitlivosť alebo mravčenie,
 - má problém, ktorý ovplyvňuje jeho nervový systém, ako je skleróza multiplex

Lekár vášho dieťaťa pred začatím liečby AMGEVITOU skontroluje vaše dieťa na prejavy a príznaky tuberkulózy. Skôr ako začne s liečbou, sa možno bude musieť liečiť na tuberkulózu.

Očkovanie

Pacientov používajúcich AMGEVITU je možné súčasne očkovať s výnimkou živých vakcín. Ak ste počas tehotenstva používali AMGEVITU, povedzte o tom lekárovi vášho dieťaťa pred podaním vakcíny dieťatu. Podávanie živých vakcín, ako napr. BCG vakcíny (obyčajne podávaná na prevenciu tuberkulózy) dojčiatam, ktoré boli v maternici vystavené účinku AMGEVITY, sa neodporúča 5 mesiacov po poslednej injekcii AMGEVITY, podanej matke počas tehotenstva. Pred očkovaním sa vždy poradte s lekárom.

Čo mám robiť počas liečby môjho dieťaťa AMGEVITOU?

Počas liečby svojho dieťaťa máte:

- povedať lekárovi vášho dieťaťa, či u neho AMGEVITA účinkuje.
- **Okamžite navštíviť lekára vášho dieťaťa, ak sa u vášho dieťaťa vyskytnú nejaké vedľajšie účinky.** Lekár vášho dieťaťa vám môže pomôcť v úsilí zvládnuť ich.
 - Ak sa u vášho dieťa vyskytne nejaký vedľajší účinok, jeho lekár rozhodne, či má vaše dieťa pokračovať v používaní AMGEVITY.
 - Povedzte lekárovi vášho dieťaťa o akomkoľvek vedľajšom účinku, ktorý má vaše dieťa do 4 mesiacov po podaní poslednej injekcie lieku AMGEVITA. Je to tak preto, lebo po podaní poslednej dávky AMGEVITY sa môžu vyskytnúť vedľajšie účinky.
- Povedzte lekárovi vášho dieťaťa:
 - o akýchkoľvek nových zdravotných ťažkostiah, ktorími trpí vaše dieťa,
 - o nových liekoch, ktoré vaše dieťa užíva (vrátane liekov na predpis, voľnopredajných liekov, vitamínov a výživových doplnkov)

– o akýchkoľvek podstúpených chirurgických výkonoch alebo zákrokoch vášho dieťaťa.

U niektorých pacientov užívajúcich liek AMGEVITA sa môžu vyskytnúť závažné vedľajšie účinky. Niektoré závažné vedľajšie účinky sú uvedené v rámcenkoch nižšie. Upozorňujeme, že to nie sú jediné vedľajšie účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť. Viac informácií nájdete v Písomnej informácii pre používateľa pre liek AMGEVITA. Ak sa u vášho dieťaťa počas liečby AMGEVITOU vyskytnú vedľajšie účinky, ihneď to oznámite jeho lekárovi. Lekár vášho dieťaťa vám pomôže zvládnuť vedľajšie účinky a zabrániť ich zhoršovaniu.

Infekcie – Pacienti liečením AMGEVITOU sú náchylnejší na infekcie a keď ich dostanú, sú závažnejšie. Niektoré z týchto infekcií sú relatívne mierne, napríklad nachladnutie. Iné sú závažnejšie a potenciálne smrteľné, napríklad tuberkulóza.

Nádorové ochorenia – Riziko vzniku určitých druhov nádorových ochorení je vyššie u pacientov liečených AMGEVITOU.

Problémy s nervovým systémom – U niektorých pacientov liečených AMGEVITOU sa môžu vyuvinúť nové problémy s nervovým systémom alebo zhoršovať existujúce, napríklad skleróza multiplex.

Ak má vaše dieťa niekterý z nasledujúcich príznakov, ktoré môžu naznačovať závažné vedľajšie účinky, zavolajte jeho lekárovi alebo okamžite vyhľadajte lekársku starostlivosť. Toto nie sú všetky možné príznaky vedľajších účinkov. Ak počas liečby AMGEVITOU bude vaše dieťa pocíťovať niečo nezvyčajné, ihneď to oznámite jeho lekárovi. Lekár vášho dieťaťa vám pomôže zvládnuť príznaky vedľajších účinkov a zabrániť ich zhoršovaniu.