

Začnite tu → Príprava na injekciu

Táto príručka je navrhnutá na poskytnutie rýchlej informácie ako podať injekciu bezpečne a účinne.

Pred podaním injekcie Benepali® si prečítajte pokyny na použití a písomnú informáciu pre používateľa, kde nájdete dôležité informácie, ktoré by ste si mali zapamätať. To zahŕňa informácie o možných alergických reakciách, vedľajších účinkoch a okolnostiach, kedy sa Benepali® nemá používať.

(PPen) SK v.1.0

Ako podať injekciu Benepali® pomocou pera Benepali®

V dizajnovom riešení pera Benepali® „zatláč a podaj“ nie je žiadne tlačidlo, čo zjednodušuje správne podanie injekcie. Autoinjektor na podanie etanerceptu od spoločnosti Biogen je kompaktný, ľahký a bez tlačidiel. Etanercept je liečivom Benepali®.

Prípravte si všetky pomôcky


Vyberte si dobre osvetlenú čistú rovnú pracovnú plochu a pripravte si:

Balenie neobsahuje:



Nové naplnené pero Benepali® (autoinjektor)
(vyberte z vonkajšieho obalu uchovávaného v chladničke)

Naplnené pero na jedno použitie obsahuje jednu 50 mg dávku Benepali®.



Pozorne skontrolujte

Skontrolujte pero Benepali®:

Nepoužite naplnené pero, ktoré je po dátume expirácie.

Nepoužite naplnené pero, ktoré spadlo na pevný povrch, keďže zložky vo vnútri pera môžu byť poškodené.

Naplneným perom **netraсте**.

Nepoužite pero, ak je **modrý kryt ihly** chybné pripevnený.

Prezrite si liek cez kontrolné okienko.

Liek má byť číry až mierne opaleskujúci, bezfarebný až bledožltý a môže obsahovať malé biele alebo takmer priesvitné bielkovinové častice.

Roztok **nepoužívajte**, ak je zafarbený, zakalený alebo ak sú prítomné častice, ktoré sa líšia od častíc opísaných vyššie.

Nechajte liek dosiahnuť izbovú teplotu

Počkajte 30 minút

Nechajte pero Benepali® pri izbovej teplote po dobu najmenej 30 minút. Injekčné podanie lieku bude potom jednoduchšie a pohodlnejšie.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Nezohrievajte Benepali žiadnymi zdrojmi tepla, ako je napríklad mikrovlnná rúra alebo horúca voda.

Neodstraňujte modrý kryt ihly.



Počkajte 30 minút pred použitím lieku

→ Podanie injekcie perom Benepali®




Umyte si ruky mydlom a vodou.



Očistite miesto podania

Otrite kožu v mieste podania injekcie alkoholovým tampónom.

Tejto oblasti sa už pred podaním injekcie **nedotýkajte**.



Odstráňte kryt ihly

Priamo stiahnite modrý kryt ihly.

Neotáčajte ani **neohýbajte** kryt ihly počas stahovania, pretože to môže poškodiť ihlu.

Nikdy nenasadzujte kryt znovu na ihlu.

Kryt vyhodte do koša alebo do nádoby na ostré predmety.



Natiahnite kožu a nasmerujte pero

Jemne natiahnite kožu v oblasti podania injekcie.

Nasmerujte pero Benepali® približne v 90-stupňovom uhle ku koži.

Kožu **nezovierajte**.

Načúvajte dvom cvaknutiam počas tlačenia



Silno stlačte a začnite podávať

Silno zovrite pero Benepali® a stlačením smerom nadol do miesta podania injekcie začnite podávať injekciu (na pere nie je žiadne tlačidlo na stlačenie).

Keď sa začne podávať injekcia, pero **cvakne po prvýkrát** – zatiaľ pero nezdvíhajte. **Stále držte** pero pevne prítlačené k miestu podania injekcie.

Pomôcka **cvakne po druhý raz**.

Tlačte 15 s



Po druhom cvaknutí pomaly narátajte do 15

Keď začujete **druhé cvaknutie**, ďalej tlačte pero smerom do miesta podania injekcie a **rátajte pomaly do 15**, aby sa zaručilo podanie celej injekčnej dávky.

Neuvoľňujte tlak na miesto podania, ani pred dokončením injekcie nehybte s perom Benepali®.

Skontrolujte žltý piest



Snímte a skontrolujte

Snímte prázdne pero z kože.

Ochranný kryt úplne zakryje ihlu.

Skontrolovaním žltého piesta v okienku **sa uistite**, či bola podaná celá dávka.

Po injekcii



Správne zlikvidujte pero

Zlikvidujte prázdne pero vyhodením do nádoby určenej na ostré predmety.

Pokyny na správnu likvidáciu plnej nádoby na ostré predmety vám dá váš lekár alebo zdravotná sestra.

Nádobu na ostré predmety **nevyhadzujte** do domového odpadu ani nerecyklujte.

Vždy uchovávajte nádobu mimo dohľadu a dosahu detí.

Ošetrite miesto podania injekcie

Ak sa vyskytne krvácanie v mieste podania injekcie, prítlačte na miesto podania injekcie kúsok gázy.

Netrite miesto podania injekcie.

Ak je to potrebné, miesto podania injekcie môžete prelepiť náplastou.

Pacienti

Ďalšie otázky?

Opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry. Obráťte sa na miestneho zástupcu držiteľa, ktorého kontaktné údaje nájdete v pokynoch na použitie a v písomnej informácii pre používateľa.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho, lekárku alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, Fax: + 421 2 507 01 237, e-mail: neziadu.uciinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Lieky/Bezpečnosť liečiv. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskada/>. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie.

Precítajte si pokyny na použitie predtým, ako začnete používať Benepali® a zakaždým, keď dostanete novú zásobu liekov na predpis, keďže môžu obsahovať nové informácie. Táto stručná informačná príručka nenahrádza tieto pokyny.

Ak ste neboli riadne vyskolený lekárom, nesnažte sa vpichnúť si injekciu sami.

(PPPen) SK v 1.0.
BEN-PAN-xxxxx 04/2018

