


→ A. Predtým ako začnete

Pripravte si všetky pomôcky

Vyberte si dobre osvetlenú čistú rovnú pracovnú plochu a pripravte si všetky potrebné pomôcky:



Balenie neobsahuje:



1 alkoholový tampón



bavlnenú gázu




nádoby na likvidáciu ostrých predmetov

Nová naplnená injekčná striekačka Benepali®

Naplnená injekčná striekačka na jedno použitie

Naplnenou injekčnou striekačkou **netraste**.



1. Skontrolujte naplnenú injekčnú striekačku

Skontrolujte dátum expirácie na štítku naplnenej injekčnej striekačky.

Nepoužite naplnenú injekčnú striekačku, ktorá je po dátume expirácie.

Nepoužite naplnenú injekčnú striekačku, ktorá spadla na pevný povrch. Zložky vo vnútri naplnenej injekčnej striekačky môžu byť poškodené.

Nepoužite naplnenú injekčnú striekačku, ak chýba kryt ihly alebo ak je kryt ihly chybné pripevnený.

2. Skontrolujte roztok:

Prezrite si liek v naplnenej injekčnej striekačke.

Liek má byť číry až mierne opaleskujúci, bezfarebný až bledožltý a môže obsahovať malé biele alebo takmer priehľadné bielkovinové častice.

Roztok **nepoužívajte**, ak je zafarbený, zakalený alebo ak sú prítomné častice, ktoré sa líšia od častíc opísaných vyššie.

3. Nechajte liek dosiahnuť izbovú teplotu:

Vyberte jednu naplnenú injekčnú striekačku z chladničky a nechajte ju pri izbovej teplote po dobu najmenej 30 minút pred injekčným podaním.

Je to dôležité na uľahčenie injekčného podania lieku a kvôli pohodlnému pocitu pri jeho podávaní.

Neodstraňujte kryt ihly, až kým nebudete pripravený na podanie injekcie.

Nezohrievajte Benepali žiadnymi zdrojmi tepla, ako je napríklad mikrovlnná rúra alebo horúca voda

4. Vyberte miesto podania injekcie

Benepali naplnená injekčná striekačka je určená na podkožnú injekciu. Má sa podať do stehna, brucha alebo zadnej časti nadlaktia (pozri obrázok vľavo).

Zakaždým meňte miesto podania injekcie. Každé nové miesto podania injekcie má byť aspoň 3 cm (vzdialenosť troch prstov) od predchádzajúceho miesta podania.

Ak si podávate injekciu do brucha, vyberte miesto vo vzdialenosti aspoň 5 cm od pupka.


Nepodávajte injekciu do miesta, ktoré je začervenané, stvrdnuté, s krvnou podliatinou ani do boľavého miesta.

Nepodávajte injekciu do jaziev ani strií.

Ak máte psoriázu, **nepodávajte** si injekciu priamo do vyvýšených, zhrubnutých, červených alebo šupinatých miest na koži ani do lézií (psoriatické kožné lézie).


→ B. Postup podania injekcie

1. Krok:



Umyte si ruky mydlom a vodou.

2. Krok:




Otrite kožu v mieste podania injekcie alkoholovým tampónom.

Pozri odsek „Vyberte miesto podania injekcie“ s pokynmi, ako vybrať miesto podania injekcie.

Tejto oblasti sa už pred podaním injekcie **nedotýkajte**.

3. Krok:



Priamo stiahnite kryt ihly a vyhoďte ho do koša alebo do nádoby na ostré predmety.


Pozri odsek „Vyberte miesto podania injekcie“ s pokynmi, ako vybrať miesto podania injekcie.

Neotáčajte ani **neohýbajte** kryt ihly počas sťahovania, pretože to môže poškodiť ihlu.

Nedotýkajte sa piestu počas odstraňovania krytu ihly.

Nikdy nenasadzujte kryt znovu na ihlu.


4. Krok:



Jemne zovrite kožu v oblasti očisteného miesta injekcie. Držte naplnenú injekčnú striekačku v 45-stupňovom uhle ku koži. Rýchlym pohybom ako pri hádzaní šípku vpichnete celú ihlu do kože.


Keď je ihla úplne vsunutá do kože, môžete uvoľniť zovretú časť kože.

5. Krok:



Pomalým zatlačením piestu smerom nadol podajte injekčne všetok roztok Benepali®.

6. Krok:



Keď je injekčná striekačka prázdna, vytiahnite ihlu z kože pod rovnakým uhlom, pod akým ste ju zapichli.

Nikdy nenasadzujte kryt znovu na ihlu. Opätovné nasadenie krytu ihly môže viesť k poraneniu ihlou.

Likvidácia:



Zlikvidujte celú injekčnú striekačku vyhodením do nádoby určenej na ostré predmety.

Pokyny na správnu likvidáciu plnej nádoby na ostré predmety vám dá váš lekár alebo zdravotná sestra. Nádoby na likvidáciu ostrých predmetov si môžete kúpiť v miestnej lekární.

Nádoby na ostré predmety **nevyhadzujte** do domového odpadu.

Nerecyklujte.

Naplnenú injekčnú striekačku Benepali® **nepoužívajte** opakovane.

Vždy uchovávajte nádoby mimo dohľadu a dosahu detí.

→ C. Ošetrovanie miesta podania injekcie

Ak sa vyskytne krvácanie v mieste podania injekcie, pritlačte na miesto podania injekcie kúsok gázy.

Netrite miesto podania injekcie.

Ak je to potrebné, miesto podania injekcie môžete prelepiť náplastou.



Pacienti

Ďalšie otázky?

Opýtajte sa svojho lekára alebo zdravotnej sestry. Obráťte sa na miestneho zástupcu držiteľa, ktorého kontaktné údaje nájdete v pokynoch na použitie a v písomnej informácii pre používateľa.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, Fax: + 421 2 507 01 237, e-mail: neziaduuce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Lieky/Bezpečnosť liečiv. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie.

Prečítajte si **pokyny na použitie** predtým, ako začnete používať Benepaj® a za každým, keď dostanete novú zásobu liekov na predpis, keďže môžu obsahovať nové informácie.

Táto **stručná informačná príručka** nenahradza tieto pokyny.

Ak ste neboli riadne vyskolený lekárom, **nesnažte sa** vpichnúť si injekciu sami.

(PF-Syringe) SK v. 1.0
BEN-PAN-xxxxx 04 / 2018

