

REKONŠTITÚCIA 3,5 mg liekovky BORTEZOMIB MYLAN

PRE SUBKUTÁNNE (SC) A INTRAVENÓZNE (IV) PODANIE

SUBKUTÁNNE PODANIE

Na rekonštitúciu pridajte **1.4 ml**
sterilného 0,9 % roztoku chloridu
sodného do liekovky obsahujúcej
Bortezomib. Výsledná koncentrácia
2.5 mg/ml.



INTRAVENÓZNE PODANIE

Na rekonštitúciu pridajte **1.4 ml**
sterilného 0,9 % roztoku chloridu
sodného do liekovky obsahujúcej
Bortezomib. Výsledná koncentrácia
1.0 mg/ml.

- ◀▶ Objem rozpúšťadla, použitého na rekonštitúciu Bortezomib Mylan pre SC podanie je iný ako objem rozpúšťadla, použitého pre IV podanie. Kvôli pridaniu rozdielnych objemov sa roztoky po rekonštitúcii odlišujú koncentráciou liečiva.
- ◀▶ Bortezomib Mylan musí rekonštituovať zdravotnícky pracovník použitím prísnych aseptických postupov, pretože liek neobsahuje žiadne konzervačné látky.
- ◀▶ Bortezomib Mylan musí rekonštituovať zdravotnícky pracovník použitím prísnych aseptických postupov, pretože liek neobsahuje žiadne konzervačné látky.
- ◀▶ Aby sa predišlo chybám pri podaní, majú byť injekčné striekačky pre SC a IV podanie rozdielne označené.
- ◀▶ **Len na subkutánne alebo intravenózne podanie.
Nepodávajte inými spôsobmi.**
- ◀▶ Akúkoľvek nežiaducu udalosť, pozorovanú pri podávaní Bortezomib Mylan, ihneď hláste.

Bortezomib

Bortezomib

REKONŠTITÚCIA 3,5 mg liekovky BORTEZOMIB MYLAN

PRE SUBKUTÁNNE (SC) A INTRAVENÓZNE (IV) PODANIE

SUBKUTÁNNE PODANIE

Na rekonštitúciu
pridajte **1.4 ml**

sterilného 0,9 % roztoku chloridu
sodného do liekovky
obsahujúcej Bortezomib.
Výsledná koncentrácia

2.5 mg/ml.



INTRAVENÓZNE PODANIE

Na rekonštitúciu
pridajte **1.4 ml**

sterilného 0,9 % roztoku chloridu
sodného do liekovky
obsahujúcej Bortezomib.
Výsledná koncentrácia

1.0 mg/ml.

- Objem rozpúšťadla, použitého na rekonštitúciu Bortezomib Mylan pre SC podanie je iný ako objem rozpúšťadla, použitého pre IV podanie. Kvôli pridaniu rozdielnych objemov sa roztoky po rekonštitúcii odlišujú koncentráciou liečiva.
- Bortezomib Mylan musí rekonštituovať zdravotnícky pracovník použitím prísnych aseptických postupov, pretože liek neobsahuje žiadne konzervačné látky.
- Bortezomib Mylan musí rekonštituovať zdravotnícky pracovník použitím prísnych aseptických postupov, pretože liek neobsahuje žiadne konzervačné látky.
- Aby sa predišlo chybám pri podaní, majú byť injekčné striekačky pre SC a IV podanie rozdielne označené.
- Len na subkutánne alebo intravenózne podanie. Nepodávajte inými spôsobmi.**
- Akúkoľvek nežiaducu udalosť, pozorovanú pri podávaní Bortezomib Mylan, ihneď hláste.