

Očkovacie látky:

Obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika, ak ste boli nedávno očkovaný alebo sa plánujete dať zaočkovať – je to preto, lebo určité očkovacie látky (tzv. živé vakcíny, napr. proti osýpkam, zápalu príušníc – mumpsu, pásovému oparu, žltej zimnici, týfusu) sa neodporúča podávať tesne pred a počas užívania Cibirinqa.

Krvné zrazeniny v žilách (známe ako hlboká žilová trombóza) alebo v pľúcach (známe ako pľúcna embólia)

Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak:

- ste mali krvné zrazeniny v žilách nôh (hlbokú žilovú trombózu) alebo v pľúcach (pľúcnu embóliu). Ak sa u vás počas užívania Cibirinqa vyskytne dýchavičnosť, bolesti na hrudi, bolestivo vám opuchne noha, môžu to byť prejavy krvných zrazenín v žilách.

Laboratórne testy

Pred liečbou a počas liečby Cibirinqom sú potrebné laboratórne testy (vrátane vyšetrenia hladiny cholesterolu v krvi). Ak je to nutné, lekár môže podľa výsledkov testov vašu liečbu upraviť.

Antikoncepcia a tehotenstvo

Cibirinqo NESMIETE užívať počas tehotenstva.

Ak ste žena, ktorá môže otehotnieť, musíte počas liečby a najmenej jeden mesiac po poslednom podaní Cibirinqa používať účinnú formu antikoncepcie. Váš lekár vám môže poradiť vhodné formy antikoncepcie.

Ak počas liečby otehotníte alebo si myslíte, že ste otehotnели, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

CIBINQO

(abrocitinib)

KARTA PRE PACIENTA

Vaše meno:

Meno lekára (ktorý predpísal Cibirinqo):

Telefónne číslo lekára:

Dátum, kedy ste začali užívať Cibirinqo:

▼ Cibirinqo je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ak sa u vás vyskytnú.

Hlásenie podozrení na vedľajšie účinky

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami priamo na: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie
Kvetná 11, 825 08 Bratislava
tel.: + 421 2 507 01 206
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/ Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov.

Formulár na elektronické podávanie hlásení:
<https://portal.sukl.sk/eskadra/>

Hlásením podozrení na vedľajšie účinky môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj spoločnosti Pfizer:



Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka
Pribinova 25, 811 09 Bratislava, Slovenská republika
tel.: + 421 2 3355 5500
e-mail: SVK.AEReporting@pfizer.com

Informácie pre pacienta o bezpečnosti Cibinqa:

- Táto karta obsahuje dôležité bezpečnostné informácie, o ktorých musíte vedieť pred a počas liečby Cibinqom.
- Viac informácií si prečítajte v Písomnej informácii pre používateľa, ktorá je súčasťou každého balenia Cibinqa.
- Ak vám tieto informácie nie sú jasné, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Túto kartu noste pri sebe a ukážte ju ktorémukoľvek zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vás lieči – napríklad vašim ostatným lekárom, vášmu lekárnikovi alebo lekárovi na pohotovosti. Nižšie sú opísané vybrané vedľajšie účinky a informácie, ktoré je potrebné vedieť. Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára.

Riziko infekcií

Neužívajte Cibinqo, ak máte závažnú prebiehajúcu infekciu, vrátane tuberkulózy.

Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak:

- sa u vás vyskytnú príznaky infekcie, ako sú horúčka, potenie alebo triaška, bolesti svalov, kašeľ alebo dýchavičnosť, krv v hlienoch, zníženie telesnej hmotnosti, hnačka alebo bolesť žalúdka, pálenie pri močení alebo častejšie močenie ako zvyčajne, pocit veľkej únavy.
- sa u vás vyskytnú akékoľvek príznaky pásového oparu (infekcia vírusom herpes zoster), ako je bolestivá kožná vyrážka s pľuzgiermi.
- máte alebo ste mali tuberkulózu, alebo ste boli v úzkom kontakte s niekým s tuberkulózou.