

Kontrolný zoznam č. 2: Kontrolný zoznam pre sledovanie prebiehajúcej liečby metylfenidátom

Nasledujúci kontrolný zoznam slúži na poskytnutie pomoci pri sledovaní prebiehajúcej liečby liekom obsahujúcim metylfenidát u vhodných pacientov s poruchou pozornosti sprevádzanou hyperaktivitou (ADHD).

Ako je podrobnejšie uvedené v informáciách o predpisovaní, pravidelne sa má sledovať rastový, psychický a kardiovaskulárny stav pacienta:

- Hodnoty krvného tlaku a pulzu sa majú zaznamenať pri každej úprave dávkovania, a potom najmenej raz za 6 mesiacov.
- Výška, váha a chuť do jedla sa majú zaznamenať v najmenej šesťmesačných intervaloch v tabuľke rastu.
- Vznik *de novo* alebo zhoršenie už existujúcich psychických porúch sa má sledovať pri každej úprave dávkovania, a potom najmenej raz za 6 mesiacov a pri každej návšteve.

Odporúča sa používať tento kontrolný zoznam spolu s úplnými informáciami o predpisovaní pre konkrétny predpísaný liek.

Pred konzultáciou si stiahnite a vytlačte tento kontrolný zoznam. Na webovej stránke nemožno ukladať žiadne informácie špecifické pre pacienta. Vyplnený kontrolný zoznam môže byť súčasťou dokumentácie týkajúcej sa pacienta.

V priebehu vyplňania kontrolného zoznamu môže byť tiež užitočné prediskutovať písomnú informáciu pre používateľov konkrétneho predpisovaného lieku s pacientom a jeho rodičmi alebo zákonným zástupcom.

Sledovanie počas prebiehajúcej liečby metylfenidátom

Dátum hodnotenia:	_____
Dôvod hodnotenia:	_____
Meno pacienta:	_____
Dátum narodenia:	_____
Vek:	_____
Pohlavie:	_____

Pozorne skontrolujte nasledujúce systémy, ako je označené nižšie, pri každej úprave dávkovania a pri nasledujúcich návštevách najmenej raz za 6 mesiacov:

	Hodnotené
Všeobecné lekárske nálezy	
• Zaznamenajte výšku, telesnú hmotnosť a chuť do jedla (viď samostatnú tabuľku pre sledovanie)	<input type="checkbox"/>
• Ak rast nedosahuje očakávané hodnoty, zvážte prerušenie liečby metylfenidátom	
• Zaznamenajte akýkoľvek náznak zneužitia, nesprávneho použitia alebo diverzie metylfenidátu	<input type="checkbox"/>
• Gravidita	<input type="checkbox"/>
• Vyhodnoďte prínos/riziko	
Nové kardiovaskulárne nálezy	Má sa zaznamenať krvný tlak a pulz
• Palpitácie	<input type="checkbox"/>
• Úporná bolesť na hrudi	<input type="checkbox"/>
• Nevysvetliteľné synkopy	<input type="checkbox"/>
• Dyspnoe	<input type="checkbox"/>
• Ďalšie príznaky naznačujúce ochorenie srdca	<input type="checkbox"/>
• Odporučiť na urýchlené vyšetrenie kardiológom	
Nové neurologické nálezy	
• Vážne bolesti hlavy, znecitlivenie, slabosť alebo paralýza, porucha koordinácie, zraku, reči, jazyka alebo pamäti	<input type="checkbox"/>
• Akýkoľvek z vyššie uvedených symptómov môže znamenať cerebrálnu vaskulitídu: ukončite liečbu metylfenidátom	
• Zvýšenie frekvencie kŕčov alebo ak sa kŕče objavia	<input type="checkbox"/>
• Liečba metylfenidátom sa má prerušiť	

	Hodnotené
Nové psychické nálezy alebo ich zhoršenie	Má sa sledovať vznik <i>de novo</i> alebo zhoršenie existujúcich psychických porúch
• Psychotické alebo manické príznaky	<input type="checkbox"/>
Zvážte prerušenie liečby metylfenidátom	
• Samovražedné sklony alebo správanie	<input type="checkbox"/>
Zvážte liečbu základnej psychickej poruchy	
Vyhodnoťte znovu prínos/riziko	
Zvážte prerušenie liečby metylfenidátom	
• Agresívne a nepriateľské správanie	<input type="checkbox"/>
Zvážte potrebu úpravy liečby	
• Úzkosť, agitácia alebo napätie	<input type="checkbox"/>
• Depresívne príznaky	<input type="checkbox"/>
• Motorické alebo verbálne tiky alebo ich zhoršenie	<input type="checkbox"/>
Trvanie liečby	
• Pacient sa sústavne lieči viac ako 12 mesiacov	<input type="checkbox"/>
• V priebehu 1 mesiaca po vhodnej úprave dávkovania sa zaznamená zlepšenie príznakov, v opačnom prípade sa odporúča liečbu liekom prerušiť	<input type="checkbox"/>
Zvážte skúšobné prerušenie liečby najmenej raz ročne na posúdenie, či je pokračovanie v liečbe naďalej potrebné	

Sem zaznamenajte všetky dodatočné informácie

Po vyššie uvedenom vyhodnotení zaznamenajte, prosím, východiskové hodnoty do tabuľky za účelom priebežného sledovania. ([Odkaz na tabuľku](#))

Ukončenie liečby

V priebehu vysadenia lieku je nutný starostlivý dohľad, pretože môže dôjsť k prejavu nasledujúcich príznakov:

- **depresia** alebo
- **chronická hyperaktivita**

Niektorí pacienti môžu vyžadovať dlhodobé pozorovanie.