

## Tabuľka pre priebežné sledovanie počas liečby metylfenidátom

Ako je podrobnejšie uvedené v informáciách o predpisovaní, rastový, psychický a kardiovaskulárny stav pacienta sa má pravidelne sledovať:

- Hodnoty krvného tlaku a pulzu sa majú zaznamenať pri každej úprave dávkovania, a potom najmenej raz za 6 mesiacov.
- Výška, hmotnosť a chuť do jedla sa majú zaznamenať v najmenej šesťmesačných intervaloch v tabuľke rastu - platí len pre deti a dospelých mladších ako 18 rokov.
- Vznik *de novo* alebo zhoršenie už existujúcich psychických porúch sa má sledovať pri každej úprave dávkovania, a potom najmenej raz za 6 mesiacov a pri každej návšteve.

Dátum úvodného hodnotenia:

Meno pacienta:

Dátum narodenia:

Vek:

Pohlavie:

	Východiskové hodnoty	Nasledujúce návštevy											
Dátum hodnotenia													
Dôvod hodnotenia													
Krvný tlak*													
Pulz*													
Telesná hmotnosť (kg)**													
Výška (cm)**													
Chuť do jedla**													

\* Hodnoty krvného tlaku a pulzu sa majú zaznamenať pri každej úprave dávkovania, a potom najmenej raz za 6 mesiacov.

\*\*Výška, hmotnosť a chuť do jedla sa majú zaznamenať v najmenej šesťmesačných intervaloch v tabuľke rastu - platí len pre deti a dospelých mladších ako 18 rokov.