

Príručka pre pacientov

Deferasirox Teva 180 mg
filmom obalené tablety

Deferasirox Teva 360 mg
filmom obalené tablety

Meno:

Dátum:

Obsah

Deferasirox Teva príručka pre pacientov

Úvod	3
Čo je Deferasirox Teva?	3
Prečo mi predpísali Deferasirox Teva?	3
Ako účinkuje Deferasirox Teva?	4
Na čo sa Deferasirox Teva používa?	4
Ako budem užívať Deferasirox Teva filmom obalené tablety?	4
Ako bude liečba sledovaná?	6
Má Deferasirox Teva vedľajšie účinky?	7
Iné lieky a Deferasirox Teva	8
Antikoncepcia	9
Moja liečba s Deferasirox Teva	9
Moje základné údaje	10
Začatie liečby s Deferasirox Teva	11

Úvod

Deferasirox Teva príručka

Táto príručka obsahuje dôležité informácie, vrátane správneho užívania lieku Deferasirox Teva, ktorý vám bol predpísaný. Zistíte viac o monitorovaní vašej liečby, možných vedľajších účinkoch a o užívaní iných liekov pokiaľ užívate Deferasirox Teva.

Čo je Deferasirox Teva?

Je to chelátor železa, (chelatačná látka), ktorý sa používa na odstraňovanie nadbytku železa z tela.

Prečo mi predpísali Deferasirox Teva?

Prí mnohých ochoreniach sú potrebné transfúzie. Sú to napríklad:

- β -talasémia major,
- kosáčikovitá anémia (SCD),
- myelodysplastické syndrómy s nízkym rizikom (MDS),
- iné anémie (málokrvnosť).

Ak máte niektoré z týchto ochorení, pravdepodobne ste dostali niekoľko transfúzií. Transfúzie obsahujú zdravé červené krvinky, ktoré vaše telo potrebuje a môžu vám pomôcť cítiť sa lepšie.

Každá transfúzia, ktorú ste dostali obsahuje železo. Železo je dôležité, pre prenos kyslíka červenými krvinkami v tele. Ľudské telo však nepozná spôsob akým možno odstrániť nadbytok železa.

Množstvo železa narastá po každej transfúzii. Toto zapríčiňuje nadbytok železa vo vašom tele, čo sa nazýva **chronické preťaženie železom**. Príliš veľa železa v tele môže byť škodlivé a môže poškodzovať orgány ako srdce a pečeň.

Je dôležité odstrániť nadbytok železa a udržať hladinu železa v bezpečnej, zdravej hladine.

Ako účinkuje Deferasirox Teva?

Deferasirox Teva účinkuje pomocou mechanizmu, ktorý sa nazýva „chelácia – vychytávanie“. Potom ako Deferasirox Teva užijete, dostáva sa do krvi a „vychytáva“ nadbytočné železo, ktoré nájde.

Na čo sa Deferasirox Teva používa?

Deferasirox Teva sa používa na liečbu chronického preťaženia železom spôsobeného častými krvnými transfúziami u pacientov s beta talasémiou major vo veku 6 rokov a viac.

Deferasirox Teva sa tiež používa na liečbu chronického preťaženia železom, keď liečba deferoxamínom je kontraindikovaná alebo nevhodná u pacientov s beta talasémiou major s preťažením železom spôsobeným zriedkavými krvnými transfúziami, u pacientov s inými druhmi anémie a u detí vo veku 2 až 5 rokov.

Deferasirox Teva sa tiež používa, keď je liečba deferoxamínom kontraindikovaná alebo nevhodná, na liečbu pacientov vo veku 10 rokov a starších, ktorí majú preťaženie železom súvisiace s talasemickými syndrómami, ale ktorí nie sú závislí od transfúzií.

Ako budem užívať Deferasirox Teva filmom obalené tablety?

Akú dávku budem užívať?

Predpísaná dávka Deferasirox Teva filmom obalených tabliet závisí od vašej hmotnosti, súčasnej hladiny železa, pečeneových a obličkových funkcií a ako často dostávate transfúzie.

Ak prechádzate z inej liečby (ako je deferoxamín) na Deferasirox Teva filmom obalené tablety, lekár môže zvoliť dávku Deferasirox Teva na základe dávky deferoxamínu, ktorú dostávate.

Akú/é tabletu/y budem užívať?

Deferasirox Teva filmom obalené tablety sa dodávajú v rôznych veľkostiach tablety a možno budete musieť užívať viac ako jednu tabletu. Váš lekár vám povie, koľko tabliet a ktorú/e veľkosť/ti by ste mali užívať každý deň.



180 mg



360 mg

Zobrazené tablety nie sú v skutočnej veľkosti.

Ako a kedy užívať Deferasirox Teva filmom obalené tablety

Deferasirox Teva filmom obalené tablety sa majú prehltnúť celé a zapíť vodou.

Pre pacientov, ktorí nie sú schopní prehltnúť celé tablety, môžu byť Deferasirox Teva filmom obalené tablety rozdrvené a podávané tak, že sa celá dávka nasype na malé množstvo ľahkej stravy, ako je jogurt alebo jablkové pyré. Dávka lieku sa má užiť ihneď a celá a nesmie sa uchovávať na budúce použitie.

Deferasirox Teva filmom obalené tablety sa majú užívať jedenkrát denne, najlepšie každý deň v ten istý čas a môžu sa užívať na prázdny žalúdok alebo s ľahkým jedlom.

Možnosť 1




Čo ak zabudnem užiť dávku?

Ak vynecháte dávku Deferasirox Teva, mali by ste ju užiť hneď ako si spomeniete, aj keď neskôr v daný deň. Ďalšiu dávku užite v plánovanom čase.


Neužívajte dvojnásobnú dávku na nasledujúci deň, aby ste nahradili vynechanú/é tabletu/y.

Možnosť 2



Čo ak užijem viac tabliet Deferasirox Teva ako mám?

Ak ste užili viac Deferasirox Teva tabliet ako ste mali, okamžite sa poraďte so svojim lekárom alebo sa dostavte do nemocnice, pretože môže byť potrebné lekárske ošetrovanie. Môžu sa vyskytnúť vedľajšie účinky ako bolesť brucha, hnačka, nevoľnosť a vracanie a problémy s obličkami alebo pečeňou, ktoré môžu byť závažné.



Ako bude liečba sledovaná?

Počas liečby Deferasirox Teva vám budú robiť pravidelne laboratórne vyšetrenia. Tieto vyšetrenia budú kontrolovať ako reagujete na liečbu. Vaša dávka sa môže zvyšovať alebo znižovať na základe týchto vyšetrení.

Vyšetrenie	Pred užívaním Deferasiroxu Teva	Mesačne	Raz ročne
Železo Sérový feritín	✓	✓	
Obličky Kreatinín v krvi	✓ Toto vyšetrenie vám urobia dvakrát pred začatím liečby Deferasiroxom Teva	✓ V prvom mesiaci a v každom prvom mesiaci po zmene dávky vám urobia vyšetrenie raz za týždeň; potom raz mesačne	
Klírens kreatinínu	✓	✓ V prvom mesiaci a v každom prvom mesiaci po zmene dávky vám urobia vyšetrenie raz za týždeň; potom raz mesačne	
Pečeň (sérové hladiny transamináz, bilirubínu, alkalickéj fosfatázy)	✓	✓ V prvom mesiaci vám urobia vyšetrenie každé 2 týždne, potom raz mesačne	
Moč (Bielkoviny v moči)	✓	✓	
Sluch a zrak	✓		✓
Hmotnosť a výška	✓		✓
Pediatrickí pacienti: Vyhodnotenie telesného vývoja (napr.: hmotnosť, sexuálny vývoj a prírastok na výške za rok).	✓		✓

Lekár môže taktiež

- Odporučiť vyšetrenie označované ako zobrazovanie pomocou magnetickej rezonancie (**MRI**), na zistenie železa v srdci alebo pečeni.
- Odporučiť urobiť **biopsiu** obličiek, ak má podozrenie na významné poškodenie obličiek.

Má Deferasirox Teva vedľajšie účinky?

Tak ako všetky lieky aj Deferasirox Teva môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neobjavia u všetkých pacientov. Najčastejšie vedľajšie účinky sú mierne alebo stredne silné a obvykle vymiznú po niekoľkých dňoch alebo týždňoch od začatia liečby.

K častým vedľajším účinkom patrí nutkanie na vracanie, vracanie, hnačka, bolesti brucha, plynatosť, zápcha, tráviace ťažkosti, vyrážka, bolesť hlavy a svrbenie.

Funkciu vašich obličiek a pečene vyšetria predtým ako začnete užívať Deferasirox Teva a počas liečby budete pravidelne sledovaný (pozri tabuľku na predchádzajúcej strane).

Niektoré vedľajšie účinky môžu byť závažné a môžu vyžadovať okamžité lekárske ošetrovanie. Tieto vedľajšie účinky sú menej časté alebo zriedkavé.

Prestaňte užívať tento liek a okamžite to povedzte svojmu lekárovi, ak sa objaví niektorý z uvedených vedľajších účinkov:

- rozsiahle kožné vyrážky, alebo ťažkosti s dýchaním a závraty alebo opuch, najmä tváre a krku (príznaky závažnej alergickej reakcie),
- rozsiahle kožné vyrážky, sčervenenie kože, pluzgieri na perách, očiach alebo ústach, olupovanie kože, vysoká horúčka, príznaky podobné chrípke, zväčšené lymfatické uzliny (prejavujú závažnej kožnej reakcie),
- výrazné zníženie objemu vylúčeného moču (príznak ťažkostí s obličkami),
- vracanie krvi a/alebo čierna stolica,
- kombinácia ospalosti, bolesti v pravej hornej časti brucha, zožltnutia alebo prehlbujúceho sa žltého sfarbenia kože alebo očí a tmavého moču (príznaky ťažkostí s pečeňou),
- ak sa u Vás vyskytnú ťažkosti pri uvažovaní, zapamätaní si informácií alebo pri riešení problémov alebo ste menej ostražitý alebo nie pri plnom vedomí alebo sa cítite ospalo, bez energie (príznaky vysokej hladiny amoniaku v krvi, ktoré môžu byť spojené s problémami s pečeňou alebo obličkami a vedú k zmenám funkcie mozgu),
- častá bolesť brucha, najmä po jedle alebo po užití Deferasiroxu Teva,
- silná bolesť hornej časti žalúdka (pankreatitída),
- časté pálenie záhy,
- čiastočná strata zraku.

Zapamätajte si: vždy informujte lekára o akomkoľvek vedľajšom účinku, ktorý sa objaví. Ak dôjde k závažnému vedľajšiemu účinku, **PRESTAŇTE** užívať liek a kontaktujte okamžite lekára.

Viac informácií o vedľajších účinkoch a závažných vedľajších účinkoch nájdete v „Písomnej informácii pre používateľa“.

Hlásenie podozrení na vedľajšie účinky

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami priamo na:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie Kvetná 11, 825 08 Bratislava Tel.: + 421 2507 01206 Email: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov.

Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>.

Hlásením podozrení na vedľajšie účinky môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku. Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj spoločnosti TEVA Pharmaceuticals Slovakia, s. r. o. na emailovej adrese safety.sk@teva.ske alebo telefónnom čísle +421 257 267 911.

Iné lieky a Deferasirox Teva

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali, či práve budete užívať ďalšie lieky, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Týka sa to liekov na predpis aj bez predpisu. Lekár možno bude robiť laboratórne vyšetrenia na sledovanie týchto liekov.

Informujte lekára o dôležitých liekoch, ku ktorým patria najmä:

- iné chelátory železa, ktoré sa nesmú užívať s Deferasiroxom Teva,
- antacidá (lieky používané na liečbu pálenia záhy) obsahujúce hliník sa nemajú užívať v rovnakú dennú dobu ako Deferasirox Teva,
- cyklosporín (používa sa, aby telu zabránil odvrhnúť transplantovaný orgán, alebo pri iných ochoreniach, napríklad reumatoidnej artritíde alebo atopickej dermatitíde),
- simvastatín (používa sa na zníženie hladiny cholesterolu),
- niektoré lieky proti bolesti alebo lieky proti zápalu (napríklad aspirín, ibuprofén, kortikosteroidy),
- perorálne bisfosfonáty (používajú sa na liečbu osteoporózy),
- antikoagulanciá (používajú sa na zabránenie alebo liečbu zrážania krvi),
- hormonálna antikoncepcia (lieky na kontrolu pôrodnosti)*,
- bepridil (používa sa na liečbu srdcových ochorení alebo migrény),
- ergotamín (používa sa na liečbu migrény),
- repaglinid (používa sa na liečbu cukrovky),
- rifampicín (používa sa na liečbu tuberkulózy),
- fenytoín, fenobarbital, karbamazepín (používajú sa na liečbu epilepsie),

- ritonavir (používa sa na liečbu infekcie HIV),
- paklitaxel (používa sa na liečbu rakoviny),
- teofylín (používa sa na liečbu ochorení dýchacích ciest, napríklad astmy),
- klozapín (používa sa na liečbu psychických ochorení, napríklad schizofrénie),
- tizanidín (používa sa na uvoľnenie svalstva),
- cholestyramín (používa sa na zníženie hladiny cholesterolu v krvi),
- midazolam (používa sa ako sedatívum a na liečbu úzkosti),
- busulfán (používaný ako liečba pred transplantáciou s cieľom zničiť pôvodnú kostnú dreň pred transplantáciou).

Antikoncepcia

Ak v súčasnosti užívate perorálnu antikoncepciu alebo používate antikoncepčnú náplasť na zabránenie otehotneniu, mali by ste použiť aj ďalší alebo iný typ antikoncepcie (napr. kondóm), pretože Deferasirox Teva môže znížiť účinnosť perorálnej antikoncepcie a antikoncepčnej náplasti.

Moja liečba s Deferasiroxom Teva

Môj cieľ liečby

Cieľom liečby Deferasiroxom Teva je dosiahnuť normálnu hladinu železa v tele. Každý mesiac navštívite vášho lekára, aby ste mohli sledovať, ako liečba zaberá.

Lekár stanoví ciele liečby na základe vyšetrenia hladiny sérového feritínu z krvi. Hladina sérového feritínu (hladina SF) informuje lekára o množstve železa vo vašom tele. Lekár buď chce znížiť alebo udržať vašu hladinu sérového feritínu.

Moja dávka lieku

Lekár môže rozhodnúť o zmene dávky na základe hladiny SF, na základe ďalších laboratórnych výsledkov alebo frekvencie transfúzií.

Po uplynutí 3 až 6 mesiacov užívania Deferasiroxu Teva sa informujte, či liečba pokračuje podľa plánu. V prípade potreby požiadajte lekára o pomoc pri dosahovaní cieľových hodnôt liečby.

Medzi jednotlivými návštevami

Medzi návštevami lekára sa môžu objaviť rôzne dôležité udalosti. Zapište si ich a poradte sa so svojimi lekármi. Môžu to byť napríklad:

- vedľajšie účinky,
- iné lieky,
- každá odchýlka od predpísanej dávky.

Moje základné údaje

Základné informácie o vašom ochorení pomôžu lekárovi aj vám pri plánovaní liečby Deferasiroxom Teva. Ak potrebujete poradiť pri odpovedaní na nižšie uvedené otázky, opýtajte sa lekára.

Základné informácie

Krstné meno

Priezvisko.....

Dátum narodenia.....

Diagnóza.....

Dostával som transfúzie? Ak áno, koľko a ako často?

.....
.....

Mám iné zdravotné ťažkosti?

.....
.....

Užívam v súčasnosti lieky pre iné zdravotné ťažkosti?

.....
.....

Mám alergie?

.....
.....

Začatie liečby Deferasiroxom Teva

Úpravu hladiny železa môžete začať sledovať akonáhle lekár rozhodne o cieľovej hladine SF a dávke Deferasiroxu Teva. Spolu s lekárom vyplňte ciele liečby a ostatné nižšie uvedené informácie.

Dátum: Terajšia hodnota SF:

Môj cieľ liečby je:

Znížiť hladinu SF na:

Moja hmotnosť:

Môj dávkovací režim

Užívam:

Deferasirox Teva filmom obalené tablety

- Koľko tabliet budem denne užívať?

Deferasirox Teva filmom obalené tablety

Prehltam celé tablety

Rozdrvím tablety a nasypem ich na ľahké jedlo, ako je jogurt alebo jablkové pyré a ihneď ich zjem

- Kedy budem liek užívať každý deň?

Poznámky: Zapište si každú poznámku alebo otázku z návštevy.

.....

.....

.....

.....

Poznámka: Pred užitím lieku si prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

