



Priezvisko / Meno

Dátum narodenia

Dátum

1

Diagnostikovali ste u vášho pacienta riziko anafylaktickej reakcie alebo ju už prekonal?

ÁNO

2

Je pacient oboznámený s tým, kedy sa musí adrenalín podať?

ÁNO, a už aj používa EpiPen®/EpiPen® Jr

► Pokračujte 3. KROKOM

ÁNO, ale nepoužíva EpiPen®/EpiPen® Jr

► Pokračujte 2. KROKOM

NIE

► Pokračujte 1. KROKOM

1. KROK: Už ste vysvetlili pacientovi, ako sa správať v prípade kontaktu s alergénom a kedy sa musí adrenalín podať?

ÁNO

► Pokračujte 2. KROKOM

2. KROK: Už ste predstavili EpiPen®/EpiPen® Jr a ukázali presné kroky, ako používať EpiPen®/EpiPen® Jr pomocou cvičnej pomôcky EpiPen®/EpiPen® Jr a premietnutím videa EpiPen®/EpiPen® Jr? (Viac informácií si pozrite na zadnej strane „Ako používať EpiPen®/EpiPen® Jr“)

ÁNO

► Pokračujte 3. KROKOM

3. KROK: Už ste požiadali pacienta, aby vám predviedol manipuláciu s používaním cvičnej pomôcky EpiPen®/EpiPen® Jr?

ÁNO

3

Už ste pacientovi odporučili pravidelne opakovať samoškolenie a zaškoliť aj všetkých najbližších príbuzných a iné osoby, ktoré môžu podávať liek?

ÁNO

4

Už ste odporučili pacientovi nosiť so sebou vždy 2 EpiPeny®/EpiPeny® Jr v prípade, že sa príznaky nezlepšia a bude potrebná druhá dávka?

ÁNO

5

Už ste poradili pacientovi, aby si nastavil pripomienku týkajúcu sa dátumu expirácie EpiPenu®/EpiPenu® Jr tak, aby si včas zaobstaral nový liek?

ÁNO

Ako **POUŽÍVAŤ** EpiPen[®]/ EpiPen[®] Jr.

Vyberte **EpiPen[®]/ EpiPen[®] Jr.** z prenosného puzdra. Ľahnite si s nohami mierne vyloženými nahor, aby ste uľahčili prietok krvi alebo sa posadíte, ak sa vám ťažko dýcha.

- 

Uchopte **EpiPen[®]/ EpiPen[®] Jr.** do dominantnej ruky, pričom palec je umiestnený čo najbližšie k modrému poistnému uzáveru a ruka pevne zvierá EpiPen[®]/EpiPen[®] Jr a vytiahnite modrý poistný uzáver.
Pamätajte si: „Modré do neba, oranžové do stehna.“
- 

EpiPen[®]/ EpiPen[®] Jr. držte vo vzdialenosti približne 10 cm od vonkajšej strany stehna. Oranžový hrot má smerovať k vonkajšej strane stehna.
- 

Prudko narazte **EpiPen[®]/ EpiPen[®] Jr.** do vonkajšej strany stehna tak, aby s vonkajšou stranou stehna zvieral pravý uhol (90 stupňový uhol). Zabodnutý injektor podržte v stehne **3 sekundy**.
- 

EpiPen[®]/ EpiPen[®] Jr. sa má **vytiahnuť** a bezpečne zlikvidovať. Oranžový kryt ihly sa rozšíri, tak že prekryje ihlu.
- 

10 sekúnd jemne masírujte miesto vpichu. Zavolajte 112, požiadajte o sanitku, uveďte „anafylaxia“.

Každý EpiPen[®]/EpiPen[®] Jr sa môže použiť iba raz. Ak sa príznaky nezlepšia, po 5-15 minútach si môžete podať druhý EpiPen[®]/EpiPen[®] Jr.

Ako **UCHOVÁVAŤ** EpiPen[®]/ EpiPen[®] Jr.

- **EpiPen[®]/ EpiPen[®] Jr** uchovávajte pri teplote neprevyšujúcej 25 °C. Neuchovávajte v chladničke ani mrazničke.
- Puzdro uchovávajte vo vonkajšej škatuľke na ochranu pred svetlom. Pri vystavení pôsobeniu vzduchu alebo svetla, sa adrenalín rýchlo znehodnotí a zružovie alebo zhnedne.
- Prosím, nezabudnite z času na čas skontrolovať obsah skleneného zásobníka v autoinjektore **EpiPen[®]/EpiPen[®] Jr**, aby ste sa uistili, že je tekutina stále číra a bezfarebná.
- Nahradte autoinjektor **EpiPen[®]/ EpiPen[®] Jr** po dátume expirácie alebo skôr, ak spozorujete zmenu farby roztoku alebo vznik zrazeniny.



Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie
Kvetná 11, 825 08 Bratislava
Tel: + 421 2 507 01 206
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>.

Hlásením podozrení na nežiaduce účinky prispievate k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Držiteľ rozhodnutia o registrácii tiež prijíma hlásenia podozrení na nežiaduce účinky na mailovej adrese pv.slovakia@viatris.com a/alebo na telefónnom čísle +421 917 337 974.

S otázkami o liečive kontaktujte oddelenie zdravotníckych informácií na čísle +421 232 199 100 alebo mailom na infoslovakia@viatris.com.

Podrobnejšie informácie nájdete v Súhrne charakteristických vlastností lieku / Písomnej informácii pre používateľa, dostupné aj na www.sukl.sk po zadaní názvu lieku do vyhľadávača.