

Erelzi®

Bezpečnostná karta pacienta

Táto Bezpečnostná karta pacienta obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, o ktorých musíte vedieť predtým, ako vám bude podaný liek Erelzi a počas liečby liekom Erelzi. Prosím, opýtajte sa svojho lekára, ak týmto informáciám nerozumiete.

- Ukážte túto kartu každému lekárovi, ktorý sa zúčastňuje vašej liečby.
- Ďalšie informácie si prečítajte v Písomnej informácii pre používateľa.

Použitie u detí a dospelých (s hmotnosťou nižšou ako 62,5 kg)

Erelzi sa nemá používať u detí a dospelých s hmotnosťou nižšou ako 62,5 kg. Prosím, opýtajte sa svojho lekára, ak máte akékoľvek otázky.

Infekcie

Erelzi môže zvyšovať riziko vzniku infekcií, ktoré môžu byť závažné.

- Nesmiete byť liečený liekom Erelzi, ak máte infekciu. Ak si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára.
 - Ak sa u vás vyvinú príznaky infekcie ako horúčka, pretrvávajúci kašeľ, úbytok hmotnosti alebo apatia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Mali by ste byť vyšetrený na tuberkulózu. Požiadajte svojho lekára, aby zaznamenal dátum a výsledky vášho posledného vyšetrenia na tuberkulózu nižšie:

Vyšetrenie: _____

Dátum: _____

Výsledky: _____

Vyšetrenie: _____

Dátum: _____

Výsledky: _____

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Lieky/Bezpečnosť liečiv. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

