

Esmya® 5 mg tablety Karta pacientky

CZ

Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek užívat?

Co je před léčbou, během léčby a po léčbě potřeba?

Tabulka níže vám pomůže sledovat provádění krevních testů:

Známky a příznaky možných problémů s játry

Přípravek Esmya může způsobit nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Jedním z možných nežádoucích účinků je závažné poškození jater. U žen užívajících přípravek Esmya byly hlášeny případy jaterního selhání; malý počet těchto případů si vyžádal transplantaci jater. V této kartě najdete informace o krevních testech, které budete v průběhu léčby podstupovat, a o tom, jak postupovat, jestliže se u Vás objeví nežádoucí účinky související s játry.

Neužívejte přípravek Esmya, jestliže máte problémy s játry. Pokud víte, že máte problémy s játry, nebo pokud máte jakékoli pochybnosti o stavu svých jater, informujte svého lékaře.

Pravidelně prováděné krevní testy

Před zahájením každého léčebného cyklu musíte podstoupit krevní testy, aby se zjistilo, jak Vaše játra fungují. V závislosti na výsledku těchto testů lékař rozhodne, zda je pro Vás léčba přípravkem Esmya vhodná.



Během léčby přípravkem Esmya Vám bude lékař pravidelně provádět krevní testy, aby tak zkontroloval funkci Vašich jater. Tyto testy se musí provádět každý měsíc a také několik týdnů poté, co dokončíte léčebný cyklus (viz rozpis níže). Z těchto krevních testů lékař zjistí informaci o funkci Vašich jater a testy jsou také naprosto nezbytnou součástí sledování Vaší léčby.

	DATUM
1. TEST (před zahájením léčby)	
Zahájení léčby	
2. TEST (4 týdny po zahájení léčby)	
3. TEST (8 týdnů po zahájení léčby)	
4. TEST (12 týdnů po zahájení léčby)	
5. TEST (2–4 týdny po ukončení léčby přípravkem Esmya)	

Pokud zaznamenáte kteroukoli z následujících známek nebo kterýkoli z následujících příznaků, ihned léčbu přerušte a kontaktujte lékaře:

- únava, slabost
- zežloutnutí kůže/bělma očí
- ztmavnutí moči
- bolest v pravé horní části břicha
- svědění
- nauzea (pocit na zvracení)
- zvracení

Lékař ihned provede vyšetření jater a rozhodne, zda můžete v léčbě pokračovat.

product name Esmya	labelling number K-28040-1.2, K-28041-1.3	country code CZ-SK	design code -	plant code -	item code -	version v_01	
colour  CMYK	printing technology	font (size/leading): Helvetica Neue LT W1G (9 pt [10,8 pt])			Studio Mucius Scaevola Kft.		
					date 2021.01.19.		
					made by SZTANCS Réka		
packaging material 60g/m ²	size 210 x 297 (±0,5)/52,5 x 88 (±1) mm	technical drawing PIL_RTU_52,5x88_210x297_temp	/Page01		supervised technical drawing by HORVÁTH Gyózó.	date 2018.06.20.	

Čo potrebujete vedieť skôr, ako užijete esmyu?

Čo robiť pred liečbou, v jej priebehu a po nej?

Tabuľka nižšie vám pomôže sledovať vaše krvné testy:

Známky a príznaky možných problémov s pečeňou

 GEDEON RICHTER

Tablety Esmya® 5 mg Karta pre pacientku

SK

Esmya môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavajú u každého. Jedným z možných vedľajších účinkov je závažné poškodenie pečene. U žien užívajúcich Esmyu boli hlásené prípady zlyhania pečene; v malom počte týchto prípadov bola potrebná transplantácia pečene. Táto karta obsahuje informácie o krvných testoch, ktoré budete musieť v priebehu liečby podstúpiť, a o postupe v prípade rozvoja vedľajších účinkov spojených s pečeňou.

Neužívajte Esmyu, ak máte problémy s pečeňou.
Informujte svojho lekára, ak máte problémy s pečeňou alebo ak si nie ste istá stavom svojej pečene.

Podstupovať pravidelné krvné testy

Pred začatím každého liečebného cyklu budete musieť podstúpiť krvné testy s cieľom overiť funkciu vašej pečene. V závislosti od výsledku týchto testov sa lekár rozhodne, či je pre vás liečba Esmyou vhodná.

V priebehu liečby Esmyou bude váš lekár vykonávať pravidelné krvné testy, aby skontroloval funkciu vašej pečene. Tieto testy je nutné vykonávať každý mesiac a následne niekoľko týždňov po dokončení liečebného cyklu (pozri harmonogram nižšie). Tieto krvné testy ukážu lekárovi funkciu vašej pečene a sú pri sledovaní vašej liečby zásadné.

	DÁTUM
1. TEST (pred začatím liečby)	
Začatie liečby	
2. TEST (4 týždne po začatí liečby)	
3. TEST (8 týždňov po začatí liečby)	
4. TEST (12 týždňov po začatí liečby)	
5. TEST (2 – 4 týždne po ukončení liečby Esmyou)	



Ak spozorujete akékoľvek z nasledujúcich známkov alebo príznakov, ukončíte liečbu a ihneď sa obráťte na svojho lekára:

- vyčerpanosť, ťažká únava
- zožltnutie kože/očí
- tmavý moč
- bolesť v pravej hornej časti brucha
- svrbenie
- nevoľnosť
- vracanie

Lekár by mal ihneď skontrolovať vašu pečeň a rozhodnúť, či môžete pokračovať v liečbe.

K-28040-1.2, K-28041-1.3

esmya®
Ulipristal acetate

product name Esmya	labelling number K-28040-1.2, K-28041-1.3	country code CZ-SK	design code -	plant code -	item code -	version v_01	
colour 	printing technology	font (size/leading): Helvetica Neue LT W1G (9 pt [10,8 pt])			Studio Mucius Scaevola Kft.		
					date 2021.01.19.		
					made by SZTANCS Réka		
packaging material 60g/m ²	size 210 x 297 (±0,5)/52,5 x 88 (±1) mm	technical drawing PIL_RTU_52,5x88_210x297_temp	/Page02		supervised technical drawing by HORVÁTH Győző.		date 2018.06.20.