

Liek Increlex® - návod na použitie

Increlex® sa má podávať pomocou sterilných jednorazových injekčných striekačiek a injekčných ihliel.


Príprava dávky:

1. Umyte si ruky

Pred prípravou lieku Increlex® na podanie injekcie si umyte ruky.


2. Použite novú injekčnú ihlu a injekčnú striekačku

Pri každom podávaní dávky použite novú injekčnú ihlu a injekčnú striekačku.




3. Príprava injekčnej striekačky

Skontrolujte tekutinu, aby ste sa uistili, že je číra a bezfarebná – **nepoužívajte** ju, ak je zakalená alebo v nej vidíte častice a nepoužívajte ju po dátume expirácie. Ak používate novú injekčnú liekovku, odstráňte ochranné viečko, ale neodstraňujte gumovú zátku, ktorú je potrebné poutierať tampónom namočeným v alkohole, aby sa predišlo kontaminácii.




4. Do injekčnej liekovky vstreknite vzduch

Skôr ako do injekčnej liekovky vsuniete injekčnú ihlu, potiahnite piestik dozadu, aby ste do injekčnej striekačky dostali vzduch v množstve zodpovedajúcom dávke lieku Increlex®. Injekčnú ihlu vsuňte cez gumovú zátku injekčnej liekovky a zatlačte piestik, čím do injekčnej liekovky vstreknete vzduch.



5. Natiahnutie dávky

Injekčnú striekačku ponechajte v injekčnej liekovke a obe otočte hornou časťou nadol. Injekčnú striekačku a injekčnú liekovku držte pevne. Skontrolujte, či je špička injekčnej ihly v tekutine a potiahnutím piestika natiahnite do injekčnej striekačky správnu dávku.



6. Odstráňte vzduchové bubliny a injekčnú striekačku doplňte

Skôr ako z injekčnej liekovky vyberiete injekčnú ihlu, skontrolujte, či v injekčnej striekačke nie sú vzduchové bubliny. Ak sa v injekčnej striekačke nachádzajú vzduchové bubliny, injekčnú striekačku držte rovno hore a poklepávajte na bočnú stranu injekčnej striekačky, kým bubliny nevyplávajú nahor. Piestikom vytlačte bubliny z injekčnej striekačky a naťahujte tekutinu, kým sa nedosiahne správna dávka.



7. Pripravené na podanie injekcie

Z injekčnej liekovky vytiahnite injekčnú ihlu. Injekčnou ihlou sa ničoho nedotýkajte. Teraz je všetko pripravené na podanie injekcie.


Vstreknutie dávky:


Liek Increlex® podajte injekčne podľa pokynov detského lekára.

Injekciu lieku Increlex® nepodávajte, ak vaše dieťa nie je schopné zjesť jedlo do 20 minút pred podaním injekcie alebo po ňom.

8. Vyberte miesto podania injekcie

Vyberte miesto podania injekcie – horná časť ramena, stehno, sedací sval alebo brucho. Miesto podania injekcie sa musí pri každej injekcii meniť.





9. Injekčné podanie dávky

Miesto na koži kde chcete vášmu dieťaťu podať injekciu očistite pomocou alkoholu alebo mydla a vody. Miesto podania injekcie musí byť pred jej podaním suché.

Jemne napichnite kožu. Injekčnú ihlu vsuňte tak, ako vám to detský lekár predviedol. Uvoľnite kožu.

Pomaly zatlačajte piestik injekčnej striekačky až do konca a uistite sa, či ste podali celý objem tekutiny.



10. Injekčnú ihlu vytiahnite von priamo a jemne zatlačte (netrite) gázou alebo vatou.

Injekčnú ihlu vytiahnite von priamo a jemne zatlačte na miesto podania injekcie u vášho dieťaťa na niekoľko sekúnd gázou alebo vatou.

Oblasť netrite!

Na injekčnú striekačku nenasadzujte kryt. Použitá injekčná ihla a injekčná striekačka sa musia umiestniť do nádoby na ostré predmety, ktorá sa má uzavrieť a správne zlikvidovať.

Hlásenie vedľajších účinkov

Ak máte podozrenie, že sa u vášho dieťaťa vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa. Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami priamo na: Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava tel.: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/ Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: "<https://portal.sukl.sk/eskadra/>".

Hlásením podozrení na vedľajšie účinky môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.



increlex®
mekasermin

Ďalšie informácie si prečítajte v Písomnej informácii pre používateľa lieku Increlex® alebo sa porozprávajte so svojim lekárom alebo zdravotnou sestrou.



✿ Liek Increlex® sa má podávať dvakrát denne.



✿ Liek Increlex® sa má podávať krátko pred jedlom alebo hneď po ňom (do 20 minút).



✿ Ak dávku lieku Increlex® nie je možné podať krátko pred jedlom alebo hneď po ňom, táto dávka lieku Increlex® sa má vynechať.




✿ Pri každej dávke použite iné miesto podania injekcie na koži.



✿ Ak sa dávka vynechá, nasledujúce dávky sa nesmú nikdy zvýšiť, aby bola nahradená jedna alebo viacero vynechaných dávok. Ďalšia dávka sa má podať vo zvyčajnom čase.

2°C - 8°C



✿ Liek Increlex® sa má uchovávať v chladničke, ale NESMIE sa uchovávať v mrazničke.



increlex®
mekasermin

Návod na použitie

Táto písomná informácia slúži ako rýchly návod na prípravu a injekčné podanie lieku Increlex®

Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. To umožní rýchle získanie nových informácií o bezpečnosti. Môžete prispieť tým, že nahlásite akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré sa u vášho dieťaťa objavia. Spôsob akým hlásiť vedľajšie účinky si pozrite na www.sukl.sk.

Informačný materiál ako je uvedený v rozhodnutí o registrácii lieku Increlex®. Pred použitím lieku Increlex® si vždy prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.



increlex®
mekasermin