

LIEČBA KINERETOM[®]

Meno pacienta:

Meno rodiča alebo zákonného zástupcu (u detí):

Pacientova dávka:

Meno a telefónne číslo lekára:

Dôležité bezpečnostné informácie týkajúce sa Stillovej choroby

Syndróm aktivácie makrofágov (*macrophage activation syndrome*, MAS) je závažnou komplikáciou Stillovej choroby. Ak sa MAS nelieči, môže ohroziť život. Riziko rozvoja MAS je vyššie, ak máte infekciu alebo ak sú vaše príznaky Stillovej choroby nedostatočne kontrolované. Príznakmi MAS môžu byť napr. pretrvávajúca vysoká horúčka, opuch lymfatických uzlín a pretrvávajúca vyrážka.

Kineret® (anakinra) môže zvýšiť riziko závažnej infekcie. Príznakmi môžu byť pretrvávajúca vysoká horúčka, triaška, kašeľ, bolesť hlavy a sčervenanie a bolestivosť kože. Príznakmi infekcie môže byť aj pretrvávajúca slabá horúčka, strata telesnej hmotnosti a pretrvávajúci kašeľ.

Ak sa u vás vyvinú prejavy infekcie alebo ak dôjde k zhoršeniu príznakov Stillovej choroby, čo najskôr sa obráťte na vášho lekára.