ALGORITMUS IMPLEMENTÁCIE PROGRAMU PREVENCIE TEHOTENSTVA (PPT)

Hodnotenie nového pacienta

Muž

Začnite liečbu Lenalidomidom Glenmark.

Ak je partnerka tehotná alebo môže otehotnieť a nepoužíva účinnú metódu antikoncepcie, musí muž používať kondóm počas celej liečby, ako aj počas prerušenia liečby a ešte 1 týždeň po ukončení liečby Lenalidomidom Glenmark (aj v prípade, že podstúpil vazektómiu).

Žena

Žena, ktorá nemôže otehotnieť

- vek ≥ 50 rokov a prirodzená amenorea ≥1 rok (amenorea po onkologickej liečbe alebo počas laktácie nevylučuje plodnosť)
- predčasné zlyhanie funkcie vaječníkov potvrdené gynekológom
- bilaterálna salpingoooforektómia alebo hysterektómia v anamnéze
- genotyp XY, Turnerov syndróm alebo agenéza maternice.

Začnite liečbu Lenalidomidom Glenmark.

Nevyžadujú sa antikoncepčné opatrenia ani tehotenské testy.

Žena, ktorá môže otehotnieť

Ak v súčasnosti nepoužíva účinnú metódu antikoncepcie, je potrebné včas začať s vhodnou antikoncepciou podľa zvolenej metódy a menštruačného cyklu. Buď sa žena zaviaže k úplnej a nepretržitej sexuálnej abstinencii alebo:

- implantát, vnútromaternicové teliesko uvoľňujúce levonorgestrel, depotný medroxyprogesterónacetát, sterilizácia podviazaním vajíčkovodov, partner je po vazektómii, tabletky na inhibíciu ovulácie obsahujúce iba progesterón (t.j. dezogestrel).
- antikoncepčná metóda sa musí dodržiavať počas liečby, vrátane prerušenia liečby a ešte 4 týždne po ukončení liečby.

Tehotenské testy po 4 týždňoch používania účinnej antikoncepčnej metódy

Negatívny výsledok

Začnite liečbu Lenalidomidom Glenmark.

Tehotenské testy v 4 týždňových intervaloch (aj pri sexuálnej abstinencii).

Pozitívny výsledok

NEZAČÍNAJTE LIEČBU.
Odporučiť k náležite zaškolenému špecialistovi.