

EDUKAČNÝ MATERIÁL PRE PACIENTA
K LIEKU LENALIDOMID GLENMARK

RMP V1.1, 05-Aug-2020

Revízia ŠÚKL: 08/2021

Číslo materiálu: EM/SK/LEN/2021.01

PRÍRUČKA PRE PACIENTA

UŽÍVAJÚCEHO LENALIDOMID GLENMARK NA LIEČBU MNOHOPOČETNÉHO MYELÓMU




glenmark



1. Súhrn.....	2
2. Informácie pre všetkých pacientov týkajúce sa bezpečnosti.....	4
3. Informácie pre ženy, ktoré môžu otehotnieť.....	8
4. Informácie pre ženy, ktoré nemôžu otehotnieť.....	11
5. Informácie pre mužov.....	12
6. Čo máte povedať svojmu lekárovi pred začatím liečby Lenalidomidom Glenmark.....	13
7. Ako máte váš liek užívať.....	14
8. Požiadavky po ukončení liečby.....	16

1. SÚHRN

- Lenalidomid Glenmark je názov lieku obsahujúceho liečivo lenalidomid.
- Štúdie na zvieratách preukázali, že lenalidomid spôsobuje vrodené chyby a očakáva sa, že jeho účinky budú u ľudí podobné.
- Očakáva sa, že užívanie Lenalidomidu Glenmark môže poškodiť plod.
- Lenalidomid Glenmark nesmú nikdy užívať tehotné ženy ani ženy, ktoré môžu otehotnieť.
- Muži užíajúci Lenalidomid Glenmark musia používať kondóm počas pohlavného styku s tehotnou ženou alebo so ženou, ktorá môže otehotnieť a nepoužíva účinnú antikoncepciu počas liečby muža Lenalidomidom Glenmark alebo týždeň po skončení jeho liečby.
- Ľudia užíajúci Lenalidomid Glenmark nesmú darovať krv počas liečby a ešte týždeň po jej ukončení.
- Lenalidomid Glenmark nikdy nedávajte nikomu inému.
- Nepoužité kapsuly Lenalidomidu Glenmark vráťte čo najskôr lekárnikovi, aby ich bezpečne zlikvidoval.

Okamžite musíte informovať svojho lekára, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak je vaša partnerka tehotná.

Tak ako všetky lieky, aj Lenalidomid Glenmark môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré sa vyskytujú častejšie ako ostatné a niektoré sú závažnejšie než ostatné. Ak sa u vás vyskytnú ťažkosti spomínané nižšie, musíte ihneď vyhľadať svojho lekára alebo zdravotníckych pracovníkov (podrobnejšie informácie o týchto a iných vedľajších účinkoch nájdete v tejto príručke). Najčastejším závažným vedľajším účinkom Lenalidomidu Glenmark je zníženie počtu bielych krviniek, ktoré bojujú proti infekcii a tiež počtu krvných doštičiek, ktoré pomáhajú zrážať krv. Z tohto dôvodu vám lekár urobí krvné testy, ktoré podstúpíte každý týždeň najmenej po dobu prvých 8 týždňov liečby. Lenalidomid Glenmark môže tiež zapríčiniť tromboembolické príhody (zrazeniny krvi v žilách a tepnách).

Okamžite musíte informovať svojho lekára, ak sa necítite dobre alebo sa u vás vyskytne niečo z nasledovného:

- horúčka, zimnica, bolesť hrdla, kašeľ, vredy v ústach alebo akékoľvek iné príznaky infekcie,
- krvácanie alebo modriny bez predošlého poranenia,
- bolesť na hrudi alebo bolesti nôh,
- dýchavičnosť,
- akékoľvek iné príznaky, ktoré vás znepokojujú,
- ak máte akékoľvek rizikové faktory pre vznik tromboembolických príhod, napr. fajčenie, vysoký tlak krvi, vysoký cholesterol, poruchu zrážania krvi, alebo ste mali zrazeninu krvi v minulosti (v žile alebo tepne), musíte to povedať lekárovi.

Ak potrebujete viac informácií alebo vysvetlenie niektorých pojmov uvedených v tejto príručke, spýtajte sa, prosím, svojho lekára alebo zdravotnej sestry.

INFORMÁCIE PRE VŠETKÝCH PACIENTOV TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

2. INFORMÁCIE PRE VŠETKÝCH PACIENTOV TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

Lenalidomid Glenmark nesmiete nikdy užívať:

- ak ste tehotná,
- ak dojčíte,
- ak ste žena, ktorá môže otehotnieť, aj v prípade, že tehotenstvo neplánujete. Ak môžete otehotnieť, musíte používať účinné metódy antikoncepcie už 4 týždne pred liečbou Lenalidomidom Glenmark, počas celej liečby a ešte 4 týždne po jej ukončení,
- ak ste alergický na lenalidomid alebo na ktorúkoľvek z ďalších zložiek tohto lieku.

Lenalidomid Glenmark môže poškodiť plod.

- Lenalidomid je štruktúrou podobný talidomidu, o ktorom je známe, že spôsobuje závažné, život ohrozujúce vrodené chyby.
- Ak je plod vystavený účinku lenalidomidu počas tehotenstva, je pravdepodobné, že bude poškodený.

Ženy

Ak sa Lenalidomid Glenmark užíva počas tehotenstva, očakávajú sa závažné, život ohrozujúce vrodené chyby. Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, nesmiete užívať Lenalidomid Glenmark. Aj keď nemáte pravidelnú menštruáciu alebo ste v menopauze, stále môžete otehotnieť.

Ak si počas užívania Lenalidomidu Glenmark alebo ešte 4 týždne po ukončení liečby z akéhokoľvek dôvodu myslíte, že môžete byť tehotná, musíte ihneď prestať Lenalidomid Glenmark užívať a vyhľadajte svojho lekára.

INFORMÁCIE PRE VŠETKÝCH PACIENTOV TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

Muži

Lenalidomid prechádza do spermy. Ak je vaša partnerka tehotná alebo môže otehotnieť a nepoužíva účinnú antikoncepciu, musíte používať kondóm počas celej liečby, počas prerušenia liečby a ešte týždeň po jej ukončení, a to aj v prípade, že ste podstúpili vazektómiu (chirurgické odstránenie semeno-vodu vedúce k neplodnosti).

Ak vaša partnerka otehotnie počas vašej liečby Lenalidomidom Glenmark alebo 4 týždne po skončení liečby, musíte vyhľadať svojho lekára.

Vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Lenalidomid Glenmark môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Niektoré sa vyskytujú častejšie ako ostatné a niektoré sú závažnejšie než ostatné. Uvedené nie sú všetky vedľajšie účinky, ktoré boli zaznamenané počas liečby lenalidomidom. Ak si prajete viacej informácií, opýtajte sa svojho lekára alebo lekárnika.

Takmer všetky vedľajšie účinky sú dočasné a je možné im ľahko predchádzať alebo ich liečiť. Najdôležitejšie je, aby ste si boli vedomý, čo možno očakávať a čo treba hlásiť svojmu lekárovi. Je dôležité, aby ste informovali svojho lekára, ak sa u vás počas liečby Lenalidomidom Glenmark vyskytnú akékoľvek vedľajšie účinky. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ulica 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel.: + 421 2 507 01 206, Fax: + 421 2 507 01 237, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Lieky/Bezpečnosť liečiv.

Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>.

Závažné vedľajšie účinky a na čo si musíte dávať pozor:

Nízky počet bielych krviniek a krvných doštičiek

Najčastejším závažným vedľajším účinkom lenalidomidu je zníženie počtu bielych krviniek, ktoré bojujú proti infekcii a zníženie počtu krvných doštičiek, ktoré pomáhajú zrážať krv. Z tohto dôvodu vám lekár urobí krvné testy, ktoré podstúpíte každý týždeň najmenej po dobu prvých 8 týždňov liečby. Lenalidomid Glenmark môže tiež zapríčiniť tromboembolické príhody (zrazeniny krvi v žilách a tepnách).

INFORMÁCIE PRE VŠETKÝCH PACIENTOV TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

Okamžite musíte kontaktovať svojho lekára, ak sa u vás vyskytne niečo z nasledovného:

- horúčka, zimnica, bolesť hrdla, kašeľ, vredy v ústach alebo akékoľvek iné príznaky infekcie,
- krvácanie alebo modriny bez predošlého poranenia,
- bolesť na hrudi alebo bolesti nôh,
- akékoľvek iné príznaky, ktoré vás znepokojujú,
- ak máte akékoľvek rizikové faktory pre vznik tromboembolických príhod, napr. fajčenie, vysoký tlak krvi, vysoký cholesterol, poruchu zrážania krvi, alebo ste mali zrazeninu krvi v minulosti (v žile alebo tepne), musíte to povedať lekárovi.

Krvné zrazeniny v žilách alebo tepnách a v pľúcach

Liečba Lenalidomidom Glenmark môže zvyšovať riziko výskytu zrazenín krvi v niektorých žilách alebo tepnách v tele („tromboembolické príhody“). U ľudí s myelómom je už toto riziko vzniku zrazenín krvi zvýšené. Príznakmi vzniku krvnej zrazeniny môžu byť bolesti nôh, opuch a začervenanie v dolnej časti nôh alebo na ramenách. Tieto môžu byť spôsobené vznikom krvnej zrazeniny v žilách na nohách (hlboká žilová trombóza). Niekedy sa môže zrazenina uvoľniť a krvným obehom dostať do pľúc, čo sa prejaví bolesťou na hrudi a dýchavičnosťou. Akákoľvek bolesť na hrudi šíriaca sa do ramena, krku, čeluste, chrbta alebo brucha, potenie a dýchavičnosť (prejavy „pľúcnej embólie“), nevoľnosť alebo vracanie môžu byť príznakmi upchatia tepny krvnou zrazeninou (tieto môžu byť príznakmi srdcového záchvatu alebo „infarktu myokardu“). Lekár vám môže predpísať liečbu, ktorá pomáha predchádzať tvorbe krvných zrazenín.

Ak máte akékoľvek rizikové faktory pre vznik tromboembolických príhod, napr. fajčenie, vysoký tlak krvi, vysoký cholesterol, poruchu zrážania krvi, alebo ste mali zrazeninu krvi v minulosti (v žile alebo tepne), musíte to povedať lekárovi.

INFORMÁCIE PRE VŠETKÝCH PACIENTOV TÝKAJÚCE SA BEZPEČNOSTI

Okamžite musíte vyhľadať svojho lekára ak sa u vás vyskytne niečo z nasledovného:

- bolesť na hrudi alebo sťažené dýchanie,
- bolesť alebo opuch rúk alebo nôh,
- akékoľvek iné príznaky, ktoré vás znepokojujú.

Ďalšie vedľajšie účinky spojené s liečbou lenalidomidom sú:

- krče alebo ochabnutosť svalov,
- hnačka,
- zápcha,
- vyrážky,
- nauzea (nevoľnosť, nutkanie na vracanie),
- únava,
- znížená chuť do jedla,
- edém (opuch),
- rozmazané videnie.

Nezabúdajte, takmer všetky vedľajšie účinky sú dočasné a je možné im ľahko predchádzať alebo ich liečiť. Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek vedľajšie účinky, ktoré vás znepokojujú, vyhľadajte svojho lekára.

Osobitné sledovanie

Počas liečby vám budú pravidelne kontrolovať krvný obraz, pretože Lenalidomid Glenmark môže spôsobiť pokles počtu bielych krviniek a krvných doštičiek. Váš lekár bude tiež sledovať funkciu vašich obličiek. Krvné testy vám budú robiť častejšie počas prvých mesiacov liečby.

Na základe výsledkov krvných testov a vášho celkového zdravotného stavu vám môže váš lekár upraviť dávku Lenalidomidu Glenmark alebo ukončiť liečbu. Ak je z akéhokoľvek dôvodu nutné liečbu ukončiť, váš lekár s vami prediskutuje iné možnosti liečby.

INFORMÁCIE PRE ŽENY, KTORÉ MÔŽU OTEHOTNIEŤ

3. INFORMÁCIE PRE ŽENY, KTORÉ MÔŽU OTEHOTNIEŤ

Očakáva sa, že užívanie Lenalidomidu Glenmark môže poškodiť plod.

- Štúdie na zvieratách preukázali, že Lenalidomid Glenmark spôsobuje vrodené chyby a očakáva sa, že jeho účinky budú u ľudí podobné.
- Ak je plod vystavený účinku Lenalidomidu Glenmark počas tehotenstva, je pravdepodobné, že bude poškodený.
- Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, nesmiete užívať Lenalidomid Glenmark.
- Niektoré ženy, ktoré nemajú pravidelnú menštruáciu, alebo ktoré sú v menopauze, stále ešte môžu otehotnieť.
- Každá žena, ktorá môže otehotnieť, i keď to neplánuje, sa musí riadiť opatreniami podrobne opísanými v tejto časti, ktoré jej pomôžu predchádzať otehotneniu a vylúčia možnosť tehotenstva. Podpísaním formuláru Súhlas pacienta s liečbou sa zaväzujete, že sa budete riadiť týmito opatreniami.
- Liečbu Lenalidomidom Glenmark musíte začať čo najskôr po potvrdení negatívneho výsledku tehotenského testu.

Ak si počas užívania Lenalidomidu Glenmark alebo ešte 4 týždne po ukončení liečby z akéhokoľvek dôvodu myslíte, že môžete byť tehotná, musíte ihneď prestať Lenalidomid Glenmark užívať a vyhľadať svojho lekára.

Pred začatím liečby Lenalidomidom Glenmark sa musíte poradiť so svojim lekárom, či je u vás možnosť otehotnieť alebo nie. Niektoré ženy, ktoré nemajú pravidelnú menštruáciu alebo ktoré sú v menopauze, môžu ešte otehotnieť.

INFORMÁCIE PRE ŽENY, KTORÉ MÔŽU OTEHOTNIET

Pokiaľ nepatríte do niektorej z nasledovných kategórií, musíte sa riadiť Programom prevencie tehotenstva opísaným v tejto časti:

- Máte ≥ 50 rokov a prešiel minimálne jeden rok od vašej poslednej menštruácie (ak vám skončila menštruácia kvôli onkologickej liečbe, potom existuje stále možnosť otehotnenia).
- Bola vám odstránená maternica (hysterektómia).
- Boli vám odstránené vajíčkovody a obidva vaječníky (bilaterálna salpingooforektómia).
- Predčasné zlyhanie vaječníkov potvrdené gynekológom.
- Máte genotyp XY, Turnerov syndróm alebo agenézu maternice.

Možno bude potrebné vyšetrenie a testy u gynekológa pre potvrdenie, že nemôžete otehotnieť. Každá žena, ktorá môže otehotnieť, i keď to neplánuje, sa musí riadiť opatreniami podrobne opísanými v tejto časti.

Antikoncepčné opatrenia

Ak ste žena, ktorá by mohla otehotnieť, musíte:

- používať vhodné antikoncepčné opatrenia už 4 týždne pred začatím liečby a počas liečby Lenalidomidom Glenmark, počas každej prestávky v liečbe Lenalidomidom Glenmark a ešte 4 týždne po skončení liečby Lenalidomidom Glenmark.

ALEBO

- sa vyhnúť pohlavnému styku v období 4 týždňov pred začatím liečby a počas liečby Lenalidomidom Glenmark, počas každej prestávky v liečbe Lenalidomidom Glenmark a ešte 4 týždne po skončení liečby Lenalidomidom Glenmark. Každý mesiac musíte potvrdiť svojmu lekárovi, že ste sa vyhli pohlavnému styku.

Nie všetky antikoncepčné metódy sú vhodné počas liečby Lenalidomidom Glenmark. Vy a váš partner sa musíte poradiť so svojím lekárom o vhodnej antikoncepčnej metóde, ktorá bude pre oboch prijateľná. Ak to bude potrebné, váš lekár vám môže odporučiť špecialistu, s ktorým sa poradíte o vhodnej antikoncepčnej metóde.

INFORMÁCIE PRE ŽENY, KTORÉ MÔŽU OTEHOTNIEŤ

Tehotenské testy na vylúčenie tehotenstva

- Ak ste žena, ktorá môže otehotnieť, musíte absolvovať tehotenský test, aby sa vylúčilo tehotenstvo pred začatím liečby Lenalidomidom Glenmark.
- Tehotenské testy sa budú pravidelne opakovať každé 4 týždne počas vašej liečby, aby sa vylúčilo tehotenstvo.
- Ďalší predpis Lenalidomidu Glenmark vám nebude vydaný, pokiaľ nebude vylúčené tehotenstvo.
- Tehotenské testy budú absolvované pod dohľadom lekára alebo zdravotnej sestry.
- Ak ste podstúpili sterilizáciu podviazaním vajčkovodov, nemusíte absolvovať tehotenské testy.

Pri každom predpísaní lieku váš lekár vyplní Formulár pre lekára - oprávnenie preskripcie, aby potvrdil, že plod nie je vystavený účinku Lenalidomidu Glenmark. Tento formulár potvrdzuje, že ste súhlasili s liečbou Lenalidomidom Glenmark a že vám lekár povedal o rizikách pre plod a opatreniach, ktoré musíte dodržiavať. Liek si musíte vyzdvihnúť v lekárni do 7 dní odo dňa vydania receptu. Inak budete potrebovať nový recept od svojho lekára.

INFORMÁCIE PRE ŽENY, KTORÉ NEMÔŽU OTEHOTNIEŤ

4. INFORMÁCIE PRE ŽENY, KTORÉ NEMÔŽU OTEHOTNIEŤ

Očakáva sa, že užívanie Lenalidomidu Glenmark môže poškodiť plod.

- Štúdie na zvieratách preukázali, že lenalidomid spôsobuje vrodené chyby a očakáva sa, že jeho účinky budú u ľudí podobné.
- Ak je plod vystavený účinku Lenalidomidu Glenmark počas tehotenstva, je pravdepodobné, že bude poškodený.
- Pred začatím liečby Lenalidomidom Glenmark sa musíte poradiť so svojím lekárom, či môžete otehotnieť alebo nie.
- Niektoré ženy, ktoré nemajú pravidelnú menštruáciu alebo ktoré sú v menopauze, stále môžu otehotnieť.
- Môže byť potrebné, aby ste navštívili gynekológa a podstúpili testy na vylúčenie tehotenstva.
- Každá žena, ktorá môže otehotnieť, i keď to neplánuje, sa musí riadiť opatreniami podrobne opísanými v časti „Informácie pre ženy, ktoré môžu otehotnieť“.

Ste považovaná za ženu, ktorá nemôže otehotnieť, ak spadáte do niektorej z nasledujúcich kategórií:

- Máte ≥ 50 rokov a prešiel minimálne jeden rok od vašej poslednej menštruácie (ak vám skončila menštruácia kvôli onkologickej liečbe, potom existuje stále možnosť otehotnenia).
- Bola vám odstránená maternica (hysterektómia).
- Boli vám odstránené vajíčkovody a obidva vaječníky (bilaterálna salpingooforektómia).
- Predčasné zlyhanie vaječníkov potvrdené gynekológom.
- Máte genotyp XY, Turnerov syndróm alebo agenézu maternice.

Pri každom predpísaní lieku váš lekár vyplní Formulár pre lekára - oprávnenie preskripcie, aby potvrdil, že plod nie je vystavený účinku Lenalidomidu Glenmark. Tento formulár potvrdzuje, že ste súhlasili s liečbou Lenalidomidom Glenmark a že vám lekár povedal o rizikách pre plod a opatreniach, ktoré musíte dodržiavať. Liek si musíte vyzdvihnúť v lekárni do 7 dní odo dňa vydania receptu. Inak budete potrebovať nový recept od svojho lekára.

5. INFORMÁCIE PRE MUŽOV

Očakáva sa, že užívanie Lenalidomidu Glenmark môže poškodiť plod.

- Štúdie na zvieratách preukázali, že lenalidomid spôsobuje vrodené chyby a očakáva sa, že jeho účinky budú u ľudí podobné.
- Ak je plod vystavený účinku Lenalidomidu Glenmark počas tehotenstva, je pravdepodobné, že bude poškodený.
- Lenalidomid prechádza do spermy.
- Ak je vaša partnerka tehotná alebo môže otehotnieť a nepoužíva účinnú antikoncepciu, musíte vy používať kondóm počas každého pohlavného styku.
- Aj v prípade, že ste podstúpili vazektómiu musíte používať kondóm počas liečby Lenalidomidom Glenmark, počas každej prestávky v liečbe Lenalidomidom Glenmark a ešte 1 týždeň po ukončení liečby.
- Ak vaša partnerka napriek tomu otehotnie počas vašej liečby Lenalidomidom Glenmark, musíte ihneď vyhľadať svojho lekára a vaša partnerka musí kontaktovať svojho gynekológa.

Pri každom predpísaní lieku váš lekár vyplní Formulár pre lekára - oprávnenie preskripcie, aby potvrdil, že plod nie je vystavený účinku Lenalidomidu Glenmark. Tento formulár potvrdzuje, že ste súhlasili s liečbou Lenalidomidom Glenmark a že vám lekár povedal o rizikách pre plod a opatreniach, ktoré musíte dodržiavať. Liek si musíte vyzdvihnúť v lekárni do 7 dní odo dňa vydania receptu. Inak budete potrebovať nový recept od svojho lekára.

ČO MÁTE POVEDAŤ SVOJMU LEKÁROVI PRED ZAČATÍM LIEČBY LENALIDOMIDOM GLENMARK

6. ČO MÁTE POVEDAŤ SVOJMU LEKÁROVI PRED ZAČATÍM LIEČBY LENALIDOMIDOM GLENMARK

- Ak ste tehotná, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotnieť, pretože Lenalidomid Glenmark môže poškodiť plod.
- Ak si myslíte, že môžete otehotnieť a potrebujete poradiť účinnú antikoncepciu.
- Ak dojčíte.
- Ak ste mali v minulosti alergickú (hypersenzitívnu) reakciu na lenalidomid.
- Ak ste mali v minulosti alergickú (hypersenzitívnu) reakciu na ktorúkoľvek zložku Lenalidomidu Glenmark. Poradte sa so svojím lekárnikom.
- Ak sa u vás v minulosti vyskytli ťažkosti s obličkami.
- Ak ste mali v minulosti trombózu (krvné zrazeniny).
- Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis.

7. AKO MÁTE VÁŠ LIEK UŽÍVAŤ

Váš lekárnik vám pomôže a poradí ako máte liek užívať. Niektorým ľuďom pomôže, keď si každý deň, keď užijú liek, vyznačia do kalendára alebo si nastaví alarm na hodinách, ktorý im pripomenie, že majú liek užiť.

Lenalidomid Glenmark

- Váš lekár vám predpíše vhodnú dávku Lenalidomidu Glenmark.
- Pri liečbe mnohopočetného myelómu sa užíva lenalidomid spolu s dexametazónom. Vždy užívajte kombináciu lenalidomidu a dexametazónu presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom. Ďalšie informácie o použití a účinkoch dexametazónu nájdete v písomnej informácii pre používateľa dexametazónu.
- Váš lekár vám môže upraviť dávku podľa výsledkov vašich krvných testov a vedľajších účinkov lieku, ktoré sa u vás vyskytnú.
- Neužívajte viac kapsúl, než vám predpísal váš lekár. Ak si nie ste istý, poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
- Lenalidomid Glenmark kapsuly sa majú prehĺtať celé a majú sa zapíť vodou.
- Lenalidomid Glenmark sa môže užívať kedykoľvek počas dňa, ale vždy v približne rovnakom čase.
- Lenalidomid Glenmark sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.

Dávka Lenalidomidu Glenmark pri liečbe mnohopočetného myelómu

Odporúčaná dávka je 25 mg jedenkrát denne. Lenalidomid Glenmark sa užíva v liečebných cykloch, z ktorých každý trvá 28 dní.

Cyklus liečby:

- V 1. - 21. deň: užijete 25 mg Lenalidomidu Glenmark jedenkrát denne.
- V 22. - 28. deň: NEUŽIJETE Lenalidomid Glenmark.

Po skončení každého cyklu, začnete ďalší cyklus.

AKO MÁTE VÁŠ LIEK UŽÍVAŤ

Dexametazón

Zvyčajná začiatková dávka je 40 mg jedenkrát denne. Dexametazón sa tiež užíva v liečebných cykloch, z ktorých každý trvá 28 dní.

Prvé 4 cykly liečby:

- V 1. - 4., 9. - 12. a 17. - 20. deň: užijete 40 mg dexametazónu jedenkrát denne
- V 21. - 28. deň: NEUŽIJETE dexametazón

Nasledujúce cykly liečby:

- V 1. - 4. deň: užijete 40 mg dexametazónu jedenkrát denne
- V 5. - 28. deň: NEUŽIJETE dexametazón

- Ak užívate tiež dexametazón vo forme tabliet, môžete ich užívať v rovnakom čase ako Lenalidomid Glenmark.
- Dexametazón sa zvyčajne užíva len niekoľko dní počas týždňa. Pozorne sa riadte pokynmi svojho lekára alebo lekárničky.
- Pokiaľ je to možné, dexametazón sa užíva spolu s raňajkami alebo po raňajkách.

Ak užijete viac Lenalidomidu Glenmark, ako máte

Ak ste omylom užili viac kapsúl Lenalidomidu Glenmark, ako vám predpísali, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

Ak zabudnete užiť Lenalidomid Glenmark

Ak zabudnete užiť Lenalidomid Glenmark v obvyklom čase a uplynulo menej ako 12 hodín, užite hneď kapsulu, ako si spomeniete a ďalšiu dávku užite v obvyklom čase. Ak uplynulo viac ako 12 hodín od vymeškania dávky, kapsulu neužite a ďalšiu dávku užite v obvyklom čase. Pri najbližšej návšteve lekára informujte o každej vynechanej dávke.

Užívanie iných liekov

Ak teraz užívate, alebo ste v poslednom čase užívali ďalšie lieky, vrátane liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi. Ak plánujete návštevu alebo sa liečite u iného lekára (napríklad svojho zubára) alebo zdravotníckeho pracovníka, musíte mu povedať, že užívate Lenalidomid Glenmark a dexametazón.

Ako bezpečne uchovávať Lenalidomid Glenmark

Uchovávajte Lenalidomid Glenmark na bezpečnom mieste, mimo dohľadu a dosahu detí. Kapsuly uchovávajte v pôvodnom balení pri izbovej teplote. Neužívajte tento liek po dátume expirácie, ktorý je uvedený na škatulke.

POŽIADAVKY PO UKONČENÍ LIEČBY

8. POŽIADAVKY PO UKONČENÍ LIEČBY

Po ukončení vašej liečby Lenalidomidom Glenmark je dôležité:

- Aby ste vrátili všetky nepoužité kapsuly Lenalidomidu Glenmark svojmu lekárnikovi.
- Aby ste minimálne týždeň po liečbe nedarovali krv.

Ďalšie odporúčania pre ženy, ktoré môžu otehotnieť:

- Pokračujte v používaní účinnej antikoncepcnej metódy počas nasledujúcich 4 týždňov.
- Váš lekár vám po 4 týždňoch urobí záverečný tehotenský test.

Ďalšie odporúčania pre mužských pacientov:

- Ak ste používal účinnú antikoncepčnú metódu, musíte v nej pokračovať ešte 1 týždeň.
- Ak vaša partnerka používala účinnú antikoncepčnú metódu, musí v nej pokračovať nasledujúce 4 týždne.

Dodatočné informácie

Čo je mnohopočetný myelóm?

Mnohopočetný myelóm je druh rakoviny, ktorá postihuje určitý druh bielych krviniek, nazývaných plazmatické bunky. Tieto bunky sa zhromažďujú v kostnej dreni a sú súčasťou imunitného systému. Funkciou imunitného systému je bojovať proti chorobám a infekciám. Myelóm sa môže vyskytnúť vo viacerých častiach kostnej drene, preto sa často nazýva mnohopočetný. Mnohopočetný myelóm, ktorý neodpovedá na začiatočnú liečbu alebo sa opätovne vracia je nazývaný relabujúci alebo refraktérny mnohopočetný myelóm.

POŽIADAVKY PO UKONČENÍ LIEČBY

Čo je lenalidomid?

Lenalidomid patrí do skupiny liečiv nazývanej imunomodulačné látky alebo IMiDs (immune mediated inflammatory drugs). Tieto lieky upravujú alebo regulujú činnosť imunitného systému. Lenalidomid je schválený v Európe na použitie v kombinácii so steroidným liečivom dexametazónom na liečbu pacientov, ktorí sa predtým podrobili najmenej jednej terapii kvôli mnohopočetnému myelómu. Lenalidomid je svojou štruktúrou podobný talidomidu, o ktorom je známe, že spôsobuje závažné, život ohrozujúce vrodené chyby. Je nutné dodržiavať opatrenia, aby plod nebol vystavený účinku lenalidomidu.

Ako mi lenalidomid môže pomôcť?

Lenalidomid pôsobí tým, že ovplyvňuje činnosť imunitného systému a priamo napáda nádorové bunky. Účinkuje rôznymi spôsobmi:

- Zastavuje množenie nádorových buniek.
- Potláča rast krvných ciev v nádore.
- Stimuluje časť imunitného systému, aby napadal nádorové bunky.

Mnohopočetný myelóm

Lenalidomid môže zastaviť alebo zmierniť znaky a prejavy mnohopočetného myelómu.

Lenalidomid oddialil opätovný výskyt mnohopočetného myelómu až o 48 týždňov v porovnaní s 20 týždňami u pacientov, ktorí lenalidomid neužívali.

The background features a series of overlapping geometric shapes in various shades of orange and red. These include large triangles, rounded rectangles, and circular segments, creating a modern, abstract design. The colors range from light peach to deep maroon.

GLENMARK PHARMACEUTICALS SK, s.r.o.
Tomášikova 64, 831 04 Bratislava 3, Slovenská republika