

O VAŠEJ LIEČBE

Bol vám predpísaný liek Lixiana, antikoagulačný liek, ktorý „riedi“ krv a pomáha v prevencii krvných zrazenín.

Je dôležité, aby ste užívali svoje lieky presne podľa pokynov svojho lekára.

- Ak zabudnete užiť dávku, vezmite si ju ihned a potom pokračujte nasledujúci deň ako obvykle - neberte dvojnásobok predpisanej dávky v rovnaký deň.

- Nezačíname užívať žiadne iné lieky (vrátane tých bez predpisu) bez konzultácie s vaším lekárom.
- Neprestávajte užívať Lixianu bez konzultácie s lekárom, pretože to môže zvýšiť riziko vzniku krvnej zrazeniny.
- Prečítajte si, prosím, písomnú informáciu pre používateľa, ktorú nájdete v každom balení Lixiany.

KEDY VYHĽADAŤ LEKÁRSKU POMOC

RIZIKO KRVÁCANIA

Užívanie antikoagulačného lieku ako je Lixiana môže zvýšiť riziko krvácania. Preto je dôležité byť si vedomý možných známok a príznakov krvácania a poradíť sa s lekárom **okamžite**, ak spozorujete ktorýkoľvek z nasledujúcich:

- modriny alebo krvácanie pod kožou,
- krv v moči,
- vykašliavanie krvi,
- vracanie krvi alebo obsahu, ktorý vyzerá ako mletá káva,

- krvácania z nosa alebo z rezných raniek, ktorým trvá dlhú dobu kým sa zastavia,
- stolica dechtovej farby,
- závraty alebo náhla bolest' hlavy,
- nevysvetlená únava,
- abnormálne krvácanie z pošvy, vrátane t'ažšej alebo predĺženej menštruačie.

Prosím, porad'te sa so svojím lekárom, ak narazíte na akokoľvek nezvyčajné príznaky.

POHOTOVOSTNÁ KARTA PACIENTA

Lixiana®

filmom obalené tablety
edoxaban

Noste, prosím, túto kartu stále so sebou.

Predložte ju svojmu lekárovi, lekárnikovi, chirurgovi alebo zubárovi pred akokoľvek liečbou alebo zákrokom.



Tu odtrhnite, prosím

INFORMÁCIE O PACIENTOVI

Meno pacienta:

.....

Dátum narodenia:

V prípade núdze, prosím,
kontaktujte:

Meno:

Telefónne číslo:

.....

INFORMÁCIE O LIEČBE

(Vyplní lekár)

Lixiana bola predpísaná ako jedna
denná dávka:

..... mg

Začínajúca od: / (mm/rr)

Krvná skupina:

Iné liečivá/ochorenia:

.....

.....

INFORMÁCIE PRE PREDPISUJÚCEHO

Pre viac informácií alebo
v prípade núdze, prosím,
kontaktujte:

Meno lekára:

.....

Telefónne číslo, pečiatka
ordinácie:

Podpis lekára:

.....

INFORMÁCIA PRE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV

- Lixiana je perorálny antikoagulačný inhibítorm faktora Xa.
- Ak je potrebné zvoliť invazívny postup, Lixiana by mala byť vysadená minimálne 24 hodín vopred, vhodná je tiež primeraná obozretnosť.
- Lixiana môže zvýšiť riziko krvácania. V prípade klinicky významného krvácania okamžite ukončite liečbu.

- Koagulačné testy ako INR, protrombínový čas (PT) alebo aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (aPTT) nie sú vhodným meradlom účinku Lixiany. Avšak kalibrovaný test pre anti-faktor Xa môže pomôcť informovať v klinických rozhodnutiach.

Viac informácií nájdete v
súhrne charakteristických
vlastností lieku (SPC).

