

Kontrolný zoznam pre predpisovanie lieku Mycamine® (mikafungín)

Tento kontrolný zoznam pripomína predpisujúcim lekárom určité aspekty spojené s užívaním lieku Mycamine®, aby sa zabezpečilo, že liek je predpísaný primerane po liečbe trvajúcej 3 mesiace alebo dlhšie.

Pri rozhodovaní o používaní lieku Mycamine® sa má vziať do úvahy potenciálne riziko vzniku nádorov pečene.

U potkanov sa pozoroval vývoj ložísk zmenených hepatocytov a hepatocelulárnych nádorov po 3 mesiacoch liečby alebo dlhšie. Predpokladaný prah pre rozvoj nádoru u potkanov je približne v rozsahu klinickej expozície. Klinický význam tohto zistenia nie je známy.

Mycamine® sa má preto používať len vtedy, ak nie sú vhodné iné antimykotiká.

Začiarknite príslušné políčka. Kompletný kontrolný zoznam uložte do zdravotnej dokumentácie pacienta!

IDENTIFIKÁCIA PACIENTA:	PREDPISUJÚCI LEKÁR:
<div style="border: 1px solid black; height: 80px;"></div>	Meno: <input type="text"/>
	Podpis: <input type="text"/>
	Dátum: <input type="text"/>

Sú vhodné iné antimykotiká?

Áno Nie

Mycamine® sa má používať len vtedy, ak nie sú vhodné iné antimykotiká.

SKONTROLUJTE, ČI SA NA VÁŠHO PACIENTA VZŤAHUJE NIEKTORÁ Z NASLEDUJÚCICH PODMIENOK:

1) Ťažká porucha funkcie pečene

Áno Nie

2) Chronické ochorenia pečene, o ktorých je známe, že predstavujú preneoplastické stavy, ako sú: pokročilá fibróza pečene, vírusová hepatitída, vrodené enzýmové poruchy, cirhóza, neonatálne ochorenie pečene

Áno Nie

3) Súbežná liečba liekmi, ktoré majú hepatotoxické a/alebo genotoxické vlastnosti

Áno Nie

U pacientov sa musia starostlivo sledovať prejavy poškodenia pečene. V prípade, že sa objaví významné a pretrvávajúce zvýšenie hladín ALT/AST, odporúča sa včasná prerušenie liečby, aby sa minimalizovalo riziko adaptívnej regenerácie a potenciálnej následnej tvorby nádoru pečene.

4) Hemolýza alebo hemolytická anémia v anamnéze

Áno Nie

Pacienti, u ktorých sa počas liečby Mycamine® vyvinú klinické alebo laboratórne dôkazy o hemolýze, sa majú starostlivo sledovať, aby sa zistili dôkazy zhoršenia týchto stavov a vyhodnotil sa prínos/riziko liečby liekom Mycamine®.

5) Porucha funkcie obličiek

Áno Nie

Pacienti majú byť starostlivo sledovaní kvôli zhoršeniu funkcie obličiek.

AK STE NA KTORÚKOL'VEK Z OTÁZOK (1-5) ODPOVEDALI „ÁNO“, PREDPÍŠTE MYCAMINE® LEN PO DÔKLADNOM ZHODNOTENÍ PRÍNOSU A RIZIKA.