

PRÍRUČKA PRE PACIENTA

Návod na použitie
a uchovávanie pera Ozempic ▼
raz týždenne

Ako používať pero s liekom Ozempic® raz týždenne

A Kryt pera

Kryt vždy po použití nasadíte na pero kvôli ochrane lieku Ozempic® pred svetlom

B Okienko pera

Pohľadom skontrolujte, či je roztok číry a bezfarebný.

C Počítadlo dávky

Zobrazuje nastavenú dávku

D Volič dávky

Otáčaním nastavíte dávku

E Dávkovacie tlačidlo

Tlačidlo stlačte a podržte, aby ste si podali dávku.



Kam si mám injekciu podať


Najvhodnejším miestom na podávanie injekcie lieku Ozempic® je predná časť stehien, brucho (okrem okolia pupku) alebo stredná časť ramien podľa obrázku.

Aké množstvo použiť

Počiatočná dávka lieku Ozempic® je 0,25 mg raz za týždeň počas prvých 4 týždňov liečby.

Uchovávanie lieku

Po otvorení môžete liek Ozempic® uchovávať po dobu 6 týždňov pri teplote do 30 °C alebo v chladničke pri teplote 2 °C – 8 °C.



Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa alebo sa obráťte na svojho lekára, lekárnik alebo zdravotnú sestru s otázkami o tom, ako zvládať diabetes (cukrovku) 2. typu alebo ako používať liek Ozempic®.

Návod na podávanie lieku

Podrobnejšie informácie, ako si podať liek, nájdete v písomnej informácii pre používateľa, ktorá sa nachádza v balení lieku Ozempic®



1 Skontrolujte pero a nasadte novú ihlu

Skontrolujte, či je roztok lieku Ozempic® v pere **číry a bezfarebný**. Nasadte ihlu na pero a utiahnite. Odstráňte **oba** kryty ihly.




4 Podanie lieku

Zavedte ihlu do kože. Stlačte a držte dávkovacie tlačidlo. Po návrate počítadla dávky na **0 pomaly počítajte do 6**.



2 Skontrolujte prietok

Vždy pri použití **nového** pera skontrolujte prietok otáčaním voliča dávky, pokiaľ sa na počítadle ukáže **symbol kontroly prietoku** (■ ■ ■). Stlačte a držte dávkovacie tlačidlo stlačené, opakujte kým sa na hrote ihly neobjaví kvapka.



5 Odstráňte ihlu

Opatrne odskrutkujte ihlu a zlikvidujte ju. Nasadte kryt na pero.



3 Nastavte dávku

Otáčajte voličom dávky, aby ste si nastavili potrebnú dávku (buď 0,25 mg alebo 0,5 mg).

Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa alebo sa obráťte na svojho lekára, lekárnik alebo zdravotnú sestru s otázkami o tom, ako zvládať diabetes (cukrovku) 2. typu alebo ako používať liek Ozempic®.

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania.

Hlásenie podozrení na nežiaduce reakcie po registrácii lieku je dôležité. Umožňuje priebežné monitorovanie pomeru prínosu a rizika lieku. Od zdravotníckych pracovníkov sa vyžaduje, aby hlásili akékoľvek podozrenia na nežiaduce reakcie na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: +421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Lieky/Bezpečnosť liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení <https://portal.sukl.sk/eskada/>.