

## Karta pacienta

### Strana 1 (predná)

Na liečbu pľúcnej artériovej hypertenzie

Táto kartička obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, o ktorých musíte byť oboznámený pred liečbou Opsumitom. Noste túto kartičku vždy so sebou a ukážte ju každému ošetrojúcemu lekárovi.

**Opsumit® 10 mg**  
macitentan  
filmom obalené tablety

SK

### Strana 2

**Je dôležité, aby ste svojmu ošetrojúcemu lekárovi počas liečby Opsumitom okamžite hlásili každé tehotenstvo alebo vedľajší účinok.**

Liečebné centrum: \_\_\_\_\_

Meno predpisujúceho lekára: \_\_\_\_\_

Telefónne číslo predpisujúceho lekára: \_\_\_\_\_

### Strana 3 (vnútri vľavo)

**Tehotenstvo**  
Opsumit môže poškodiť vývoj plodu. Preto nesmiete užívať Opsumit, ak ste tehotná a tiež nesmiete otehotnieť, ak užívate Opsumit. Navyše, ak máte pľúcnu artériovú hypertenziu, tehotenstvo môže vážne zhoršiť príznaky vašej choroby.

**Antikoncepcia**  
Počas liečby Opsumitom, potrebujete spoľahlivú antikoncepciu. S každou otázkou sa neváhajte obrátiť na svojho lekára.

### Strana 4 (vnútri v strede)

Pred začiatkom liečby Opsumitom a každý nasledujúci mesiac si musíte urobiť tehotenský test, a to aj vtedy, ak si myslíte, že nie ste tehotná.

Podobne ako ostatné lieky z tejto skupiny, Opsumit môže mať vplyv na pečeň. Pred začiatkom liečby a počas liečby Opsumitom vám váš lekár vykoná krvné testy, aby zistil či vaša pečeň pracuje správne.

### Strana 5 (vnútri vpravo)

Prejavy toho, že vaša pečeň nepracuje správne, môžu byť:

- nevoľnosť (nutkanie na vracanie)
- vracanie
- horúčka (vysoká telesná teplota)
- bolesti žalúdka (brucha)
- žltáčka (žltnutie kože a očných bielkov)
- tmavý moč
- svrbenie kože
- letargia alebo únava (neobvyklá únava alebo vyčerpanie)
- syndróm podobný chrípke (bolesti kĺbov, svalov, horúčka)

**Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto prejavov, okamžite informujte svojho lekára. Ak máte akékoľvek otázky o vašej liečbe, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnik.**