

Pohotovostná karta pacienta

Assubex® 2,5 mg ☐ (políčko na zaškrtnutie predpísanej dávky)
Assubex® 10 mg ☐ (políčko na zaškrtnutie predpísanej dávky)
Assubex® 15 mg ☐ (políčko na zaškrtnutie predpísanej dávky)
Assubex® 20 mg ☐ (políčko na zaškrtnutie predpísanej dávky)

- Túto kartu noste vždy so sebou
- Túto kartu ukážte pred liečbou každému lekárovi alebo zubárovi

- Assubex sa musí užívať presne podľa predpisu lekára. Na zabezpečenie optimálnej ochrany pred vznikom krvných zrazenín, **nikdy nevynechajte dávku.**
- Assubex nesmieste prestať užívať bez toho, aby ste sa najprv neporozprávali so svojim lekárom, pretože riziko vzniku krvných zrazenín sa môže zvýšiť.
- Predtým ako začnete užívať Assubex, povedzte svojmu lekárovi o všetkých ostatných liekoch, ktoré práve užívate, ktoré ste ešte nedávno užívali alebo ktoré sa chystáte užívať.
- Pred akýmkoľvek chirurgickým alebo invazívnym zákrokom povedzte svojmu lekárovi, že užívate Assubex.

Kedy mám vyhľadať pomoc môjho lekára?

Keď užívate lieky na riedenie krvi, ako je Assubex, je dôležité, aby ste si boli vedomý

Užívam antikoagulačnú liečbu Assubexom (rivaroxabán)

Meno:
Adresa:
Dátum narodenia:
Hmotnosť:
Iné lieky/ochorenia

V naliehavom prípade, prosím, kontaktujte:

Meno lekára:
Telefón lekára:
Pečiatka lekára:

možných vedľajších účinkov týchto liekov. Najčastejším vedľajším účinkom je krvácanie. Ak viete, že je u vás riziko krvácania, nezačnite užívať Assubex bez toho, aby ste to najprv neprediskutovali so svojim lekárom. Okamžite informujte svojho lekára, ak máte akékoľvek prejavy alebo príznaky krvácania, ako sú nasledujúce:

- bolesť,
- opuch alebo zdravotné ťažkosti,
- bolesť hlavy, závrat alebo slabosť,
- nezvyčajná tvorba podliatin, krvácanie z nosa, krvácanie z ďasien, rezné rany, ktoré vyžadujú dlhší čas na zastavenie krvácania,
- menštruačné krvácanie alebo krvácanie z pošvy, ktoré je silnejšie než zvyčajne,

Informujte, prosím, aj:

Meno:
Telefón:
Vzťah k pacientovi:

Informácia pre zdravotníckych pracovníkov:

- Hodnoty INR sa nemajú používať, keďže nie sú spoľahlivé na meranie antikoagulačnej aktivity Assubexu.

Čo mám vedieť o Assubexe?

- Assubex zrieduje krv, čím u vás zabraňuje vzniku nebezpečných krvných zrazenín.

- krv v moči, ktorý môže mať ružové alebo hnedé sfarbenie, červená alebo čierna stolica,
- vykašliavanie krvi, alebo vracanie krvi či hmoty, ktorá vyzerá ako kávová usadenina.

Ako mám Assubex užívať?

- Na zabezpečenie optimálnej ochrany, Assubex:
 - 2,5 mg sa má užívať s jedlom alebo bez jedla
 - 10 mg sa má užívať s jedlom alebo bez jedla
 - 15 mg sa musí užívať s jedlom
 - 20 mg sa musí užívať s jedlom

Egis No

35×261,49 mm

1 : 1 version-01

Font size: min. 8,75 pt.

10684,3263-SK/2020-05-14

EGIS rivaroxaban

● Black

Kozula Norbert / 2024.06.18.