


DÔLEŽITÉ
FAKTY O LIEKU
PRILIGY®
PRE PACIENTA



Tento materiál
je určený pre
pacientov, ktorým
lekár predpísal
liek PRILIGY®



BERLIN-CHEMIE
MENARINI



Dôležité informácie

PE a PRILIGY®

Dôležité informácie o liečbe

- Liek PRILIGY® sa používa na liečbu predčasnej ejakulácie u mužov vo veku 18 až 64 rokov.
- PRILIGY® sa má užiť 1 až 3 hodiny pred pohlavným stykom, podľa pokynov vášho lekára.
- PRILIGY® predlžuje čas potrebný na ejakuláciu a môže zlepšiť jej ovládanie. Tým sa môže znížiť frustrácia alebo obavy spojené s rýchlou ejakuláciou.
- Najčastejšími vedľajšími účinkami sú závrat, bolesť hlavy a nevoľnosť.
- Menej často sa môžu vyskytnúť aj mdloby. Ak máte pocit, že by ste mohli upadnúť do mdlôb, ihneď si buď ľahnite, alebo sadnite s hlavou medzi kolenami a v tejto polohe zotrvať, kým sa nebudete cítiť lepšie.
- Pre viac informácií:
 - Porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 - Prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa, ktorá je priložená k lieku.

Liečba predčasnej ejakulácie (PE)

- V záujme dosiahnutia úspechu pri liečbe PE liekom PRILIGY® si prečítajte všetky dôležité informácie uvedené v tejto brožúre.
- Pre ďalšie informácie sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.

PE a PRILIGY®

Predčasná ejakulácia je veľmi nepríjemný zdravotný problém.

- Muži s PE a ich partnerky môžu pociťovať úzkosť, frustráciu a môžu mať problémy vo vzťahoch.
- PE je definovaná ako:
 - Pretrvávajúca alebo opakujúca sa ejakulácia s minimálnou predchádzajúcou stimuláciou, ku ktorej dochádza pred vniknutím do vagíny, počas neho alebo krátko po ňom.
 - Neschopnosť ovládať alebo zabrániť ejakulácii krátko pred vaginálnou penetráciou alebo počas nej.
 - Negatívne osobné následky, napríklad úzkosť.

***PE je nepríjemný
zdravotný problém.***

Dôležité informácie

PRILIGY® môže pomôť zlepšiť PE

PRILIGY® obsahuje liečivo dapoxetín. Dapoxetín patrí do skupiny liekov nazývaných „selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu“ (SSRI). Zvyšuje hladinu serotonínu, čo je prirodzená chemická látka, ktorá môže predĺžiť čas do ejakulácie tým, že spomalí tie dráhy v organizme, ktoré súvisia s PE. PRILIGY® účinkuje rýchlo a z organizmu sa rýchlo vylučuje.

***PRILIGY® môže
pomôť zlepšiť PE.***

Čo očakávať počas liečby PRILIGY®

U mužov liečených PRILIGY® môže nastať:

- dlhší čas do ejakulácie
- pocit lepšej kontroly ejakulácie
- vyššia spokojnosť s pohlavným stykom
- menej úzkosti súvisiacej s PE
- celkový dojem, že PE sa zlepšila.


***PRILIGY® môže zvýšiť
pocit lepšej kontroly
ejakulácie a čas do
ejakulácie.***

U niektorých mužov dôjde k určitému zlepšeniu PE už po prvom použití PRILIGY®, kým iní ho budú musieť užiť viackrát, kým spozorujú nejaké zlepšenie.

Počas liečby PE predĺžený čas do ejakulácie vedie k pocitu jej lepšieho ovládania. Tento pocit lepšieho ovládania môže obmedziť frustráciu alebo obavy z rýchlej ejakulácie a zlepšiť spokojnosť s pohlavným stykom.

Dôležité informácie

Zlepšenie PE s PRILIGY®



Čo očakávať
od PRILIGY®

Kto by mal PRILIGY® užívať?

- PRILIGY® je liek určený na liečbu PE u mužov vo veku 18 až 64 rokov.
- PRILIGY® je určený len pre mužov, ktorým lekár diagnostikoval PE.

*PRILIGY® je liek,
ktorého výdaj je
viazaný na lekársky
predpis.*

**PRILIGY® NEDÁVAJTE nikomu inému,
aj keď môže mať rovnaké alebo podobné
príznaky ako vy.**

Dôležité informácie

Nepoužívajte PRILIGY®, ak:

- Vám Váš lekár nediagnostikoval PE
- ste alergický na dapoxetín alebo inú zložku PRILIGY® (uvedenú v príbalovej informácii pre pacienta)
- máte problémy so srdcom, napríklad srdcové zlyhanie alebo problémy so srdcovým rytmom
- máte stredne závažné až závažné problémy s pečeňou
- trpíte mániou alebo ťažkou depresiou, alebo ste ňou trpeli v minulosti
- užívate niektoré lieky, napríklad inhibítory monoaminoxidázy (IMAO) alebo iné lieky na depresiu, tioridazín na liečbu schizofrénie, niektoré lieky na plesňové infekcie, niektoré lieky na HIV, niektoré antibiotiká na liečbu infekcií, lítium na bipolárnu poruchu, tryptofán na lepšiu spánok, bylinné preparáty s ľubovníkom bodkovaným, tramadol na liečbu silnej bolesti a lieky používané na liečbu migrény.

Navyše:

- prípravok PRILIGY® by ste nemali užívať, ak užívate inhibítory PDE-5 (používané na liečbu erektilnej dysfunkcie), pretože kombinovanie prípravku PRILIGY® s týmito liekmi môže zvýšiť pravdepodobnosť mdlôb
- poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom o všetkých liekoch vrátane rastlinných, ktoré užívate
- PRILIGY® nie je určený pre ženy.

Ak si nie ste istý, či by ste PRILIGY® mali užívať, porozprávajte sa so svojím lekárom.

Ako užívať PRILIGY®

PRILIGY® užíte 1 až 3 hodiny pred pohlavným stykom, nie však častejšie než raz za 24 hodín.

- Odporúčaná úvodná dávka pre všetkých pacientov je 30 mg. Váš lekár Vám môže dávku zvýšiť na 60 mg.
- Tablety prehltajte celé, aby ste predišli horkej chuti, a zapite ich najmenej jedným plným pohárom vody.
- PRILIGY® sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.
- Počas užívania PRILIGY® sa vyhýbajte konzumácii alkoholu. Kombinácia PRILIGY® a alkoholu môže zvýšiť pravdepodobnosť mdlôb, ako aj účinky spojené s alkoholom, napríklad závrat, ospalosť a pomalé reakcie.
- PRILIGY® nepoužívajte v kombinácii s rekreačnými drogami (napríklad extázou, LSD, narkotikami alebo benzodiazepínmi), ktoré môžu v kombinácii s PRILIGY® vyvolať potenciálne závažné reakcie.

***PRILIGY® užíajte
1 až 3 hodiny pred
pohlavným stykom.***

**Neužívajte viac PRILIGY®,
než Vám predpísal lekár.**

PRILIGY® neužívajte častejšie než raz za 24 hodín a neužívajte každý deň.

Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

Dôležité informácie

Dôležité: pri užívaní PRILIGY® budte opatrný

Pri užívaní PRILIGY® budte opatrný, pretože môže vyvolať mdloby alebo závrat. Ak cítite, že by ste mohli upadnúť do mdlôb (napríklad máte závrat, alebo ste omámený), ihneď si ľahnite, a to tak, aby ste mali hlavu nižšie než zvyšok tela, alebo si sadnite a hlavu si dajte medzi kolená. V tejto polohe zotrvať, kým sa nebudete cítiť lepšie. Takto predídete pádu a poraneniu, ak by ste náhodou odpadli.

— Ak máte závrat, alebo ste omámený, nevedzte vozidlo a neobsluhujte stroje.

— Počas užívania PRILIGY® nekonzumujte alkohol. Kombinácia PRILIGY® a alkoholu môže zvýšiť pravdepodobnosť upadnutia do mdlôb, čím sa zvýši riziko náhodného poranenia a zároveň môže dôjsť aj k zvýrazneniu účinkov súvisiacich s alkoholom.

Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

Užívanie PRILIGY®

Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj PRILIGY® môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi časté vedľajšie účinky PRILIGY® (postihujú najmenej 1 z 10 osôb):

- závrat
- bolesť hlavy
- nevoľnosť

Najčastejšími vedľajšími účinkami PRILIGY® sú závrat, bolesť hlavy a nevoľnosť.

Po užití PRILIGY® sa môžu vyskytnúť mdloby, hoci podľa hlásení k nim nedochádza často (postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000).

Úplný zoznam častých vedľajších účinkov (postihujúcich 1 z 10 až 1 zo 100 osôb) nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

Dôležité informácie

PRILIGY® prestaňte užívať a okamžite navštívte lekára, ak:

- máte kŕče (záchvaty)
- po postavení sa upadnete do mdlôb, alebo sa cítite omámený
- spozorujete nejaké zmeny nálad
- máte samovražedné myšlienky alebo myšlienky na seba poškodzovanie.

Ak spozorujete niektorý z vyššie uvedených prejavov, tento liek prestaňte užívať a okamžite navštívte lekára.

Úplné informácie o bezpečnosti lieku nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

Dôležité bezpečnostné informácie

Tri kroky k zníženiu rizika mdlôb a nízkeho krvného tlaku

*Mdloby alebo nízky
krvný tlak sa môžu
vyskytnúť po postavení
sa, toto riziko však
môžete znížiť pomocou
3 jednoduchých krokov*

- 1. PRILIGY® zapite vodou a neužívajte ho, ak ste dehydrovaný.**

Dehydrovaný môžete byť, alebo v tele nemusíte mať dosť vody, ak:

- ste v predchádzajúcich 4 až 6 hodinách nič nepili
- ste sa dlho potili
- máte ochorenie sprevádzané vysokou teplotou alebo hnačkou, alebo vraciate.

- 2. Keď ste užili PRILIGY®, po dlhodobom sedení alebo ležaní nevstávajte rýchlo.**

Dôležité informácie

3. Ak sa po postavení cítite omámený alebo máte pocit, že by ste mohli upadnúť do mdlôb, ihneď si ľahnite a to tak, aby ste mali hlavu nižšie než zvyšok tela, alebo si sadnite a hlavu si dajte medzi kolená. V tejto polohe zotrvať, kým sa nebudete cítiť lepšie.

- Takto predídete pádu a poraneniu, keby ste náhodou odpadli.
- Príznaky možného upadnutia do mdlôb:

— nevoľnosť	— potenie
— zmätenosť	— omámenosť
— závrat	— abnormálny tep

Ak Vám je počas užívania PRILIGY® na odpadnutie, nevedzte vozidlo a neobsluhujte stroje.

Keď počas užívania tohto lieku odpadnete, povedzte to svojmu lekárovi.

Ako si byť istý, že je Váš prípravok PRILIGY® pravý

***PRILIGY® kupujte len
od legálnych predajcov***

Rovnako ako je to dnes v prípade všetkých liekov, aj s týmto liekom sa spája riziko falšovania. Falošné produkty nemusia obsahovať správne liečivo, nemusia obsahovať vôbec žiadne liečivo, alebo dokonca môžu obsahovať škodlivé látky. Aby ste ochránili svoje zdravie, dodržiavajte nasledujúce kroky:

- 1. PRILIGY® si na základe lekárskeho predpisu objednáajte len od legálnych predajcov, napríklad v miestnej lekární. Nekupujte PRILIGY® bez lekárskeho predpisu na internete, pretože mnoho webových stránok ponúka falošné lieky.**
 - Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj liekov je uvedený na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.
 - Budte opatrný v prípade webových stránok, ktoré nevyžadujú lekársky predpis od Vášho lekára alebo ponúkajú špeciálne ceny liekov, pretože takéto stránky často predávajú falošné lieky.
- 2. Venujte pozornosť tomu, ako by mal liek a jeho obal vyzeráť (pozri nasledujúcu časť „Balenie PRILIGY®“). Ak sú vo vzhľade nejaké odlišnosti, liek neužívajte.**

Dôležité informácie

3. Navštívte stránku www.genuinepriligy.com a overte si, či je Váš PRILIGY® pravý.

- Na bočnej strane balenia je vytlačené sériové číslo. Toto sériové číslo je na každom balení lieku PRILIGY® iné a na balenie bolo vytlačené počas výroby. Je to 12-miestne číslo začínajúce písmenami SČ.
- Keď si otvoríte stránku www.genuinepriligy.com, najprv si zvolíte svoj jazyk a potom postupujte podľa pokynov, aby ste mohli zadať 12-miestne číslo.
- Zadajte 12-miestne číslo (nezadáajte písmená SČ). Dozviete sa, či je Váš PRILIGY® pravý alebo nie.

Balenie PRILIGY®

PRILIGY® sa dodáva v blistroch, ktoré obsahujú 3 alebo 6 filmom obalených tabliet. Blistre sú zabalené v trojitom obale s uvedením dôležitých informácií, ktoré musíte poznať predtým, než PRILIGY® užijete. Tento trojitý obal je zapečatený striebornou nálepkou, na ktorej bude zrejmé, ak s ňou niekto neoprávnene manipuloval. Po odstránení zapečatenia zostanú na obale lepkavé zvyšky pripomínajúce mozaiku. Ak je pečať otvorená alebo chýba, liek neužívajte. Tablety sú okrúhle a na jednej strane majú vnútri trojuholníka vyryté číslo.



PRILIGY® 30 mg



PRILIGY® 60 mg



Dôležité informácie

Ak máte podozrenie, že Váš PRILIGY® nie je pravý, liek neužívajte. Kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika, prípadne zatelefonujte na telefónne číslo zákazníckej linky spoločnosti Berlin-Chemie/Menarini:

+421 905 551 639



SK-PRI-03-2017-V01-Folder



BERLIN-CHEMIE
MENARINI

Tento materiál je súčasťou Risk Management
Plánu držiteľa registračného rozhodnutia o lieku.
Dátum výroby materiálu: máj 2017
Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie AG, Palisády 29
811 06 Bratislava, tel.: 02/5443 0730,
fax: 02/5443 0724, slovakia@berlin-chemie.com

— DÔLEŽITÉ —
FAKTY O LIEKU
PRILIGY®
PRE PACIENTA



Tento materiál
je určený pre
pacientov, ktorým
lekár predpísal
liek PRILIGY®



BERLIN-CHEMIE
MENARINI



Dôležité informácie o liečbe

- Liek PRILIGY® sa používa na liečbu predčasnej ejakulácie u mužov vo veku 18 až 64 rokov.
- PRILIGY® sa má užiť 1 až 3 hodiny pred pohlavným stykom, podľa pokynov vášho lekára.
- PRILIGY® predlžuje čas potrebný na ejakuláciu a môže zlepšiť jej ovládanie. Tým sa môže znížiť frustrácia alebo obavy spojené s rýchlou ejakuláciou.
- Najčastejšími vedľajšími účinkami sú závrat, bolesť hlavy a nevoľnosť.
- Menej často sa môžu vyskytnúť aj mdloby. Ak máte pocit, že by ste mohli upadnúť do mdlôb, ihneď si buď ľahnite, alebo sadnite s hlavou medzi kolenami a v tejto polohe zotrvaťte, kým sa nebudete cítiť lepšie.
- Pre viac informácií:
 - Porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom.
 - Prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa, ktorá je priložená k lieku.

Liečba predčasnej ejakulácie (PE)

- V záujme dosiahnutia úspechu pri liečbe PE liekom PRILIGY® si prečítajte všetky dôležité informácie uvedené v tejto brožúre.
- Pre ďalšie informácie sa obráťte na svojho lekára alebo lekárnika.

PE a PRILIGY®

Predčasná ejakulácia je veľmi nepríjemný zdravotný problém.

- Muži s PE a ich partnerky môžu pociťovať úzkosť, frustráciu a môžu mať problémy vo vzťahoch.
- PE je definovaná ako:
 - Pretrvávajúca alebo opakujúca sa ejakulácia s minimálnou predchádzajúcou stimuláciou, ku ktorej dochádza pred vniknutím do vagíny, počas neho alebo krátko po ňom.
 - Neschopnosť ovládať alebo zabrániť ejakulácii krátko pred vaginálnou penetráciou alebo počas nej.
 - Negatívne osobné následky, napríklad úzkosť.

***PE je nepríjemný
zdravotný problém.***

Dôležité informácie

PRILIGY® môže pomôcť zlepšiť PE

PRILIGY® obsahuje liečivo dapoxetín. Dapoxetín patrí do skupiny liekov nazývaných „selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu“ (SSRI). Zvyšuje hladinu serotonínu, čo je prirodzená chemická látka, ktorá môže predĺžiť čas do ejakulácie tým, že spomalí tie dráhy v organizme, ktoré súvisia s PE. PRILIGY® účinkuje rýchlo a z organizmu sa rýchlo vylučuje.

***PRILIGY® môže
pomôcť zlepšiť PE.***

Čo očakávať počas liečby PRILIGY®

U mužov liečených PRILIGY® môže nastať:

- dlhší čas do ejakulácie
- pocit lepšej kontroly ejakulácie
- vyššia spokojnosť s pohlavným stykom
- menej úzkosti súvisiacej s PE
- celkový dojem, že PE sa zlepšila.


***PRILIGY® môže zvýšiť
pocit lepšej kontroly
ejakulácie a čas do
ejakulácie.***

U niektorých mužov dôjde k určitému zlepšeniu PE už po prvom použití PRILIGY®, kým iní ho budú musieť užiť viackrát, kým spozorujú nejaké zlepšenie.

Počas liečby PE predĺžený čas do ejakulácie vedie k pocitu jej lepšieho ovládania. Tento pocit lepšieho ovládania môže obmedziť frustráciu alebo obavy z rýchlej ejakulácie a zlepšiť spokojnosť s pohlavným stykom.

Dôležité informácie

Zlepšenie PE s PRILIGY®



Čo očakávať
od PRILIGY®

Kto by mal PRILIGY® užívať?

- PRILIGY® je liek určený na liečbu PE u mužov vo veku 18 až 64 rokov.
- PRILIGY® je určený len pre mužov, ktorým lekár diagnostikoval PE.

*PRILIGY® je liek,
ktorého výdaj je
viazaný na lekársky
predpis.*

**PRILIGY® NEDÁVAJTE nikomu inému,
aj keď môže mať rovnaké alebo podobné
príznaky ako vy.**

Dôležité informácie

Nepoužívajte PRILIGY®, ak:

- Vám Váš lekár nediagnostikoval PE
- ste alergický na dapoxetín alebo inú zložku PRILIGY® (uvedenú v príbalovej informácii pre pacienta)
- máte problémy so srdcom, napríklad srdcové zlyhanie alebo problémy so srdcovým rytmom
- máte stredne závažné až závažné problémy s pečeňou
- trpíte mániou alebo ťažkou depresiou, alebo ste ňou trpeli v minulosti
- užívate niektoré lieky, napríklad inhibítory monoaminoxidázy (IMAO) alebo iné lieky na depresiu, tioridazín na liečbu schizofrénie, niektoré lieky na plesňové infekcie, niektoré lieky na HIV, niektoré antibiotiká na liečbu infekcií, lítium na bipolárnu poruchu, tryptofán na lepšiu spánok, bylinné preparáty s ľubovníkom bodkovaným, tramadol na liečbu silnej bolesti a lieky používané na liečbu migrény.

Navyše:

- prípravok PRILIGY® by ste nemali užívať, ak užívate inhibítory PDE-5 (používané na liečbu erektilnej dysfunkcie), pretože kombinovanie prípravku PRILIGY® s týmito liekmi môže zvýšiť pravdepodobnosť mdlôb
- poraďte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom o všetkých liekoch vrátane rastlinných, ktoré užívate
- PRILIGY® nie je určený pre ženy.

Ak si nie ste istý, či by ste PRILIGY® mali užívať, porozprávajte sa so svojím lekárom.

Ako užívať PRILIGY®

PRILIGY® užíte 1 až 3 hodiny pred pohlavným stykom, nie však častejšie než raz za 24 hodín.

- Odporúčaná úvodná dávka pre všetkých pacientov je 30 mg. Váš lekár Vám môže dávku zvýšiť na 60 mg.
- Tablety prehltajte celé, aby ste predišli horkej chuti, a zapite ich najmenej jedným plným pohárom vody.
- PRILIGY® sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla.
- Počas užívania PRILIGY® sa vyhýbajte konzumácii alkoholu. Kombinácia PRILIGY® a alkoholu môže zvýšiť pravdepodobnosť mdlôb, ako aj účinky spojené s alkoholom, napríklad závrat, ospalosť a pomalé reakcie.
- PRILIGY® nepoužívajte v kombinácii s rekreačnými drogami (napríklad extázou, LSD, narkotikami alebo benzodiazepínmi), ktoré môžu v kombinácii s PRILIGY® vyvolať potenciálne závažné reakcie.

***PRILIGY® užíajte
1 až 3 hodiny pred
pohlavným stykom.***

**Neužívajte viac PRILIGY®,
než Vám predpísal lekár.**

PRILIGY® neužívajte častejšie než raz za 24 hodín a neužívajte každý deň.

Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

Dôležité informácie

Dôležité: pri užívaní PRILIGY® budte opatrný

Pri užívaní PRILIGY® budte opatrný, pretože môže vyvolať mdloby alebo závrat. Ak cítite, že by ste mohli upadnúť do mdlôb (napríklad máte závrat, alebo ste omámený), ihneď si ľahnite, a to tak, aby ste mali hlavu nižšie než zvyšok tela, alebo si sadnite a hlavu si dajte medzi kolená. V tejto polohe zotrvať, kým sa nebudete cítiť lepšie. Takto predídete pádu a poraneniu, ak by ste náhodou odpadli.

— Ak máte závrat, alebo ste omámený, nevedzte vozidlo a neobsluhujte stroje.

— Počas užívania PRILIGY® nekonzumujte alkohol. Kombinácia PRILIGY® a alkoholu môže zvýšiť pravdepodobnosť upadnutia do mdlôb, čím sa zvýši riziko náhodného poranenia a zároveň môže dôjsť aj k zvýrazneniu účinkov súvisiacich s alkoholom.

Ďalšie informácie nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

Užívanie PRILIGY®

Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj PRILIGY® môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Veľmi časté vedľajšie účinky PRILIGY® (postihujú najmenej 1 z 10 osôb):

- závrat
- bolesť hlavy
- nevoľnosť

Najčastejšími vedľajšími účinkami PRILIGY® sú závrat, bolesť hlavy a nevoľnosť.

Po užití PRILIGY® sa môžu vyskytnúť mdloby, hoci podľa hlásení k nim nedochádza často (postihujú 1 až 10 užívateľov z 1 000).

Úplný zoznam častých vedľajších účinkov (postihujúcich 1 z 10 až 1 zo 100 osôb) nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

Dôležité informácie

PRILIGY® prestaňte užívať a okamžite navštívte lekára, ak:

- máte kŕče (záchvaty)
- po postavení sa upadnete do mdlôb, alebo sa cítite omámený
- spozorujete nejaké zmeny nálad
- máte samovražedné myšlienky alebo myšlienky na seba poškodzovanie.

Ak spozorujete niektorý z vyššie uvedených prejavov, tento liek prestaňte užívať a okamžite navštívte lekára.

Úplné informácie o bezpečnosti lieku nájdete v písomnej informácii pre používateľa.

Dôležité bezpečnostné informácie

Tri kroky k zníženiu rizika mdlôb a nízkeho krvného tlaku

*Mdloby alebo nízky
krvný tlak sa môžu
vyskytnúť po postavení
sa, toto riziko však
môžete znížiť pomocou
3 jednoduchých krokov*

- 1. PRILIGY® zapite vodou a neužívajte ho, ak ste dehydrovaný.**

Dehydrovaný môžete byť, alebo v tele nemusíte mať dosť vody, ak:

- ste v predchádzajúcich 4 až 6 hodinách nič nepili
- ste sa dlho potili
- máte ochorenie sprevádzané vysokou teplotou alebo hnačkou, alebo vraciate.

- 2. Keď ste užili PRILIGY®, po dlhodobom sedení alebo ležaní nevstávajte rýchlo.**

Dôležité informácie

3. Ak sa po postavení cítite omámený alebo máte pocit, že by ste mohli upadnúť do mdlôb, ihneď si ľahnite a to tak, aby ste mali hlavu nižšie než zvyšok tela, alebo si sadnite a hlavu si dajte medzi kolená. V tejto polohe zotrvaťe, kým sa nebudete cítiť lepšie.

- Takto predídete pádu a poraneniu, keby ste náhodou odpadli.
- Príznaky možného upadnutia do mdlôb:

— nevoľnosť	— potenie
— zmätenosť	— omámenosť
— závrat	— abnormálny tep

Ak Vám je počas užívania PRILIGY® na odpadnutie, nevedzte vozidlo a neobsluhujte stroje.

Keď počas užívania tohto lieku odpadnete, povedzte to svojmu lekárovi.

Ako si byť istý, že je Váš prípravok PRILIGY® pravý

***PRILIGY® kupujte len
od legálnych predajcov***

Rovnako ako je to dnes v prípade všetkých liekov, aj s týmto liekom sa spája riziko falšovania. Falošné produkty nemusia obsahovať správne liečivo, nemusia obsahovať vôbec žiadne liečivo, alebo dokonca môžu obsahovať škodlivé látky. Aby ste ochránili svoje zdravie, dodržiavajte nasledujúce kroky:

- 1. PRILIGY® si na základe lekárskeho predpisu objednáajte len od legálnych predajcov, napríklad v miestnej lekární. Nekupujte PRILIGY® bez lekárskeho predpisu na internete, pretože mnoho webových stránok ponúka falošné lieky.**
 - Zoznam subjektov vykonávajúcich internetový výdaj liekov je uvedený na stránke Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv.
 - Budte opatrný v prípade webových stránok, ktoré nevyžadujú lekársky predpis od Vášho lekára alebo ponúkajú špeciálne ceny liekov, pretože takéto stránky často predávajú falošné lieky.
- 2. Venujte pozornosť tomu, ako by mal liek a jeho obal vyzeráť (pozri nasledujúcu časť „Balenie PRILIGY®“). Ak sú vo vzhľade nejaké odlišnosti, liek neužívajte.**

Dôležité informácie

3. Navštívte stránku www.genuinepriligy.com a overte si, či je Váš PRILIGY® pravý.

- Na bočnej strane balenia je vytlačené sériové číslo. Toto sériové číslo je na každom balení lieku PRILIGY® iné a na balenie bolo vytlačené počas výroby. Je to 12-miestne číslo začínajúce písmenami SČ.
- Keď si otvoríte stránku www.genuinepriligy.com, najprv si zvolíte svoj jazyk a potom postupujte podľa pokynov, aby ste mohli zadať 12-miestne číslo.
- Zadajte 12-miestne číslo (nezadáajte písmená SČ). Dozviete sa, či je Váš PRILIGY® pravý alebo nie.

Balenie PRILIGY®

PRILIGY® sa dodáva v blistroch, ktoré obsahujú 3 alebo 6 filmom obalených tabliet. Blistre sú zabalené v trojitom obale s uvedením dôležitých informácií, ktoré musíte poznať predtým, než PRILIGY® užijete. Tento trojitý obal je zapečatený striebornou nálepkou, na ktorej bude zrejmé, ak s ňou niekto neoprávnene manipuloval. Po odstránení zapečatenia zostanú na obale lepkavé zvyšky pripomínajúce mozaiku. Ak je pečať otvorená alebo chýba, liek neužívajte. Tablety sú okrúhle a na jednej strane majú vnútri trojuholníka vyryté číslo.



Dôležité informácie

Ak máte podozrenie, že Váš PRILIGY® nie je pravý, liek neužívajte. Kontaktujte svojho lekára alebo lekárnika, prípadne zatelefonujte na telefónne číslo zákazníckej linky spoločnosti Berlin-Chemie/Menarini:

+421 905 551 639



SK-PRI-03-2017-V01-Folder



BERLIN-CHEMIE
MENARINI

Tento materiál je súčasťou Risk Management
Plánu držiteľa registračného rozhodnutia o lieku.
Dátum výroby materiálu: máj 2017
Zastúpenie v SR: Berlin-Chemie AG, Palisády 29
811 06 Bratislava, tel.: 02/5443 0730,
fax: 02/5443 0724, slovakia@berlin-chemie.com

