

Dátum návštevy lekára:

Referencie: 1. SPC Remicade, jún 2019, Janssen Biologics B.V.



Copyright © 2019 Merck Sharp & Dohme Corp.,
a subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA.
Všetky práva vyhradené. Merck Sharp & Dohme, s. r. o.,
so sídlom Karadžičova 2, Bratislava 811 09, Slovenská republika
Tel: +421 2 5828 2010, d poc_czechslovak@merck.com

SK-MAB-00009 Dátum vypracovania: august 2019

 **Remicade**[®]
INFLIXIMAB

KARTA S PRIPOMIENKAMI PRE PACIENTA¹



KARTA S PRIPOMIENKAMI PRE PACIENTA¹

Meno pacienta: _____

Meno lekára: _____

Telefónne číslo lekára: _____

Táto **Karta s pripomienkami pre pacienta** obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, o ktorých potrebujete vedieť pred a počas liečby Remicade.

Túto kartu ukážte každému lekárovi, ktorý sa podieľa na vašej liečbe.

Predtým, ako začnete používať tento liek, si prosím, pozorne prečítajte „Písomnú informáciu pre používateľa“ lieku Remicade.

Dátum začatia liečby Remicade:

Terajšie podania: _____

Je dôležité, aby ste si vy aj váš lekár zaznamenali názov a číslo šarže vášho lieku.

Požiadajte vášho lekára, aby sem zaznamenal typ a dátum posledného vyšetrenia (vyšetrení) na tuberkulózu (TBC):

Test: _____ Test: _____

Dátum: _____ Dátum: _____

Výsledok: _____ Výsledok: _____

Uistite sa, prosím, že pri každej návšteve tubovofného zdravotníckeho pracovníka máte pri sebe aj zoznam všetkých ďalších liekov, ktoré užívate.

Zoznam alergií: _____

Zoznam ďalších liekov: _____

Infekcie

Pred liečbou Remicade

- Povedzte vášmu lekárovi, ak máte infekciu, aj keď je veľmi slabá.
- Je veľmi dôležité, aby ste vášmu lekárovi povedali, ak ste v minulosti mali TBC, alebo ak ste boli v blízkom styku s niekým, kto TBC mal. Váš lekár vám urobí vyšetrenie, aby zistil, či máte TBC.
- Požiadajte vášho lekára, aby zaznamenal typ a dátum posledného vyšetrenia (vyšetrení) na TBC do karty.
- Povedzte vášmu lekárovi, ak trpíte hepatitídou B, alebo ak ste nositeľom, alebo máte podozrenie, že ste nositeľom vírusu hepatitídy B.

Počas liečby Remicade

- Okamžite povedzte vášmu lekárovi, ak máte prejavy infekcie. Sú to prejavy ako horúčka, pocit únavy, (pretrvávajúci) kašeľ, dýchavičnosť, chudnutie, nočné potenie, hnačka, rany, problémy so zubami, pálenie pri močení alebo prejavy podobné chrípke.

Tehotenstvo a očkovanie

- V prípade, že ste dostali Remicade počas tehotenstva, je dôležité, aby ste o tom informovali lekára vášho dieťaťa predtým, ako vaše dieťa dostane akúkoľvek vakcínu. Vaše dieťa nesmie dostať „živú vakcínu“ ako je BCG (používa sa na prevenciu tuberkulózy) počas 6 mesiacov po narodení.

Túto kartu majte stále pri sebe až 4 mesiace po vašej dávke Remicade, alebo v prípade tehotenstva počas minimálne 6 mesiacov po narodení vášho dieťaťa. Vedľajšie účinky sa môžu objaviť po dlhom čase od vašej poslednej dávky.