

Materiál pre pacienta

Informačná kartička pre pacientku/pacienta

Informačná kartička pre pacientku /pacienta

Meno lekára:

Telefón:

Isotretinoin Actavis, Aknenormin, Curacné, BELORETIN, Neotigason sa nesmie užívať počas tehotenstva.

Isotretinoin Actavis, Aknenormin, Curacné, BELORETIN, Neotigason môžu vážne poškodiť nenarodené dieťa, ak liek užíva tehotná žena.

Ak otehotníte alebo si myslíte, že ste tehotná, okamžite prestaňte užívať Isotretinoin Actavis, Aknenormin, Curacné, BELORETIN, Neotigason a kontaktujte svojho lekára.

Pred začatím liečby si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa.

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa užívania lieku Isotretinoin Actavis Aknenormin, Curacné, BELORETIN, Neotigason, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Čo musíte urobiť v prípade, že môžete otehotniť:

- **Musíte používať aspoň jednu vysoko účinnú metódu antikoncepcie (napríklad intrauterinné teliesko alebo antikoncepčný implantát) alebo musíte správne používať dve účinné metódy antikoncepcie, ktoré fungujú rôznymi spôsobmi (napríklad perorálne, t.j. ústami užívané antikoncepčné tablety spolu s kondómom), a to už pred začiatkom liečby, počas liečby a 1 mesiac po jej ukončení (v prípade Neotigasonu 3 roky po ukončení liečby).**

- **Nesmiete otehotniť** počas užívania lieku Isotretinoin Actavis, Aknenormin, Curacné, BELORETIN, Neotigason alebo po ukončení liečby počas 1 mesiaca (3 roky po ukončení liečby Neotigasonom).

- **Musíte absolvovať pravidelné lekárske kontroly a podstupovať pravidelné tehotenské testy:**

- Pred začatím liečby si musíte urobiť tehotenský test, ktorý musí byť negatívny.

- Aby ste sa ubezpečili, že ste v priebehu liečby neotehotneli, musíte pravidelne vykonať tehotenský test, ideálne raz mesačne. Posledný tehotenský test musíte urobiť 1 mesiac po ukončení liečby (3 roky pre Neotigason).

Upozornenie

Tento liek bol predpísaný iba vám, **nedávajte ho nikomu inému a vráťte všetky nepoužité kapsuly späť do lekárne.**

Pacienti liečení Isotretinoinom Actavis, Aknenorminom, Curacné a BELORETINOM nesmú darovať krv počas liečby a 1 mesiac po ukončení liečby (3 roky v prípade Neotigasonu – acitretín) kvôli potenciálnemu riziku pre plod tehotnej príjemkyne transfúzie.

Tabuľka návštev

Použite, prosím, túto tabuľku na zaznamenanie dátumov návštev u vášho lekára:

Meno lekára:

Telefón:

| Dátum kontroly u lekára | Použitá antikoncepcia | Výsledok tehotenského testu | Podpis lekára |
|--------------------------------|------------------------------|---|----------------------|
| | | <input type="checkbox"/> Pozitívny <input type="checkbox"/> Negatívny Dátum: | |
| | | <input type="checkbox"/> Pozitívny <input type="checkbox"/> Negatívny Dátum | |
| | | <input type="checkbox"/> Pozitívny <input type="checkbox"/> Negatívny Dátum | |
| | | <input type="checkbox"/> Pozitívny <input type="checkbox"/> Negatívny Dátum | |
| | | <input type="checkbox"/> Pozitívny <input type="checkbox"/> Negatívny Dátum | |
| | | <input type="checkbox"/> Pozitívny <input type="checkbox"/> Negatívny Dátum | |
| | | <input type="checkbox"/> Pozitívny <input type="checkbox"/> Negatívny Dátum | |