

Túto kartičku ukážte každému zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý sa podieľa na vašej lekárskej starostlivosti - napríklad vášmu zubárovi alebo lekárovi na pohotovosti.

▼ Tento liek je predmetom ďalšieho monitorovania. Môžete k nemu prispieť, nahlásením nežiaducich účinkov (NÚ) spoločnosti AbbVie na safety-sk@abbvie.com alebo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Tel: +421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie NÚ je na stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/ Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické hlásenie NÚ: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>.


Vaše meno:

.....
Meno lekára, ktorý predpísal RINVOQ®:

.....
Telefónne číslo lekára:

.....
Dátum, kedy ste začali užívať RINVOQ®:

.....
Verzia 1.0. Schválené: 17. októbra 2019.
SK-RNQR-200004



abbvie

Informačná kartička pre pacienta Túto kartičku majte stále pri sebe

Bezpečnostné informácie o lieku RINVOQ® ▼ (upadacitinib) pre pacientov

- Táto kartička obsahuje dôležité bezpečnostné informácie, o ktorých by ste mali vedieť pred liečbou a počas liečby liekom RINVOQ®.
- Ďalšie informácie nájdete v Písomnej informácii pre používateľa.

Riziko infekcií

RINVOQ® môže zhoršiť existujúcu infekciu alebo zvýšiť pravdepodobnosť, že dostanete novú infekciu - napríklad tuberkulózu (TBC), pásový opar alebo vírusovú hepatitídu.

Ihneď informujte svojho lekára, ak si všimnete prejavy infekcie, ako napríklad:

- horúčka, potenie, zimnica, strata hmotnosti alebo kašeľ, ktorý neprestáva - môžu to byť prejavy tuberkulózy (TBC)
- bolestivá kožná vyrážka s pľuzgiermi - môže to byť prejav pásového oparu
- pocit únavy alebo dýchavičnosť - môže to byť prejav infekcie pľúc.

Očkovacie látky - používané na prevenciu infekcií

Živé očkovacie látky (napríklad očkovacia látka proti chrípke vo forme spreja do nosa) sa nemajú podávať počas liečby alebo tesne pred začiatkom liečby liekom RINVOQ®.

Pred očkovaním sa poraďte so svojím lekárom - bude vedieť, ktoré vakcíny **nemáte** dostať pred liečbou alebo počas liečby liekom RINVOQ®.

Cholesterol

Váš lekár vám počas užívania lieku RINVOQ® bude kontrolovať hladinu cholesterolu a rozhodne, či je nutné začať s užívaním lieku na zníženie hladiny cholesterolu.

Antikoncepcia, tehotenstvo a dojčenie

RINVOQ® sa nesmie užívať počas tehotenstva.

- Používajte účinnú antikoncepciu počas užívania lieku RINVOQ® a 4 týždne po poslednej dávke. Poradte sa so svojím lekárom o účinnej antikoncepcii.
- Ak chcete otehotnieť alebo ak otehotníte, okamžite to oznámte svojmu lekárovi.
- Počas užívania lieku RINVOQ® nedojčite.

Krvné zrazeniny v žilách alebo pľúcach

Hneď informujte svojho lekára, ak sa vám objavia prejavy krvných zrazenín v žilách alebo pľúcach, ako je napríklad bolestivá opuchnutá noha alebo bolesť na hrudníku.