

VÝSTRAŽNÁ KARTA PACIENTA

((Predný obal))

Dôležité bezpečnostné upozornenia pre pacientov, ktorí užívajú STAYVEER (bosentan)

Táto kartička obsahuje dôležité informácie o lieku STAYVEER. Prosím, prečítajte si túto kartičku pozorne, skôr ako začnete liečbu STAYVEERom.

Vaše meno: _____

Lekár, ktorý liek predpísal: _____

Ak máte otázky, ktoré sa týkajú STAYVEERu, opýtajte sa svojho lekára.

Marklas Nederland BV

((Zadný obal))

Antikoncepcia

Používate alebo užívate v súčasnosti antikoncepciu?

Áno Nie

Ak áno, napíšte sem názvy _____

Pri vašej najbližšej návšteve si vezmite túto kartičku k vášmu lekárovi alebo gynekológovi a on/ona vám bude vedieť poradiť, či potrebujete doplnkovú alebo alternatívnu metódu antikoncepcie.

((Vnitorná strana 1))

Pokiaľ ste žena v plodnom veku, prečítajte si prosím pozorne túto stranu

Tehotenstvo

STAYVEER môže poškodiť vývoj plodu. Preto nesmiete užívať STAYVEER, pokiaľ ste tehotná a takisto nesmiete otehotnieť počas užívania STAYVEERu.

Okrem toho, pokiaľ sa liečite na pľúcnu hypertenziu, tehotenstvo môže závažne zhoršiť symptómy vášho ochorenia. Ak máte podozrenie, že by ste mohli byť tehotná, oznámte to svojmu lekárovi alebo gynekológovi.

Antikoncepcia

Hormonálna antikoncepcia – ako je antikoncepcia na vnútorné použite alebo tabletky na kontrolu počatia, hormonálne injekcie, implantáty, lebo náplaste proti počatiu, nie sú spoľahlivým spôsobom, ktorý zabraňuje otehotneniu u žien, ktoré užívajú STAYVEER. Navyše ku ktorémukoľvek z týchto typov hormonálnej antikoncepcie musíte použiť bariérovú antikoncepciu – kondóm, vaginálnu diafragmu alebo antikoncepcijnú špongu ako doplnkovú antikoncepcijnú metódu k hormonálnej antikoncepcii. Akékoľvek prípadné otázky určite prediskutujte so svojím lekárom alebo gynekológom – doplňte detaily na opačnej strane tejto kartičky a pri najbližšej návšteve kartičku vezmite k svojmu lekárovi alebo gynekológovi.

Pred začatím liečby STAYVEERom ako aj každý mesiac počas liečby sa máte podrobiť tehotenskému testu, a to aj v prípade, keď si myslíte, že nie ste tehotná.

Dátum prvého mesačného testu: _____

((Vnitorná strana 2))

Krvný test na stanovenie funkcie pečene

U niektorých pacientov užívajúcich STAYVEER sa objavili abnormálne výsledky v testoch pečňových funkcií. Počas liečby STAYVEERom váš lekár vykoná pravidelné krvné testy, aby zistil zmeny funkcie vašej pečene.

Nezabudnite na pečňové krvné testy každý mesiac.

Po zvýšení dávky sa uskutoční prídavný test po 2 týždňoch.

Dátum prvého mesačného testu: _____

Harmonogram Vašich mesačných pečňových testov:

Január Máj September

Február Jún Október

Marec Júl November

Apríl August December