

Dátum návštevy lekára:

Referencie: 1. SPC Simponi, jún 2019, Janssen Biologics, B.V.


Simponi[®]
-golimumab

**KARTA
S PRIPOMIENKAMI
PRE PACIENTA¹**



MSD

Copyright © 2019 Merck Sharp & Dohme Corp.,
a subsidiary of Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA.
Všetky práva vyhradené. Merck Sharp & Dohme, s.r.o.,
so sídlom, Karadžičova 2, 811 09 Bratislava
Tel: +421 2 5828 2010, dpoc_czechslovak@merck.com
SK-GOL-00046 Dátum vypracovania: august 2019



MSD

KARTA S PRIPOMIENKAMI PRE PACIENTA, KTORÉMU BOL PREDPISANÝ LIEK SIMPONI¹

Táto **Karta s pripomienkami pre pacienta** obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, ktoré je potrebné, aby ste si uvedomili pred a počas liečby Simponi. **Túto kartu ukážte každému lekárovi, ktorý sa podieľa na vašej liečbe.**

1. Infekcie

Ak sa liečite Simponi, môžete dostať infekciu oveľa ľahšie. Infekcie sa môžu vyvíjať rýchlejšie a môžu byť závažnejšie. Okrem toho sa môžu znovu objaviť infekcie prekonané v minulosti.

1.1 Pred liečbou Simponi

- Ak máte infekciu, povedzte to vášmu lekárovi. Nesmiete byť liečený Simponi, ak máte tuberkulózu (TBC) alebo akúkoľvek inú závažnú infekciu.
- Máte byť vyšetrený na TBC. Je veľmi dôležité, aby ste povedali lekárovi, ak ste už v minulosti mali TBC, alebo ak ste boli v bezprostrednom kontakte s niekým, kto mal TBC.

Požiadajte vášho lekára, aby nižšie zaznamenal typ a dátum posledného vyšetrenia na TBC:

Vyšetrenie: _____ Dátum: _____

Výsledok: _____

Vyšetrenie: _____ Dátum: _____

Výsledok: _____

- Ak viete, že ste nositeľom vírusu hepatitídy typu B, alebo máte podozrenie, že ste nositeľom, povedzte to vášmu lekárovi.

1.2. Počas liečby a po liečbe Simponi:

- V prípade rozvoja príznakov poukazujúcich na vznik infekcie, ako sú horúčka, únava, (pretrvávajúci) kašeľ, dýchavičnosť, príznaky podobné chrípke, strata telesnej hmotnosti, nočné potenie, hnačka, rany, ťažkosti so zubami a pocit pálenia pri močení, okamžite vyhľadajte lekára.

2. Tehotenstvo a očkovania

Ak ste dostávali Simponi počas tehotenstva, je dôležité, aby ste o tom informovali lekára svojho dieťaťa predtým, ako vaše dieťa dostane akúkoľvek vakcínu. Vaše dieťa nesmie dostať „živú vakcínu“ ako je BCG (používaná na prevenciu tuberkulózy) až do 6 mesiacov po vašej poslednej injekcii Simponi počas tehotenstva.

3. Dátumy liečby Simponi:

Prvé podanie: _____

Následné podania: _____

Je dôležité, aby ste si vy a váš lekár zaznamenali obchodný názov a číslo šarže vášho lieku.

4. Iné informácie

Meno pacienta: _____

Meno lekára: _____

Telefónne číslo lekára: _____

- Pri každej návšteve akéhokoľvek zdravotníckeho pracovníka sa, prosím, uistite, že máte so sebou aj zoznam všetkých iných liekov, ktoré užívate.
- Keďže sa vedľajšie účinky môžu objaviť po dlhom čase po vašej poslednej dávke Simponi, túto kartu majte stále pri sebe až 6 mesiacov po vašej poslednej dávke Simponi.
- Predtým, ako začnete používať tento liek, si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľov Simponi.