

VÝSTRAŽNÁ KARTA PACIENTA

((Predný obal))

Dôležité bezpečnostné upozornenia pre pacientov, ktorí užívajú STAYVEER (bosentan)

Táto kartička obsahuje dôležité informácie o lieku STAYVEER. Prosím, prečítajte si túto kartičku pozorne, skôr ako začnete liečbu STAYVEERom.

Vaše meno: _____

Lekár, ktorý liek predpísal: _____

Ak máte otázky, ktoré sa týkajú STAYVEERu, opýtajte sa svojho lekára.

Janssen-Cilag International NV

((Zadný obal))

Antikoncepcia

Používate alebo užívate v súčasnosti antikoncepciu?

Áno _____ Nie _____

Ak áno, napíšte sem názvy

Pri vašej najbližšej návšteve si vezmite túto kartičku k svomu lekárovi alebo gynekológovi a on/ona vám bude vedieť poradiť, či potrebujete doplnkovú alebo alternatívnu metódu antikoncepcie.

((Vnútoraná strana 1))

Pokiaľ ste žena v plodnom veku, prečítajte si, prosím, pozorne túto stranu

Tehotenstvo

STAYVEER môže poškodiť vývoj plodu. Preto nesmiete užívať STAYVEER, pokiaľ ste tehotná a takisto nesmiete otehotnieť počas užívania STAYVEERu.

Okrem toho, pokiaľ sa liečite na pľúcnu hypertenziu, tehotenstvo môže závažne zhoršiť príznaky vášho ochorenia. Ak máte podozrenie, že by ste mohli byť tehotná, oznámte to svojmu lekárovi alebo gynekológovi.

Antikoncepcia

Hormonálna antikoncepcia – ako je antikoncepcia na vnútorné použitie alebo tabletky na kontrolu počatia, hormonálne injekcie, implantáty, lebo náplasti proti počatiu, nie sú spoľahlivým spôsobom, ktorý zabráni otehotneniu u žien, ktoré užívajú STAYVEER. Navyše ku ktorémukoľvek z týchto typov hormonálnej antikoncepcie musíte použiť bariérovou antikoncepciu – kondóm, vaginálnu diafragmu alebo antikoncepčnú špongiu ako doplnkovú antikoncepčnú metódu k hormonálnej antikoncepcii. Akékoľvek prípadné otázky určite prediskutujte so svojim lekárom alebo gynekológom – doplňte detaily na opačnej strane tejto kartičky a pri najbližšej návšteve kartičku vezmite k svojmu lekárovi alebo gynekológovi.

Pred začatím liečby STAYVEERom ako aj každý mesiac počas liečby sa máte podrobiť tehotenskému testu, a to aj v prípade, keď si myslíte, že nie ste tehotná.

Dátum prvého mesačného testu: _____

((Vnútoraná strana 2))

Krvný test na stanovenie funkcie pečene

U niektorých pacientov užívajúcich STAYVEER sa objavili abnormálne výsledky v testoch pečenevých funkcií. Počas liečby STAYVEERom váš lekár vykoná pravidelné krvné testy, aby zistil zmeny funkcie vašej pečene.

Nezabudnite na pečenevé krvné testy každý mesiac.

Po zvýšení dávky sa uskutoční prídavný test po 2 týždňoch.

Dátum prvého mesačného testu: _____

Harmonogram vašich mesačných pečenevých testov:

Január _____ Máj _____ September _____

Február _____ Jún _____ Október _____

Marec _____ Júl _____ November _____

Apríl _____ August _____ December _____

