
Stelara® (ustekinumab)

informácie o lieku

pre pacientov

Dátum vypracovania: Október 2017

Túto brožúru si pozorne prečítajte spolu s Písomnou informáciou pre používateľa.

Brožúra obsahuje dôležité informácie o lieku Stelara®, ktorý vám váš lekár predpísal na liečbu ložiskovej psoriázy, psoriatickej artritídy alebo Crohnovej choroby. Brožúra bola napísaná pre toho, kto bude liek užívať. Ak ste rodič alebo opatrovateľ, ktorý bude liek Stelara® podávať dieťaťu, prečítajte si, prosím, pozorne tieto informácie.

Obsah

Čo je Stelara® a ako funguje?	4
Ako sa Stelara® používa?	5
Aké výsledky môžete od liečby liekom Stelara® očakávať?	8
Stelara® a vaše ochorenie	12
Dôležité informácie	14
Injekčný kalendár	18
Poznámky	30

Čo je Stelara® a ako funguje?

Stelara® (ustekinumab) je liek pre pacientov, ktorí trpia stredne závažnou až závažnou ložiskovou psoriázou (pre dospelých a dospievajúcich vo veku od 12 rokov), aktívnu psoriatickou artritídou alebo Crohnovou chorobou (len pre dospelých). Stelara® je monoklonová protilátka, inak tiež označovaná ako biologický liek.

Protilátku je bielkovina, ktorú produkuje váš imunitný systém. Jednou z vlastností protilátok je, že rozpoznávajú jedno konkrétné miesto na jednej konkrétnej molekule a viažu sa naň. Táto vlastnosť, nazývaná „specifita“, umožňuje protilátkam bojať s infekciou (napríklad na „nevlastné“ molekuly na baktériách) a zároveň nepoškodzovať vaše („vlastné“) tkaniá. Monoklonové protilátky sú jednoducho mnohonásobné kópie jedného typu protilátky.

Stelara® funguje tak, že sa viaže na cytokíny interleukín-12 a interleukín-23, ktoré sú dôležité pre rozvoj a udržiavanie psoriázy, psoriatickej artritídy a Crohnovej choroby, a deaktivuje ich.

Ako sa Stelara® používa?

Stelara® sa môže použiť na liečbu troch ochorení: psoriázy (u dospelých a dospevajúcich), psoriatickej artritídy a Crohnovej choroby (len u dospelých).

Konkrétnie:

- Stelara® je indikovaná na liečbu stredne závažnej až závažnej ložiskovej psoriázy u dospelých pacientov, ktorým lekár odporučil, aby nepokračovali v inej liečbe ložiskovej psoriázy alebo fototerapii.
- Stelara® je indikovaná na liečbu stredne závažnej až závažnej ložiskovej psoriázy u dospevajúcich pacientov vo veku 12 rokov a starších, ktorí nie sú dostatočne kontrolovaní inými systémovými terapiami alebo fototerapiami, alebo ich netolerujú.
- Stelara® je indikovaná na liečbu aktívnej psoriatickej artritídy u dospelých pacientov, ak odpovede na inú nebiologickú liečbu nebola dostatočná.
- Stelara® je indikovaná na liečbu dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnu Crohnovu chorobou, u ktorých odpovede buď na konvenčnú liečbu alebo biologickú liečbu bola neadekvátna alebo došlo k strate odpovede alebo takúto liečbu netolerujú alebo je im kontraindikovaná.

Liek Stelara® sa neodporúča podávať deťom mladším ako 12 rokov a vzhľadom na všeobecne vyšší výskyt infekcií u starších osôb (65 rokov a starší) je treba pri liečbe týchto pacientov postupovať opatrnne.

Psoriáza a psoriatická artritída

Stelara® sa podáva podkožou („subkutánnou“) injekciou. Váš lekár vám poskytne bližšie informácie o tom, ako si liek Stelara® môžete podávať sami.

U dospelých pacientov s ložiskovou psoriázou je odporúčaná dávka lieku Stelara® 45 mg, alebo 90 mg u osôb s hmotnosťou nad 100 kg. Prvé dve dávky („počiatočná liečba“) sa podávajú s odstupom 4 týždňov. Potom budete dostávať jednu injekciu každých 12 týždňov. U dospevajúcich so psoriázou sa odporúčaná dávka vypočíta podľa hmotnosti pacienta v čase podania injekcie. Ak vážite menej ako 60 kg, váš lekár stanoví množstvo lieku Stelara® potrebné pre každé injekčné podanie. Dospevajúci pacienti s hmotnosťou 60 kg až 100 kg budú dostávať dávku 45 mg a dospevajúci pacienti s hmotnosťou nad 100 kg budú dostávať dávku 90 mg.

Počiatočná liečba (prvé dve dávky) aj udržiavacia liečba sa podávajú rovnako často ako u dospelých pacientov.

U pacientov so psoriatickou artritídou je odporúčaná počiatočná subkutánna dávka lieku Stelara® 45 mg, po nej nasleduje dávka 45 mg po 4 týždňoch a ďalej každých 12 týždňov. U pacientov s hmotnosťou nad 100 kg sa môže podávať dávka 90 mg.

Ak sa u vás ani po 28 týždňoch liečby nedostavila odpoveď, váš lekár môže uvažovať o prerušení liečby.

Crohnova choroba

Počas liečby vám lekár podá prvú dávku lieku Stelara®, približne 6 mg/kg, infúziou do žily na ruke (intravenózna infúzia). Veľkosť počiatocnej dávky závisí od telesnej hmotnosti.

Po úvodnej dávke dostanete ďalšiu dávku 90 mg lieku Stelara® po 8 týždňoch a následne každých 12 týždňov injekčne pod kožu (subkutánne). U niektorých pacientov sa dávka 90 mg lieku Stelara® môže podávať každých 8 týždňov. O tom, ako často budete liek dostávať, rozhodne lekár.

Ak ste dostávali injekcie s liekom Stelara® každých 12 týždňov a váš lekár vás informoval, že potrebujete používať liek Stelara® častejšie, prejdite na časový harmonogram s podávaním lieku každých 8 týždňov. Čas podania najbližšej dávky vypočítajte ako 8 týždňov po poslednej podanej dávke.

Ak sa u vás ani po 16 týždňoch liečby nedostavila odpoveď na liečbu, váš lekár môže uvažovať o prerušení liečby.

Porozprávajte sa so svojim lekárom o tom, ako si liek Stelara® môžete podávať sami.

Aké výsledky môžete od liečby liekom Stelara® očakávať?

Účinnosť v klinických štúdiách u pacientov s ložiskovou psoriázou

Liek Stelara® sa skúmal u viac ako 2 000 dospelých pacientov so stredne závažnou až závažnou ložiskovou psoriázou. Rozsah a závažnosť psoriatických lézíí pred liečbou a počas nej sa v týchto štúdiach hodnotili pomocou skóre PASI (PASI = Psoriasis Area and Severity Index, Index rozsahu a závažnosti psoriázy). Úspešná odpoveď na liečbu bola definovaná ako zníženie skóre PASI aspoň o 75 % – tento cieľ liečby sa označuje ako PASI 75.

Výsledky liečby liekom Stelara® sa u jednotlivých pacientov líšia. V klinických štúdiach však po 12 týždňoch od začiatku liečby liekom Stelara® dosiahli PASI 75 dve tretiny pacientov (67 % s dávkou 45 mg; 66 – 76 % s dávkou 90 mg). Takéto zlepšenie dosiahlo menej ako 5 % pacientov, ktorí dostávali placebo (injekciu bez lieku). Zlepšenie pri liečbe liekom Stelara® bolo zjavné už po dvoch týždňoch. Maximálna účinnosť sa dosiahla 20 – 24 týždňov po prvej injekcii, pričom 75 – 85 % dosiahlo PASI 75. Účinok liečby pretrváva, pokiaľ sa pokračuje v podávaní lieku každých 12 týždňov. Zlepšenie podľa indexu PASI sa vo všeobecnosti udržalo až 5 rokov. Pacienti, ktorí liečbu prerušia (t. j. oneskoria sa s podaním injekcie alebo ju vynechajú) sa vystavujú riziku obnovenia psoriatických lézíí.

V štúdiách sa tiež zaznamenávali účinky lieku Stelara® na nechtorú psoriázu, kvalitu života, psychickú pohodu a schopnosť pracovať – vo všetkých ohľadoch došlo počas liečby liekom Stelara® k zlepšeniu.

Liek Stelara® sa skúmal u viac ako 100 dospievajúcich pacientov so stredne závažnou až závažnou psoriázou. Tak ako v štúdiach s dospelými, rozsah a závažnosť ochorenia sa hodnotila pomocou indexu PGA (PGA = Physician's Global Assessment, celkové hodnotenie lekára). Odpoveď PGA sa merala na stupnici 0 – 5, kde 0 znamenala úplný ústup psoriázy. Cieľom liečby v štúdii bola odpoveď PGA 0 alebo 1. Viac ako dve tretiny liečených pacientov v štúdii dosiahli odpoveď PGA 0/1, v porovnaní s placebo (Stelara® 69,4% vs. placebo 5,4%). Zlepšenie bolo pozorované aj pri hodnotení odpovede PASI a kvality života počas až jedného roka liečby.

Účinnosť v klinických štúdiách u pacientov s psoriatickou artritídou

Liek Stelara® sa skúmal u viac ako 900 pacientov s aktívou psoriatickou artritídou. Vplyv liečby liekom Stelara® sa hodnotil pomocou rôznych meraní aktivity ochorenia. Patrilo k nim skóre ACR (American College of Rheumatology, Americká reumatologická spoločnosť), ktorým sa okrem iného meria opuch a citlivosť kílov. Úspešná odpoveď na liečbu bola definovaná ako zlepšenie skóre ACR aspoň o 20 % (ACR 20). Iné merania účinnosti lieku Stelara® sa zameriavajú na ďalšie klúčové aspekty ochorenia vrátane kože (skóre PASI).

Údaje z klinických štúdií ukazujú, že po 24 týždňoch od začiatku liečby liekom Stelara® dosiahlo 40 – 50 % pacientov odpoveď ACR 20, čo je významný rozdiel oproti pacientom, ktorí dostávali placebo (20 – 25 %). Zlepšenie u pacientov liečených liekom Stelara® bolo zjavné po 4 týždňoch. Túto odpoved, ako aj silnejšie odpovede v podobe zlepšenia o 50 % (ACR 50) a 70 % (ACR 70) si pacienti preukázateľne udržali až najmenej jeden rok.

Účinok lieku Stelara® sa prejavil aj na koži (odpoveď PASI 75 až u 62 % liečených pacientov oproti 5 % pacientov, ktorí liek nedostávali) a na iných aspektach ochorenia, napríklad na zápale miest, kde sa šľachy a väzy upínajú ku kosti (entezitída) a zápale celých prstov na rukách a na nohách (daktylitída). U pacientov liečených liekom Stelara® sa zmiernilo poškodenie kostí rúk a nôh, pričom tento účinok sa udržal až jeden rok. Liek Stelara® mal preukázateľný účinok aj na telesné funkcie, kvalitu života a únavu.

Účinnosť v klinických štúdiách u pacientov s Crohnovou chorobou

Liek Stelara® sa skúmal u viac ako 1 300 pacientov s Crohnovou chorobou. Vplyv liečby sa posudzoval pomocou skóre podľa indexu CDAI (Crohn's Disease Activity Index, Index aktivity Crohnovej choroby), ktorý meria aktivitu Crohnovej choroby. Úspešná odpoveď na liečbu bola definovaná ako zníženie skóre CDAI oproti východiskovému stavu aspoň o 100 bodov (CDAI 100). Iné merania účinnosti lieku Stelara® pri Crohnovej chorobe sa zameriavajú na ďalšie klúčové aspekty ochorenia vrátane biomarkerov a hojenia sliznice.

Údaje z klinických štúdií ukazujú, že po 6 týždňoch od počiatočnej liečby liekom Stelara® dosiahlo až 50 % pacientov odpoved CDAI 100, čo je významný rozdiel oproti pacientom, ktorí dostávali placebo (15 – 20 %). Táto odpoveď a tiež remisia (definovaná ako skóre CDAI <150 bodov) boli preukázateľne zachované až do 44. týždňa udržiavacej liečby.

Zlepšenie príznakov aj biomarkerov sa u pacientov liečených liekom Stelara® prejavilo už po troch týždňoch.

Polovica pacientov, ktorí dosiahli odpoveď po počiatočnej liečbe, bola v 44. týždni v remisií.

Stelara® a vaše ochorenie

Prečo by ste mali v liečbe liekom Stelara® vytrvať?

Aby mohla byť liečba liekom Stelara® pre vás prínosom, je potrebné dodržiavať harmonogram dávkovania. Využite kalendár na konci tejto brožúrky a zaznamenajte si, kedy vás čaká ďalšia injekcia.

Ak sa u vás ani po 28 týždňoch liečby psoriázy alebo psoriatickej artritídy nedostavila odpoveď, váš lekár môže uvažovať o prerušení liečby. Ak sa u vás ani po 16 týždňoch liečby Crohnovej choroby nedostavila odpoveď, váš lekár môže uvažovať o prerušení liečby.

Možné vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Stelara® môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého. Vedľajšie účinky bývajú väčšinou mierne až stredne ťažké. U niektorých pacientov sa však môžu prejavoviť závažné vedľajšie účinky, ktoré môžu vyžadovať liečbu.

Ked' si budeťe liek Stelara® podávať sami, pamäťajte na to, že môže dôjsť k vzniku reakcie z precitlivenosti.

Ak spozorujete ktorokolvek z týchto závažných vedľajších účinkov, okamžite to oznámte lekárovi – možno budeťe potrebovať rýchlu zdravotnícku pomoc:

- prejavy alergickej reakcie ako opuchnutie tváre, pier, úst alebo hrudia, ktoré môže sťažovať prehľatie alebo dýchanie, kožná vyrážka, žihľavka, opuchnutie rúk, nôh alebo členkov
- prejavy infekcie (vrátane tuberkulózy) ako horúčka, pocit únavy alebo dýchavičnosť, pretrvávajúci kašeľ, príznaky podobné chŕipke, pocit pálenia pri močení, teplá, červená a bolestivá koža alebo bolestivá kožná vyrážka s pluzgiermi. Môžu to byť prejavy infekcií ako infekcie hrudníka, kožné infekcie alebo pásový opar, ktoré môžu mať vážne komplikácie
- prejavy infekcií hrudníka (infekcie dolných dýchacích ciest), ako kašeľ, uvoľňovanie hlieu, vysoká teplota, závrat, pocit tlaku alebo ťažoby na hrudníku, dýchavičnosť alebo zrýchlenie frekvencie dýchania. Príznakmi infekcie dolných dýchacích ciest môže byť tiež upchatie nosa, výtok z nosa a zrýchlený tlkot srdca
- prejavy nízkeho krvného tlaku ako závraty alebo točenie hlavy

V klinických štúdiách a u pacientov liečených liekom Stelara® mimo klinických štúdií boli pozorované tieto vedľajšie účinky lieku Stelara®:

- U 1 až 10 zo 100 pacientov: infekcia nosa, hrdla alebo dýchacích ciest, závrat, bolesť hlavy, bolesť v krku, hnačka, nevoľnosť, vracanie, svrbenie, bolesť chrba, svalov alebo klbov, únava, bolesť alebo sčervenanie v okolí miesta podania injekcie.
- U 1 až 10 z 1000 pacientov: zubné infekcie, vaginálna kvasinková infekcia, opuch, svrbenie, podráždenie, krvácanie, podrliatina a zatvrdnutie v mieste podania injekcie, bakteriálna infekcia kože nazývaná flegmóna, pásový opar, vírusová infekcia nosa a krku, infekcie hrudníka, kožná vyrážka, žihľavka, upchatý alebo plný nos, depresia, pocit slabosti, akné, exfoliácia kože (môže sa podobať príznakom psoriázy, so zvýšeným odlupovaním kožných buniek) a pustulárna psoriáza (zriedkavá forma psoriázy s charakteristickými hniscovými vyrážkami). Pri liečbe liekom Stelara® boli zaznamenané menej časté prípady ochrnutia tváre (forma tvárovej paralízy, ktorá je zvyčajne dočasná).
- U 1 až 10 z 10 000 pacientov: závažné alergické reakcie vrátane anafylaxie a angioedému (s príznakmi ako sipot, závrat a opuchnutie tváre, pier, úst alebo krku, ktoré môže sťažovať prehĺtanie alebo dýchanie). V zriedkavých prípadoch bola hlásená exfoliatívna dermatitída (súhrnný názov pre typy kožných ochorení, ktorých súčasťou je nadmerné odlupovanie kožných buniek) a erytrodermálna psoriáza (zriedkavá forma psoriázy, pri ktorej sčervená koža na celom tele a ktorá sa často spája s horúčkou).

Existuje riziko vzniku závažných infekcií vrátane salmonelových, tuberkulóznych a iných mykobakteriálnych infekcií.

Liek Stelara® sa neodporúča podávať deťom mladším ako 12 rokov.

Ak ktorýkoľvek z týchto vedľajších účinkov pociťujete ako závažný alebo ak spozorujete akýkoľvek vedľajší účinok, ktorý nie je uvedený v tejto brožúre, povedzte to svojmu lekárovi alebo lekárnikovi.

Dôležité informácie

Pred začiatkom liečby liekom Stelara® sa poradte so svojím lekárom, ak sa u vás vyskytuje:

Citlivosť na latex

Kryt ihly naplnenej striekačky obsahuje latexovú gumu. To môže u ľudí citlivých na latex vyvolať závažnú alergickú reakciu. Ak sa u vás niekedy vyskytla alergická reakcia na latex alebo sa rozvinula alergická reakcia na injekciu lieku Stelara®, oznámte to svojmu lekárovi.

Infekcie

Ak máte akúkoľvek infekciu, musíte to povedať svojmu lekárovi. Je to preto, že liek Stelara® môže oslabiť vašu schopnosť bojať s infekciami. Niektoré infekcie by sa mohli zmeniť na závažné. Ak máte hoci len veľmi slabú infekciu, alebo prejavy toho, že ste sa možno nakazili, ihneď to povedzte svojmu lekárovi. K prejavom infekcie patrí horúčka, pocit únavy alebo dýchavičnosť, pretrvávajúci kašeľ, príznaky podobné chrípkе, nočné potenie, hnačka, problémy so zubami, pocit pálenia pri močení, teplá, červená a bolestivá koža, bolestivá kožná vyrážka s pluzgiermi. Ak si nie ste istý akýmkoľvek príznakmi, ktoré pocituje, je dôležité, aby ste sa čo najskôr porozprávali so svojím lekárom.

Zvlášť dôležité je, aby ste svojmu lekárovi povedali o infekcii, ktorá neprechádza alebo sa ustavične vracia.

Lekárovi tiež povedzte, ak ste sa porezali alebo máte nejaké otvorené rany, pretože by sa mohli infikovať.

Ak spozorujete niektorý z príznakov infekcie uvedených na strane 12, ihneď to povedzte svojmu lekárovi.

Tuberkulóza

Ak ste mali tuberkulózu (TB), povedzte to svojmu lekárovi. Povedzte mu tiež, ak ste nedávno boli v kontakte s niekým, kto mohol mať TB, alebo ste navštívili regióny/ krajiny, kde je TB bežná.

Lekár vás pred tým, ako dostanete liek Stelara®, vyšetrí a v súlade s predpismi vám urobí test, či nemáte TB.

Stelara® môže mať potenciál zvyšovať riziko vzniku infekcií a reaktivovať latentnú TB.

Ak sa lekár domnieva, že vám toto riziko hrozí, môže vám dať lieky na liečbu TB, a to pred liečbou liekom Stelara® aj počas nej.

Reakcie z precitlivenosti

V klinických štúdiách s liekom Stelara® sa vyrážka aj žihľavka (urtikária) pozorovali u menej ako 1% pacientov. Ak u vás dôjde k reakcii z precitlivenosti, okamžite sa obráťte na svojho lekára, pretože možno budete potrebovať rýchlu zdravotnú pomoc.

Rakovina

Lieky ako Stelara® znižujú aktivitu imunitného systému. To môže zvýšiť riziko vzniku rakoviny. Ak ste niekedy mali akýkoľvek typ nádoru, povedzte to svojmu lekárovi.

Ochorenia kože

Lieky ako Stelara® používané na liečbu ložiskovej psoriázy môžu mať nežiaduce účinky na kožu. Tieto reakcie sú niekedy ľahko rozpoznatelné a môžu sa vyskytnúť prirodzene v súvislosti s psoriázou. Medzi kožné nežiaduce účinky pozorované u pacientov liečených liekom Stelara® môže patrīť exfoliácia kože (zvýšené odlupovanie kožných buniek), exfoliatívna dermatitída (sčervenanie a odlupovanie kože z väčšej plochy tela, ktoré môže svrbieť alebo bolieť), pustulózna psoriáza (zmena psoriázy v podobe sčervenania a novovznikajúcich maličkých žltých alebo bielych pluzgierov na koži, niekedy sprevádzaná horúčkou) a erytrodermálna psoriáza (s príznakmi podobnými exfoliatívnej dermatitíde, ktorá sa niekedy rozvinú ako prirodzená zmena typu príznakov psoriázy). Ak sa u vás pri liečbe liekom Stelara® vyskytnú akékolvek zmeny na koži, okamžite sa obráťte na svojho lekára.

Poruchy nervového systému

U pacientov liečených liekom Stelara® boli zaznamenané menej časté prípady ochrnutia tváre (ovisnutie očného viečka a ovisnutie svalov na jednej strane tváre („ochrnutie tváre“ alebo „Bellovo ochrnutie“), ktoré je zvyčajne dočasné). Ak začnete pri liečbe liekom Stelara® pozorovať takéto príznaky, okamžite informujte svojho lekára.

Očkovanie

Ak ste boli prednedávnom očkovaní alebo máte byť očkovaní, povedzte to svojmu lekárovi.

Iné terapie

Informujte svojho lekára, ak pri liečbe liekom Stelara® užívate nejaký „imunosupresívny liek“ (liek, ktorý znížuje aktivitu imunitného systému) alebo sa liečíte fototerapiou (liečba, pri ktorej je telo vystavené špecifickému ultrafialovému (UV) svetlu).

Pri zvažovaní súbežného podávania týchto liekov a lieku Stelara® je vo všeobecnosti potrebná opatrnosť. Ak však trpíte psoriatickou artritídou a užívate imunosupresívny liek metotrexát, súbežná liečba metotrexátom nemá podľa všetkého vplyv na bezpečnosť ani účinnosť lieku Stelara®. Ak si nie ste istý, či sa vás niektoré z uvedených skutočností týkajú, porozprávajte sa pred začiatkom liečby liekom Stelara® so svojím lekárom, lekárnikom alebo zdravotnou sestrou. Lekár pred začiatím liečby vyhodnotí váš zdravotný stav. Nezabudnite mu určiťe povedať o všetkých ochoreniach, ktorími trpíte.

Užívanie iných liekov

Povedzte svojmu lekárovi alebo lekárnikovi, ak ste v poslednom čase užívali, užívate alebo budete užívať ďalšie lieky. Týka sa to aj liekov dostupných bez lekárskeho predpisu vrátane vitamínov a rastlinných výživových doplnkov.

Tehotenstvo a dojčenie

Pred začatím liečby liekom Stelara® sa porozprávajte so svojím lekárom:

- ak ste tehotná alebo plánujete otehotniť počas liečby liekom Stelara®. Účinky tohto lieku u tehotných žien nie sú známe.
- ak dojčíte alebo plánujete dojčiť počas liečby liekom Stelara®. Lekár rozhodne, či máte liek užívať.

Vedenie vozidiel a obsluha strojov

Stelara® nemá žiadny alebo má len zanedbateľný vplyv na schopnosť viesť vozidlá a obsluhovať stroje.

Užitočné informácie

Súhrn charakteristických vlastností lieku Stelara® (vrátane Písomnej informácie pre používateľa).

http://www.emea.europa.eu/docs/en_GB/document_library/EPAR - Product_Information/human/000958/WC500058513.pdf

Prístup v septembri 2016

Injekčný kalendár

Rok _____

1. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

2. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

3. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

4. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

5. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

6. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

Injekčný kalendár

Rok _____

7. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

8. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

9. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

10. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

11. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

12. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

Injekčný kalendár

Rok _____

1. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

2. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

3. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

4. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

5. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

6. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

Injekčný kalendár

Rok _____

7. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

8. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

9. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

10. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

11. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

12. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

Injekčný kalendár

Rok _____

1. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

2. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

3. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

4. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

5. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

6. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

Injekčný kalendár

Rok _____

7. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

8. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

9. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

10. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

11. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

12. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

Injekčný kalendár

Rok _____

1. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

2. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

3. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

4. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

5. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

6. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

Injekčný kalendár

Rok _____

7. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

8. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

9. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

10. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

11. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

12. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

Injekčný kalendár

Rok _____

1. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

2. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

3. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

4. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

5. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

6. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

Injekčný kalendár

Rok _____

7. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

8. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

9. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

10. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

11. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

12. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

Injekčný kalendár

Rok _____

1. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

2. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

3. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

4. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

5. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

6. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

Injekčný kalendár

Rok _____

7. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

8. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

9. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

10. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

11. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

12. mesiac	Poznámky
1. týždeň	
2. týždeň	
3. týždeň	
4. týždeň	
5. týždeň	

Poznámky

Meno: _____

Adresa: _____

Telefónne číslo: _____

Meno lekára: _____

Adresa lekára: _____

Telefónne číslo lekára: _____

Tu si môžete poznamenať kontaktné údaje svojho lekára, aby ste sa mu mohli rýchlo ozváť, ak budete mať otázky alebo obavy ohľadne svojho zdravotného stavu alebo liečby liekom Štelara®.



Janssen, Johnson & Johnson, s. r. o.
Karadžičova 12, 821 08 Bratislava
www.janssen.sk