



! DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

Dôležité informácie o lieku Truvada® na zníženie rizika získania infekcie vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV)


Informácie pre jedincov, ktorým bola predpísaná Truvada® na preexpozičnú profylaxiu (PrEP) (Určené predpisujúcim lekárom na rozdávanie)

Tento návod je určený len na informáciu a má doplniť (nie nahradíť) písomnú informáciu pre používateľa, ktorá sa dodáva s liekom.

Zoznam všetkých vedľajších účinkov a ďalšie dôležité informácie si prečítajte v písomnej informácii pre používateľa, ktorá je priložená v škatuli s liekom. Ak máte akékoľvek otázky, opýtajte sa svojho lekára.

164/SK/16-08//1074
Dátum prípravy november 2016

Edukační leták pacienti
A5 (148x210mm)
6 stran, rozložené 442x210mm



Čo je Truvada na PrEP?

Truvada (emtricitabín/tenofovir-dizoproxilfumarát) je liek na lekársky predpis, ktorý spolu s bezpečnejšími sexuálnymi praktikami pomáha znižovať riziko získania infekcie HIV u dospelých.


Ako užívať Truvadu

Vždy užívajte Truvadu presne tak, ako vám povedal váš lekár. Ak si nie ste niečím istý/á, overte si to u svojho lekára alebo lekárnika.

- Odporúčaná dávka je jedna tabletka Truvady denne. Pokiaľ je to možné, Truvada sa má užívať s jedlom. Truvadu užívajte každý deň, nielen vtedy, keď sa domnievate, že ste boli vystavený riziku získania infekcie HIV.
- Nevynechajte žiadne dávky Truvady, ani ju neprestávajte užívať, pokiaľ vám tak nepovedal váš lekár. Vynechanie dávok môže zvýšiť riziko získania infekcie HIV. Ak vynecháte dávku Truvady a zistíte to:
 - do 12 hodín od času, kedy zvyčajne užívate Truvadu, užite tabletu čo najskôr, najlepšie s jedlom. Potom užite nasledujúcu dávku ako zvyčajne.
 - po 12 hodinách alebo neskôr po čase, kedy zvyčajne užívate Truvadu, zabudnutú dávku už neužíte. Počkajte a užite nasledujúcu dávku v čase, keď ju zvyčajne užívate, najlepšie s jedlom.
- Ak ste vracali menej ako 1 hodinu po užíti Truvady, užite ďalšiu tabletu. Ak ste vracali viac ako 1 hodinu po užíti Truvady, nemusíte užiť ďalšiu tabletu.

Tehotenstvo a dojčenie

Ak ste tehotná alebo dojčite, ak si myslíte, že ste tehotná alebo ak plánujete otehotniť, poradte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom predtým, ako začnete užívať tento liek. Váš lekár vás môže informovať o zaradení do Registra gravidít s antiretrovírusovou liečbou, ktorá sleduje výsledky žien užívajúcich tento liek v tehotenstve.



Čo je Truvada na PrEP?

Truvada (emtricitabín/tenofovir-dizoproxilfumarát) je liek na lekársky predpis, ktorý spolu s bezpečnejšími sexuálnymi praktikami pomáha znižovať riziko získania infekcie HIV u dospelých.

Čo máte vedieť pred a počas užívania Truvady na zníženie rizika získania infekcie HIV

Na začiatie užívania Truvady na PrEP musíte byť HIV negatívny/a. Truvada môže pomôcť znížiť riziko získania infekcie HIV len vtedy, keď ešte infekciu nemáte. Musíte sa dať vyšetriť, aby bolo isté, že ešte nemáte HIV. Neužívajte Truvadu na zníženie vášho rizika, pokiaľ nie je potvrdené, že ste HIV negatívny/a.

Povedzte svojmu lekárovi o akomkoľvek ochorení podobnom chrípke, ktoré sa vyskytlo buď v mesiaci pred začatím užívania Truvady, alebo kedykoľvek počas užívania Truvady. Ak ste boli zapojený/á do sexuálnych praktík, ktoré vás mohli vystaviť riziku získania infekcie HIV, tieto prejavy môžu byť príznakmi infekcie HIV:

- ÚNAVA
- HORÚČKA
- BOLESTI KÍBOV
ALEBO SVALOV
- BOLESŤ HLAVY
- VYRÁŽKA
- VRACANIE ALEBO
HNAČKA
- NOČNÉ POTENIA
- ZVÄČŠENÉ LYMFATICKÉ
UZLINY NA KRUKU ALEBO
V SLABINÁCH.

Truvadu užívajte tak, ako vám ju predpísal váš lekár. Nevynechajte žiadne dávky Truvady, ani ju neprestaňte užívať. Vynechanie dávok a nepravidelné užívanie dávok bude zvyšovať vaše riziko získania infekcie HIV a prípadný vznik rezistencie na liek v prípade, že sa vírusom HIV nakazíte.

- Dávajte sa pravidelne vyšetrovať na HIV (napr. aspoň každé 3 mesiace).
- Ak si myslíte, že ste sa nakazili HIV, povedzte to ihneď svojmu lekárovi. Môže požadovať viac vyšetrení, aby si bol istý, že ste stále HIV negatívny.
- **Samotné užívanie Truvady nemusí zabrániť získaniu infekcie HIV.** Aby sa riziko získania HIV počas užívania Truvady znížilo, musíte nadáľ používať bezpečnejšie sexuálne praktiky.
 - » Používajte kondómy, aby ste znížili kontakt so spermou, pošovovými tekutinami alebo krvou a zabránili kontaktu s ďalšími pohlavné prenosnými infekciami.
 - » Nepoužívajte osobné veci iných ľudí, na ktorých môže byť krv alebo telesné tekutiny, ako sú zubné kefky a žiletky na holenie.
 - » Nedel'te sa ani opakovane nepoužívajte ihly či iné vybavenie na podávanie injekcií alebo drog.
- **Prijmite opatrenia, aby ste zostali počas užívania Truvady na PrEP HIV negatívny/a:**
 - » Dajte sa vyšetriť na iné sexuálne prenosné infekcie, ako je syfilis a kvapavka. Pri týchto infekciách sa ľahšie nakazíte HIV.
 - » Získajte informácie a podporu nájomocnú na obmedzenie sexuálneho správania sa, ktoré vás môže vystaviť zvýšenému riziku nákazy.
- **Pred začatím užívania Truvady zistite svoj stav infekcie vírusom hepatitídy B (HBV).** Ak máte infekciu HBV, existuje väzne riziko, že po ukončení užívania Truvady sa môžu zhoršiť pečeňové problémy.

Vedľajšie účinky

Tak ako všetky lieky, aj Truvada môže spôsobovať vedľajšie účinky, hoci sa neprejavia u každého.

Prečítajte si písomnú informáciu pre používateľa dostupnú v škatuli s vaším liekom, kde nájdete úplný zoznam možných vedľajších účinkov.

Truvada môže spôsobiť závažné vedľajšie účinky, vrátane novo vzniknutých alebo zhoršených problémov s obličkami a kostami. Pred a počas užívania vám lekár môže urobiť krvné vyšetrenia na meranie funkcie obličiek. Povedzte svojmu lekárovi, ak ste mali ochorenie obličiek, alebo ak vyšetrenia preukázali problémy s obličkami, alebo **ak si myslíte, že máte ktorýkoľvek zo závažných vedľajších účinkov uvedených v tejto písomnej informácii pre používateľa.**

Medzi veľmi časté vedľajšie účinky u ľudí, ktorí užívajú Truvadu, patria: hnačka, vracanie, nevoľnosť (nauzea), závraty, bolesť hlavy, vyrážka a pocit slabosti.

Povedzte svojmu lekárovi, ak máte akýkoľvek vedľajší úchinok, ktorý vás trápi, alebo neodznieva. Toto sa týka aj akýchkoľvek možných vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa.

Ako uchovávať Truvadu

- Tento liek uchovávajte mimo dohľadu a dosahu detí.
- Neužívajte Truvadu po dátume exspirácie, ktorý je uvedený na fľaši a škatuli po {EXP}. Dátum exspirácie sa vzťahuje na posledný deň v danom mesiaci.
- Uchovávajte v pôvodnom obale na ochranu pred vlhkosťou. Fľašu udržiavajte dôkladne uzatvorenú.