

## Titračná fáza:

Cieľom titrácie je dosiahnuť individualizovanú udržiavaciu dávku pre každého pacienta, čo zvyčajne nastane v priebehu 8 týždňov.

200 mikrogramové tablety

800 mikrogramové tablety

<b>Titračné balenie *</b> Začnite 200 mikrogramami 2x denne po 12 hodinách. Pre zlepšenie znášanlivosti sa odporúča užívať tablety s jedlom. Prvá dávka sa má užiť večer.	<b>Zníženie počtu tabliet †</b> Ak je potrebná dávka vyššia ako 800 mikrogramov, pacient môže dostať:		<b>Sledovanie pacienta</b> Zvyšujte dávku, dokým nenastanú vedľajšie účinky, ktoré nemožno tolerovať alebo medikamentózne zvládnuť ‡	<b>Maximálna dávka</b> 1600 mikrogramov je maximálna dávka, ktorú môže pacient dostať
	Dalšie titračné balenie Uptravi 200 mikrogramov	Balenie Uptravi 800 mikrogramov		
	<b>Vzostupná titrácia</b> Dávku zvyšujte po 200 mikrogramoch podávaných 2x denne, zvyčajne v týždňových intervaloch, ale intervaly môžu byť aj dlhšie. Pri každom kroku vzostupnej titrácie sa odporúča užiť prvú dávku večer.	<b>Krok späť</b> Ak pacient dosiahne dávku, ktorú nemôže tolerovať alebo ju nemožno medikamentózne zvládnuť, znížte dávku na najbližšiu nižšiu dávku.	<b>Udržiavacia fáza</b> Najvyššia tolerovaná dávka sa stane individualizovanou udržiavacou dávkou a môže byť nahradená jedinou tabletou 2x denne ekvivalentnej sily. Táto dávka nesmie nikdy presiahnuť 1600 mikrogramov 2x denne.	

\* Titračné balenie obsahuje 140 tabliet Uptravi 200 mikrogramov. Tento počet tabliet je dostačujúci pre vzostupnú titráciu do 800 mikrogramov.

† 2 balenia obsahujú dostatok tabliet pre vzostupnú titráciu do 1600 mikrogramov.

‡ Najčastejšie nežiaduce účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť u vášho pacienta pri liečbe Uptravi sú: bolesť hlavy, hnačka, nevoľnosť a vracanie, bolesť čeľuste, myalgia, bolesť končatín, artralgia a sčervenanie. Kompletný zoznam nežiaducich účinkov nájdete v súhrne charakteristických vlastností.

- Nežiaduce účinky, prosím, hláste prostredníctvom webového formulára na Štátny ústav pre kontrolu liečiv: <https://portal.sukl.sk/eskadra/> Alebo môžete nežiaduce účinky hlásiť držiteľovi rozhodnutia o registrácii na e-mail: [farmakovigilance@its.jnj.com](mailto:farmakovigilance@its.jnj.com) alebo tel.: +421 232 408 400.

Prosím, prečítajte si kompletnú informáciu o lieku.

## Ako začať titráciu pacienta

Liečba Uptravi má začať a byť monitorovaná výhradne lekárom, ktorý má skúsenosti s liečbou pľúcnej arteriálnej hypertenzie.

## Titračné balenie pre pacienta obsahuje:

- Uptravi 200 mikrogramov tabliet pre titráciu.
  - Sprievodca titráciou pre pacienta, ktorý obsahuje vysvetlenie procesu vzostupnej titrácie a diár pre zaznamenávanie počtu užitých tabliet denne
  - Pri začatí liečby si určite s pacientom prejdite sprievodcu titráciou, aby ste sa uistili, že úplne pochopil proces titrácie a je pripravený na možný výskyt nežiaducich účinkov.

Poznámka: Ak je potrebná dávka vyššia ako 800 mikrogramov, môže pacient dostať druhé titračné balenie Uptravi 200 mikrogramov a balenie s tabletami Uptravi 800 mikrogramov.

## Komunikácia s pacientom

- Kontaktujte svojho pacienta raz týždenne počas titračnej fázy, preberte s ním postup a uistite sa, že sú farmakologické účinky efektívne liečené.
- Nežiaduce účinky súvisiace s mechanizmom účinku Uptravi, ako je bolesť hlavy, hnačka, bolesť čeluste, nauzea, myalgia, vracanie, bolesť končatín, sčervenanie a artralgia, boli pozorované často, najmä počas vzostupnej titrácie na individualizovanú udržiavaciu dávku.
- Farmakologicky očakávané nežiaduce účinky sú zvyčajne prechodné a zvládnuteľné symptomatickou liečbou.
- V klinickej praxi pozorované gastrointestinálne príhody reagovali na protihnačkovú liečbu, antiemetiká, lieky proti nevoľnosti a / alebo na lieky proti funkčným poruchám gastrointestinálneho traktu. Nežiaduce účinky spojené s bolesťou boli často liečené analgetikami (ako je paracetamol).

## Udržiavacia dávka

- Keď je dosiahnutá udržiavacia dávka, môže byť pacientovi predpísaná ekvivalentná sila tabliet pre jeho individualizovanú udržiavaciu dávku (dostupné sú 200-1600 mikrogramové tablety).
- To umožní pacientovi užívať 1 tabletu ráno a 1 večer.
- Každý pacient je individuálny a nie každý dosiahne rovnakú udržiavaciu dávku. Dávka nesmie presiahnuť 1600 mikrogramov 2x denne.

Jednotlivé tablety pri udržiavacej dávke sa líšia farbou a na povrchu majú vyrazené čísla, ktoré označujú dávku (v stovkách mikrogramov).

**Uptravi®**  
Poťahované tablety  
selexipag