

Karta pacienta  
Viatris Limited



- Vixargio 2,5 mg     Vixargio 15 mg  
 Vixargio 10 mg     Vixargio 20 mg

- ◆ Túto kartu noste vždy so sebou
- ◆ Túto kartu ukážte pred liečbou každému lekárovi alebo zubnému lekárovi

**Užívam antikoagulačnú liečbu Vixargiom (rivaroxabán)**

Meno:

Adresa:

Dátum narodenia:

Hmotnosť:

Iné lieky/ochorenia:

**V naliehavom prípade, prosím, kontaktujte:**

Meno lekára:

Telefón lekára:

Pečiatka lekára:

**Informujte, prosím, aj:**

Meno:

Telefón:

Vzťah k pacientovi:

**Informácia pre zdravotníckych pracovníkov:**

- ◆ Hodnoty INR sa nemajú používať, keďže nie sú spoľahlivé na meranie antikoagulačnej aktivity Vixargia.

**Čo mám vedieť o Vixargiu?**

- ◆ Vixargio zrieduje krv, čím u vás zabraňuje vzniku nebezpečných krvných zrazenín.

*Poznámka:*

**Vixargio 2,5 mg** - do skončenia patentovej ochrany originálneho lieku nebude Vixargio v sile 2,5 mg dostupný.

- ◆ Vixargio sa musí užívať presne podľa predpisu lekára. Na zabezpečenie optimálnej ochrany pred vznikom krvných zrazenín, **nikdy nevynechajte dávku.**
- ◆ Nesmiete prestať užívať Vixargio bez toho, aby ste sa najprv neporozprávali s vaším lekárom, pretože riziko vzniku krvných zrazenín sa môže zvýšiť.
- ◆ Predtým ako začnete užívať Vixargio, povedzte svojmu lekárovi o všetkých ostatných liekoch, ktoré práve užívate, ktoré ste ešte nedávno užívali alebo ktoré sa chystáte užívať.
- ◆ Pred akýmkoľvek chirurgickým alebo invazívnym zákrokom povedzte svojmu lekárovi, že užívate Vixargio.

### **Kedy mám vyhľadať pomoc môjho lekára?**

Keď užívate lieky na riedenie krvi, ako je Vixargio, je dôležité, aby ste si boli vedomý možných vedľajších účinkov týchto liekov. Najčastejším vedľajším účinkom je krvácanie. Ak viete, že je u vás riziko krvácania, Vixargio nezačnite užívať bez toho, aby ste to najprv neprediskutovali so svojím lekárom. Okamžite informujte svojho lekára, ak máte akékoľvek prejavy alebo príznaky krvácania, ako sú nasledujúce:

- ◆ bolesť,
- ◆ opuch alebo zdravotné ťažkosti,
- ◆ bolesť hlavy, závrat alebo slabosť,
- ◆ nezvyčajná tvorba podliatin, krvácanie z nosa, krvácanie z ďasien, rezné rany, ktoré vyžadujú dlhší čas na zastavenie krvácania,
- ◆ menštruálne krvácanie alebo krvácanie z pošvy, ktoré je silnejšie ako zvyčajne,
- ◆ krv v moči, ktorý môže mať ružové alebo hnedé sfarbenie, červená alebo čierna stolica,
- ◆ vykašliavanie krvi, alebo vracanie krvi či hmoty, ktorá vyzerá ako kávová usadenina.

### **Ako mám užívať Vixargio?**

- ◆ Na zabezpečenie optimálnej ochrany, Vixargio
  - 2,5 mg sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla
  - 10 mg sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla
  - 15 mg sa musí užívať s jedlom
  - 20 mg sa musí užívať s jedlom

