

Pohotovostná karta pacienta
Viatris Limited



Vixargio 2,5 mg

Vixargio 10 mg

Vixargio 15 mg

Vixargio 20 mg

- ◆ Túto kartu noste vždy so sebou
- ◆ Túto kartu ukážte pred liečbou každému lekárovi alebo zubnému lekárovi

Užívam antikoagulačnú liečbu Vixargiom (rivaroxabán)

Meno:

Adresa:

Dátum narodenia:

Hmotnosť:

Iné lieky/ochorenia:

V naliehavom prípade, prosím, kontaktujte:

Meno lekára:

Telefón lekára:

Pečiatka lekára:

Informujte, prosím, aj:

Meno:

Telefón:

Vzťah k pacientovi:

Informácia pre zdravotníckych pracovníkov:

- ◆ Hodnoty INR sa nemajú používať, keďže nie sú spoľahlivé na meranie antikoagulačnej aktivity Vixargia.

Čo mám vedieť o Vixargiu?

- ◆ Vixargio zrieduje krv, čím u vás zabraňuje vzniku nebezpečných krvných zrazenín.

Poznámka:

Vixargio 2,5 mg - do skončenia patentovej ochrany originálneho lieku nebude Vixargio v sile 2,5 mg dostupný.

- ◆ Vixargio sa musí užívať presne podľa predpisu lekára. Na zabezpečenie optimálnej ochrany pred vznikom krvných zrazenín, **nikdy nevynechajte dávku.**
- ◆ Nesmiete prestať užívať Vixargio bez toho, aby ste sa najprv neporozprávali s vaším lekárom, pretože riziko vzniku krvných zrazenín sa môže zvýšiť.
- ◆ Predtým ako začnete užívať Vixargio, povedzte svojmu lekárovi o všetkých ostatných liekoch, ktoré práve užívate, ktoré ste ešte nedávno užívali alebo ktoré sa chystáte užívať.
- ◆ Pred akýmkoľvek chirurgickým alebo invazívnym zákrokom povedzte svojmu lekárovi, že užívate Vixargio.

Kedy mám vyhľadať pomoc môjho lekára?

Keď užívate lieky na riedenie krvi, ako je Vixargio, je dôležité, aby ste si boli vedomý možných vedľajších účinkov týchto liekov. Najčastejším vedľajším účinkom je krvácanie. Ak viete, že je u vás riziko krvácania, Vixargio nezačnite užívať bez toho, aby ste to najprv neprediskutovali so svojím lekárom. Okamžite informujte svojho lekára, ak máte akékoľvek prejavy alebo príznaky krvácania, ako sú nasledujúce:

- ◆ bolesť,
- ◆ opuch alebo zdravotné ťažkosti,
- ◆ bolesť hlavy, závrat alebo slabosť,
- ◆ nezvyčajná tvorba podliatin, krvácanie z nosa, krvácanie z ďasien, rezné rany, ktoré vyžadujú dlhší čas na zastavenie krvácania,
- ◆ menštruačné krvácanie alebo krvácanie z pošvy, ktoré je silnejšie ako zvyčajne,
- ◆ krv v moči, ktorý môže mať ružové alebo hnedé sfarbenie, červená alebo čierna stolica,
- ◆ vykašliavanie krvi, alebo vracanie krvi či hmoty, ktorá vyzerá ako kávová usadenina.

Ako mám užívať Vixargio?

- ◆ Na zabezpečenie optimálnej ochrany, Vixargio
 - 2,5 mg sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla
 - 10 mg sa môže užívať s jedlom alebo bez jedla
 - 15 mg sa musí užívať s jedlom
 - 20 mg sa musí užívať s jedlom

