

Pohotovostná karta pacienta

Xanirva 15 mg

Xanirva 20 mg

Túto kartu noste vždy so sebou !

**Túto kartu ukážte pred liečbou každému
lekárovi alebo zubnému lekárovi !**

Užívam antikoagulačnú liečbu Xanirvou (rivaroxabán)

Meno:

Adresa:

Dátum narodenia:

Hmotnosť:

Iné lieky / ochorenia:

V naliehavom prípade, prosím, kontaktujte:

Meno lekára:

Telefón lekára:

Pečiatka lekára:

Informujte, prosím, aj:

Meno:

Telefón:

Vzťah k pacientovi:

Informácia pre zdravotníckych pracovníkov:

Hodnoty INR sa nemajú používať, keďže nie sú spoľahlivé na meranie antikoagulačnej aktivity Xanirvy.

Čo mám vedieť o Xanirve?

- Xanirva zriedňuje krv, čím u vás zabraňuje vzniku nebezpečných krvných zrazenín.
- Xanirva sa musí užívať presne podľa predpisu lekára. Na zabezpečenie optimálnej ochrany pred vznikom krvných zrazenín, **nikdy nevynechajte dávku.**
- Xanirvu nesmiete prestať užívať bez toho, aby ste sa najprv neporozprávali s vaším lekárom, pretože riziko vzniku krvných zrazenín sa môže zvýšiť.
- Predtým ako začnete užívať Xanirvu, povedzte svojmu lekárovi o všetkých ostatných liekoch, ktoré práve užívate, ktoré ste ešte nedávno užívali alebo ktoré sa chystáte užívať.
- Pred akýmkoľvek chirurgickým alebo invazívnym zákrokom povedzte svojmu lekárovi, že užívate Xanirvu.

Kedy mám vyhľadať pomoc môjho lekára?

Keď užívate lieky na riedenie krvi, ako je Xanirva, je dôležité, aby ste si boli vedomý možných vedľajších účinkov týchto liekov. Najčastejším vedľajším účinkom je krvácanie.

Ak viete, že je u vás riziko krvácania, Xanirvu nezačnite užívať bez toho, aby ste to najprv neprediskutovali so svojím lekárom. Okamžite informujte svojho lekára, ak máte akékoľvek prejavy alebo príznaky krvácania, ako sú nasledujúce:

- bolesť,
- opuch alebo zdravotné ťažkosti,
- bolesť hlavy, závrat alebo slabosť,
- nezvyčajná tvorba podliatin, krvácanie z nosa, krvácanie z ďasien, rezné rany, ktoré vyžadujú dlhší čas na zastavenie krvácania,
- menštruačné krvácanie alebo krvácanie z pošvy, ktoré je silnejšie než zvyčajne,
- krv v moči, ktorý môže mať ružové alebo hnedé sfarbenie, červená alebo čierna stolica,
- vykašliavanie krvi, alebo vracanie krvi či hmoty, ktorá vyzerá ako kávová usadenina.

Ako mám Xanirvu užívať?

Na zabezpečenie optimálnej ochrany Xanirva:

- 15 mg sa musí užívať s jedlom
- 20 mg sa musí užívať s jedlom

Hlásenie podozrení na vedľajšie účinky

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v tejto písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie
Kvetná ul. 11, 825 08 Bratislava 26
Tel: + 421 2 507 01 206
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o nežiaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>.

Informáciu o nežiaducich účinkoch liekov je možné nahlásiť aj držiteľovi rozhodnutia o registrácii:
Zentiva, Einsteinova 24, 851 01 Bratislava
e-mail: PV-Slovakia@zentiva.com
tel.: +421 239 183 010