

YERVOY® (ipilimumab)

Táto karta obsahuje dôležité informácie.

Vždy noste túto kartu so sebou a ukážte ju každému lekárovi, ktorého potrebujete navštíviť (napríklad, ak váš obvyklý lekár nie je dostupný alebo ak cestujete).

Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak máte ktorýkoľvek z týchto príznakov alebo akékoľvek iné príznaky.

- Okamžite nahláste ktorýkoľvek z týchto príznakov svojmu lekárovi.
- Príznaky, ktoré sa môžu prejaviť ako mierne sa môžu rýchlo zhoršiť, ak sa neliečia.¹
- Skorá liečba vedľajších účinkov znižuje pravdepodobnosť, že liečbu ipilimumabom bude potrebné dočasne alebo natrvalo ukončiť, čo vám umožní získať maximálny prínos z liečby.
- Prejavujú sa príznaky môžu byť oneskorené a môžu sa vyskytnúť týždne až mesiace po podaní vašej poslednej injekcie.¹
- Nepokúšajte sa sami liečiť tieto príznaky bez toho, aby ste sa najskôr neporozprávali so svojím lekárom.
- Túto kartu noste so sebou a ukážte ju KAŽDÉMU lekárovi s ktorým prídete do kontaktu a povedzte mu, že sa liečite ipilimumabom.

Dátum schválenia: 12/2019

Kód: 7315K19NP02263-01

¹ Písomná informácia pre používateľa lieku YERVOY®

ČREVÁ A ŽALÚDOK ¹	OČI ¹
<ul style="list-style-type: none">• hnačka (vodová, riedka alebo mäkká stolica), krvavá alebo tmavo sfarbená stolica• pohyblivosť čriev zvýšená nad zvyčajnú mieru• bolesť alebo citlivosť žalúdka alebo v oblasti brucha, nevoľnosť, vracanie	<ul style="list-style-type: none">• sčervenenie v oku• bolesť v oku• problémy so zrakom alebo rozmazané videnie
PEČEŇ ¹	NERVY ¹
<ul style="list-style-type: none">• zožltnutie očí alebo kože (žltáčka)• bolesť v oblasti brucha na pravej strane• tmavý moč	<ul style="list-style-type: none">• svalová slabosť• necitlivosť alebo mravčenie v nohách, rukách alebo na tvári• závrat, strata vedomia alebo ťažkosti s prebúdzaním sa
KOŽA ¹	CELKOVÉ ¹
<ul style="list-style-type: none">• kožná vyrážka so svrbením alebo bez svrbenia, suchá koža• pluzgierie a/alebo odlupovanie kože, vredy v ústach• opuch tváre alebo lymfatických uzlín	<ul style="list-style-type: none">• horúčka, bolesť hlavy, únava• krvácanie• zmeny v správaní (napr. znížená pohlavná túžba, podráždenosť alebo zábudlivosť)

Viac informácií môžete získať z Písomnej informácie pre používateľa lieku YERVOY®: www.ema.europa.eu

YERVOY® (ipilimumab)

Bezpečnostná karta pacienta.

Kontaktné údaje môjho lekára

Meno lekára

Číslo do ambulancie

Číslo po pracovnom čase

Moje meno a telefónne číslo

Meno a číslo opatrovateľa

(v prípade záchrany)



Bristol-Myers Squibb

DÔLEŽITÉ informácie pre zdravotníckych pracovníkov

- Tento pacient sa lieči YERVOYOM®.
- Imunitne podmienené nežiaduce reakcie (ipNR) sa môžu väčšinou vyskytnúť počas obdobia liečby, no môžu sa vyskytnúť aj mesiace po poslednej dávke YERVOYA®.
- Na minimalizovanie život ohrozujúcich komplikácií je nevyhnutná ich včasná diagnóza a vhodná liečba. K dispozícii sú pokyny špecifické pri výskyte ipNR pri liečbe YERVOYOM®.
- Ak ste lekár, ktorý nemá špecializáciu z onkológie, kontaktujte špecialistu.

Pre zdravotníckych pracovníkov: Viac informácií si prečítajte v súhrne charakteristických vlastností lieku YERVOY na www.ema.europa.eu alebo kontaktujte oddelenie medicínskych informácií na telefónnom čísle +421 908 708 838, email: medinfo.slovakia@amicuspharma.eu.