

Erelzi (etanercept) - Bezpečnostná karta pacienta

Táto Bezpečnostná karta pacienta obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, o ktorých musíte vedieť predtým, ako vám bude podaný liek Erelzi a počas liečby liekom Erelzi. Prosím, opýtajte sa svojho lekára, ak týmto informáciám nerozumiete.

- Ukážte túto kartu každému lekárovi, ktorý sa zúčastňuje vašej liečby.
- Ďalšie informácie si prečítajte v Písomnej informácii pre používateľa.

Použitie u detí a dospelých (s hmotnosťou nižšou ako 62,5 kg)

Erelzi sa nemá používať u detí a dospelých s hmotnosťou nižšou ako 62,5 kg. Prosím, opýtajte sa svojho lekára, ak máte akékoľvek otázky.

Infekcie

Erelzi môže zvyšovať riziko vzniku infekcií, ktoré môžu byť závažné.

- Nesmiete byť liečený liekom Erelzi, ak máte infekciu. Ak si nie ste istý, opýtajte sa svojho lekára.
- Ak sa u vás vyvinú príznaky infekcie ako horúčka, pretrvávajúci kašeľ, úbytok hmotnosti alebo apatia, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Mali by ste byť vyšetrený na tuberkulózu. Požiadajte svojho lekára, aby zaznamenal dátum a výsledky vášho posledného vyšetrenia na tuberkulózu nižšie:

Vyšetrenie: _____

Dátum: _____

Výsledky: _____

Vyšetrenie: _____

Dátum: _____

Výsledky: _____

Ak sa u vás vyskytnú akékoľvek vedľajšie účinky, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo na Štátny ústav pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná ul. 11, SK-825 08 Bratislava 26, Tel: + 421 2 507 01 206, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Tlačivo na hlásenie neziaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie o neziaducich účinkoch. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

- Požiadajte svojho lekára, aby uviedol všetky lieky, ktoré môžu zvýšiť riziko infekcie.

Kongestívne zlyhanie srdca

Ak sa u vás rozvinú príznaky **kongestívneho zlyhania srdca alebo zhoršenia prítomného kongestívneho zlyhanie srdca** ako sú skrátenie dychu, opuch členkov, pretrvávajúci kašeľ alebo únava, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

Ďalšie informácie (prosím, vyplňte)

Meno pacienta: _____

Meno lekára: _____

Telefónne číslo lekára: _____

Túto kartu noste so sebou počas vašej liečby liekom Erelzi a 2 mesiace po poslednej dávke lieku Erelzi, pretože vedľajšie účinky sa môžu prejaviť aj po poslednej dávke lieku Erelzi.

Je dôležité, aby ste vy a váš lekár zapísali názov lieku a číslo šarže vášho lieku.