

APIXABAN GEDEON RICHTER

2,5 mg (apixabán)

Karta pacienta

Túto kartu máte vy, dieťa alebo jeho opatrovateľ nosiť vždy so sebou.

Ukážte túto kartu svojmu lekárnikovi, zubárovi alebo ktorémukoľvek zdravotníckemu pracovníkovi pred liečbou.

Užívam antikoagulančnú liečbu, liek Apixaban Gedeon Richter 2,5 mg (apixabán), na zabránenie tvorby krvných zrazenín.

Vyplňte nasledujúce časti, alebo o to požiadajte lekára.

Meno:

Dátum narodenia:

Indikácia:

Telesná hmotnosť:

Dávka:mg dvakrát denne

Meno lekára:

Telefónne číslo lekára:

Informácie pre pacientov/opatrovateľov

– Apixaban Gedeon Richter užívajte/podávajte pravidelne podľa pokynov. Ak vynecháte rannú dávku, užite/podajte ju ihneď ako si spomeniete a môžete ju užiť/podať aj spolu s večernou dávkou. Vynechanú večernú dávku môžete užiť/podať len v ten istý večer. Nasledujúce ráno neužívajte/nepodávajte dve dávky, ale pokračujte podľa dávkovacej schémy dvakrát denne v súlade s odporúčaním.

- Neprestaňte užívať/podávať Apixaban Gedeon Richter, ak sa najprv neporadíte s lekárom, pretože ste vystavený/pacient je vystavený riziku cievnej mozgovej príhody/krvnej zrazeniny a iných komplikácií.
- Apixaban Gedeon Richter pomáha riediť krv. To však môže zvýšiť riziko krvácania.
- Prejavy a príznaky krvácania zahŕňajú tvorbu modrín a krvácanie pod kožou, dechtové sfarbenie stolice, krv v moči, krvácanie z nosa, závrat, únavu, bledosť alebo

slabosť, náhlu závažnú bolesť hlavy, vykašliavanie krvi alebo vracanie krvi.

– Ak sa krvácanie samo nezastaví, **okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.**

– Ak potrebujete/pacient potrebuje operáciu alebo akýkoľvek invazívny zákrok, informujte zdravotníckeho pracovníka, že užívate/pacient užíva Apixaban Gedeon Richter.

12/2025

Informácie pre zdravotníckych pracovníkov

- Apixaban Gedeon Richter (apixabán) je perorálne antikoagulancium, ktoré pôsobí priamou selektívnou inhibíciou faktora Xa.
- Apixaban Gedeon Richter môže zvyšovať riziko krvácania. V prípade závažných krvácaných príhod sa má liečba okamžite zastaviť.
- Liečba Apixaban Gedeon Richterom si nevyžaduje rutinné sledovanie expozície. Kalibrované kvantitatívne stanovenie anti-faktora Xa môže byť prospešné vo

výnimočných situáciách, napr. pri predávkovaní alebo urgentnom chirurgickom zákroku (protrombínový čas (PT), medzinárodný normalizovaný pomer (INR) a aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (aPTT) sa neodporúčajú sledovať) - pozri SPC.

– Pre dospelých je k dispozícii účinná látka na zvrátenie účinku apixabánu pôsobiaceho proti faktoru Xa, jej bezpečnosť a účinnosť však neboli stanovené u pediatrických pacientov (pozri Súhrn charakteristických vlastností lieku pre andexanet alfa).