

Príručka pre pacientov a opatrovateľov

# Informácie o lieku **ASPAVELI<sup>®</sup>** (pegcetakoplan)

Písomnú informáciu pre používateľa nájdete vo vrecku  
na zadnej strane vnútorného obalu.

 **ASPAVELI<sup>®</sup>**  
(pegcetakoplan)



# Obsah

|                                                                                                          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>Úvod</b>                                                                                              | <b>4</b> |
| Čo je ASPAVELI?                                                                                          | 4        |
| <b>Bezpečnostné hľadiská</b>                                                                             | <b>5</b> |
| Riziko závažnej infekcie                                                                                 | 5        |
| Očkovania alebo liečba antibiotikami                                                                     | 5        |
| Riziko alergických reakcií                                                                               | 6        |
| Riziko intravaskulárnej hemolýzy po ukončení podávania lieku (len pacienti s PNH)                        | 6        |
| <b>Odporúčania pre antikoncepciu</b>                                                                     | <b>6</b> |
| <b>Príprava pre samopodávanie infúzie</b>                                                                | <b>7</b> |
| Popis pomôcok používaných na samopodávanie infúzie                                                       | 7        |
| Pokyny o tom, ako si pozrieť video o samopodávaní infúzie na akomkoľvek zariadení pripojenom k internetu | 8        |
| <b>Hlásenie podozrení na vedľajšie účinky</b>                                                            | <b>8</b> |
| <b>Dôvernoscť informácií a ochrana údajov</b>                                                            | <b>9</b> |
| <b>Ďalšie informácie</b>                                                                                 | <b>9</b> |
| Zapíšte si akékoľvek otázky, na ktoré sa chcete vášho lekára opýtať pri ďalšej návšteve                  | 10       |

# Úvod

Túto Príručku ste dostali, pretože vám alebo osobe, ktorú opatrujete, bol predpísaný liek ASPAVELI. Podať injekciu sebe alebo niekomu, koho opatrujete, sa môže zdať na začiatku zložité. Existujú tipy a triky, ktoré vám môžu zaradenie podávania lieku do vášho každodenného programu uľahčiť. Pri čítaní tejto Príručky majte na pamäti, že každý pacient je iný. Poradte sa so svojím lekárom o tom, ako sa tieto informácie týkajú práve vás.

Váš lekár vyplní a odovzdá vám Kartú pacienta. Používajte ju ako rýchlo dostupný zdroj informácií o vašej liečbe, telefónnom čísle lekára a dôležitých bezpečnostných informáciách.

Váš lekár alebo zdravotná sestra vám odpovedia na akékoľvek otázky týkajúce sa vašej diagnózy a liečby.

## Čo je ASPAVELI?

ASPAVELI je liek, ktorý sa používa na liečbu dospelých pacientov s ochorením nazývaným paroxyzmálna nočná hemoglobínúria (PNH) a na liečbu dospelých a dospievajúcich vo veku 12 – 17 rokov s ochoreniami nazývanými glomerulopatia C3 komplementu (C3G) a primárna imunokomplexová membranoproliferatívna glomerulonefritída (*primary Immune-complex membranoproliferative glomerulonephritis*, primárna IC-MPGN). Liečba sa podáva infúziou pod kožu. ASPAVELI obsahuje liečivo pegcetakoplan. Pegcetakoplan sa viaže na proteín komplementu C3, ktorý je súčasťou obranného systému tela proti infekciám nazývaného „komplementový systém“. U pacientov s PNH zabraňuje pegcetakoplan imunitnému systému tela ničiť červené krvinky. U pacientov s C3G a primárnou IC-MPGN pegcetakoplan zabraňuje ukladaniu fragmentov C3 v obličkách a ich poškodeniu.

Karta pacienta:

Od vášho lekára dostanete Kartú pacienta.

- Táto Karta bude obsahovať vaše jedinečné referenčné číslo kontrolovanej distribúcie (*controlled distribution, CD*).
- Vždy noste túto Kartú pri sebe počas liečby a 8 týždňov po vašej poslednej dávke.
- Túto Kartú ukážte každému zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý sa podieľa na vašej starostlivosti. Pomôže mu to správne vás diagnostikovať a liečiť.
- Túto Kartú ukážte v lekární pri vyberaní vášho lieku.
- Pri akýchkoľvek príznakoch závažnej bakteriálnej infekcie okamžite vyhľadajte lekársku pomoc, aj keď pri sebe nemáte Kartú pacienta.

# Bezpečnostné hľadiská

## Riziko závažnej infekcie

Tento liek zvyšuje riziko infekcie, vrátane infekcie spôsobenej takzvanými zapuzdrenými baktériami, ako je *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis* a *Haemophilus influenzae*. Sú to závažné bakteriálne infekcie postihujúce váš nos, hrdlo a pľúca alebo mozgové obaly, ktoré sa môžu šíriť do krvi a tela. Ak sa závažné bakteriálne infekcie včas nerozpoznajú a neliečia, môžu sa rýchlo stať život ohrozujúcimi alebo smrteľnými.

Ak sa u vás vyskytnú niektoré z nasledujúcich prejavov a príznakov závažnej infekcie, okamžite zavolajte svojmu lekárovi alebo vyhľadajte pohotovostnú lekársku službu:

- |                                                     |                                                           |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| • Bolesť hlavy a horúčka                            | • Bolesť hlavy so stuhnutým krkom alebo stuhnutým chrbtom |
| • Horúčka a vyrážka                                 | • Bolesť hlavy s nevoľnosťou alebo vracaním               |
| • Horúčka s triaškou alebo zimnicou, alebo bez nich | • Citlivosť očí na svetlo                                 |
| • Dýchavičnosť                                      | • Bolesť svalov s príznakmi podobnými chrípke             |
| • Vysoký tep srdca                                  | • Zmätenosť                                               |
| • Vlhká pokožka                                     | • Silná bolesť alebo celkový nepríjemný pocit             |

## Očkovania alebo liečba antibiotikami

- Očkovacie látky proti baktériám znižujú riziko výskytu závažných infekcií. Očkovacie látky však nezabraňujú všetkým závažným infekciám.
- Váš lekár zabezpečí, aby ste boli očkovaný voči *Streptococcus pneumoniae*, *Neisseria meningitidis* a *Haemophilus influenzae* podľa platných národných usmernení, ak ste tieto očkovania nepodstúpili v minulosti.
- Je možné, že budete potrebovať dodatočné očkovanie pred začatím liečby liekom Aspaveli aj v prípade, že ste už v minulosti boli očkovaný.
- Očkovacie látky vám majú byť podané aspoň 2 týždne pred začatím liečby liekom ASPAVELI.
- Ak nemôžete byť očkovaný 2 týždne pred začatím liečby liekom ASPAVELI, váš lekár vám predpíše antibiotiká (lieky na liečbu bakteriálnych infekcií) na zníženie rizika infekcie, ktoré je potrebné užívať ešte ďalšie 2 týždne po očkovaní.
- Váš lekár dostane ročné pripomenutia v prípade, že potrebujete preočkovanie.
- Po očkovaní vám lekár prideli referenčné číslo kontrolovanej distribúcie (CD) a zapíše ho do vašej Karty pacienta. Toto číslo budete musieť ukázať lekárnikovi vždy predtým, ako vám vydá ASPAVELI.

## Riziko alergických reakcií

U niektorých pacientov sa môžu vyskytnúť alergické reakcie.

Ak sa u vás vyskytnú niektoré z nasledujúcich prejavov a príznakov alergickej reakcie, prerušte infúziu lieku ASPAVELI a okamžite vyhľadajte lekársku pomoc:

- Ťažkosti s dýchaním
- Bolesť alebo zvieravý pocit na hrudníku
- Pocit závratu alebo mdloby
- Silné svrbenie kože alebo vypuklé hrčky na koži
- Opuch tváre, pier, jazyka a/alebo hrdla, ktoré môžu spôsobiť ťažkosti s prehĺtaním alebo kolaps

## Riziko intravaskulárnej hemolýzy po ukončení liečby (len pacienti s PNH)

- Ak plánujete ukončiť liečbu liekom ASPAVELI, poraďte sa o tom najprv so svojím lekárom.
- Je veľmi dôležité zabezpečiť, aby ste vy/pacient, ktorého opatrujete, nevynechali ani neodložili žiadnu plánovanú liečbu.
- Ak sa liečba liekom ASPAVELI úplne ukončí, alebo sa odloží (alebo ak sa liečba vynechá), existuje riziko výskytu jednej zo závažných príznakov PNH, hemolýzy. Hemolýza je stav, keď sa rozpadávajú červené krvinky, ktoré prenášajú kyslík vo vašom tele. Hemolýza je spojená s niektorými príznakmi PNH, ako napríklad:
  - Únava
  - Tmavé sfarbenie moču (hemoglobinúria)
  - Bolesť brucha
  - Dýchavičnosť
  - Tvorba krvných zrazenín (trombóza)
  - Ťažkosti s prehĺtaním
  - Poruchy erekcie
- Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek prejav alebo príznak hemolýzy, okamžite to oznámte svojmu lekárovi.

## Odporúčania pre antikoncepciu

Účinky lieku ASPAVELI na nenarodené dieťa nie sú známe. Počas liečby a až 8 týždňov po liečbe sa ženám, ktoré môžu otehotnieť, odporúča používanie účinnej antikoncepcie. Poradte sa so svojím lekárom predtým, ako začnete užívať tento liek.

# Príprava pre samopodávanie infúzie

ASPAVELI sa podáva ako subkutánna (podkožná) infúzia použitím infúznej pumpy alebo systému podávania lieku na tele. Na začiatku liečby vám bude infúziu podávať váš lekár. Po náležitom zaškolení v podávaní subkutánnej infúzie a dohode s vaším lekárom si môžete podávať liek sami.

ASPAVELI sa dodáva v sklenenej injekčnej liekovke, ktorá sa musí uchovávať v chladničke v pôvodnom obale, aby bola tekutina chránená pred svetlom.

Postup, ako si máte sami podať liek, nájdete:

- v Písomnej informácii pre používateľa lieku ASPAVELI,
- v návode na použitie výrobcu infúznej pumpy,
- v návode na použitie od výrobcu systému podávania lieku na tele,
- v odkazoch na videá uvedených nižšie.

## Popis pomôcok používaných na samopodávanie infúzie

### Na infúziu budete potrebovať:

#### 1. Pri používaní infúznej pumpy:


- A.** Infúzna pumpa so striekačkovým systémom a návod na používanie výrobcu (nie sú zobrazené)
- B.** Vhodná injekčná striekačka
- C1.** Prenosná ihla ALEBO
- C2.** Prenosná pomôcka bez ihly na natiehnutie lieku z injekčnej liekovky
- D.** Infúzna súprava (nie je zobrazená, líši sa v závislosti od návodu na použitie výrobcu pomôcky)
- E.** Infúzne hadičky a Y spojka (ak je potrebná)
- F.** Nádoba na likvidáciu ostrých predmetov
- G.** Alkoholové obrúsky
- H.** Gáza a náplast alebo priesvitné krytie



Len na ilustračné účely. Pomôcky, ktoré dostanete, môžu vyzeráť odlišne.

#### 2. Pri používaní systému podávania lieku na tele:

- A.** Systém podávania lieku na tele a návod na použitie výrobcu (nie sú zobrazené)
- B.** Vhodná injekčná striekačka
- C1.** Prenosná ihla ALEBO
- C2.** Prenosná pomôcka bez ihly na natiehnutie lieku z injekčnej liekovky
- F.** Nádoba na likvidáciu ostrých predmetov
- G.** Alkoholové obrúsky



Len na ilustračné účely. Pomôcky, ktoré dostanete, môžu vyzeráť odlišne.

## Pokyny o tom, ako si pozrieť video o samopodávaní infúzie na akomkoľvek zariadení pripojenom k internetu



Ak si chcete pozrieť inštruktážne video, do vášho internetového prehliadača zadajte nižšie uvedenú internetovú adresu alebo kliknite na odkaz. Na prístup k videu môžete tiež použiť QR kód zobrazený nižšie.

Infúzna pumpa:

<https://aspaveli-instructions.com/sk>



Systém podávania lieku na tele:

<https://aspaveli-instructions.com/sk>

## Hlásenie podozrení na vedľajšie účinky

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, predovšetkým závažné infekcie spôsobené zapuzdrenými baktériami, závažné reakcie precitlivenosti alebo hemolýza po ukončení používania lieku), obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa. Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami priamo na:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv  
Sekcia vigilancie  
Kvetná 11, 825 08 Bratislava  
tel.: + 421 2 507 01 206  
e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk.

Tlačivo na hlásenie podozrenia na nežiaduci účinok lieku je na webovej stránke [www.sukl.sk](http://www.sukl.sk) v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>.

Hlásením podozrení na vedľajšie účinky môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj spoločnosti Swedish Orphan Biovitrum:  
E-mail: [mail.sk@sobi.com](mailto:mail.sk@sobi.com), Tel.: +421 2 3211 1540.

# Dôvernosc informácií a ochrana údajov

So všetkými informáciami, ktoré poskytnete, sa bude zaobchádzať podľa zásad ochrany osobných údajov spoločnosti Sobi a v súlade s účelmi, na ktoré boli poskytnuté. Pre úplné informácie o spôsobe ochrany osobných údajov spoločnosťou Sobi si prečítajte naše zásady dostupné na: <https://www.sobi.com/en/policies>. Ak nesúhlasíte s používaním vašich údajov, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na našej internetovej stránke.

## Ďalšie informácie

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa vášho zdravia alebo lieku ASPAVELI, obráťte sa na svojho lekára.

Moje referenčné číslo kontrolovanej distribúcie (CD):

Do okienka, prosím, napíšte vám priradené referenčné číslo kontrolnej distribúcie



