

**Vaše meno:**

---

---

**Meno lekára**  
(ktorý predpísal liek Jyseleca):

---

---

**Telefónne číslo lekára:**

---

---

**Dátum začiatku**  
**liečby liekom Jyseleca:**

---

**Túto kartu majte počas užívania lieku Jyseleca vždy pri sebe a ukážte ju každému zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vám poskytuje zdravotnú starostlivosť alebo liečbu, napríklad lekárníkovi alebo lekárovi pohotovostnej služby.**

### **Hlásenie podozrení na vedľajšie účinky**

Informácie o tom, ako hlásiť podozrenia na vedľajšie účinky, nájdete na konci časti 4 Písomnej informácie pre používateľa.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj spoločnosti Swedish Orphan Biovitrum o.z., Mudroňova 51, 81103 Bratislava alebo na e-mailovú adresu: mail.sk@sobi.com, tel. č.: +421 2 3211 1540.

NP-43170 • Dátum schválenia ŠÚKL: 09/2025



Navštívte našu  
webovú stránku

[www.jyseleca.eu](http://www.jyseleca.eu)

# Karta pacienta

Túto kartu majte vždy pri sebe.

Informácie o bezpečnosti lieku Jyseleca® (filgotinib) pre pacientov.



Táto karta obsahuje dôležité informácie pre pacientov o bezpečnosti lieku Jyseleca. Pre ďalšie informácie si prečítajte Písomnú informáciu pre používateľa.



## Infekcie

- Jyseleca môže zhoršiť existujúcu infekciu alebo zvýšiť riziko nákazy novou infekciou. Ihneď povedzte svojmu lekárovi, ak ochoriete alebo, ak si všimnete príznaky infekcie, ako napríklad:
  - horúčka alebo zimnica, dýchavičnosť, kašeľ, pocit väčšej únavy ako obvykle – môžu to byť príznaky zápalu pľúc,
  - horúčka, potenie, úbytok hmotnosti alebo pretrvávajúci kašeľ – môžu to byť príznaky tuberkulózy (TBC),
  - bolestivá kožná vyrážka s pluzgiermi – môžu to byť príznaky pásového oparu (herpes zoster).
- Pred začiatkom liečby liekom Jyseleca sa opýtajte svojho lekára, či sa máte dať vyšetriť na TBC vrátane neaktívnej infekcie
- Povedzte svojmu lekárovi, ak ste boli nedávno v úzkom kontakte s osobou s TBC

## Nádorové a nádorové ochorenia kože

Jyseleca môže zvýšiť riziko vzniku nádorových ochorení. Povedzte svojmu lekárovi, ak zbadáte akýkoľvek nový útvar na koži.

## Krvné zrazeniny v žilách dolných končatín alebo v pľúcach

- Ak sa u vás objavia príznaky krvných zrazenín v žilách dolných končatín alebo pľúcach, ako bolesť dolnej končatiny s opuchom, bolesť v hrudníku alebo dýchavičnosť, okamžite to povedzte svojmu lekárovi.

## Cholesterol

Vysoký cholesterol je významný rizikový faktor ochorenia srdca. Počas užívania lieku Jyseleca vám váš lekár skontroluje hladinu cholesterolu. To mu pomôže rozhodnúť sa, či potrebujete liečbu na zníženie hladiny cholesterolu.

## Očkovania

- Počas užívania lieku Jyseleca vám nemajú byť podané určité (živé) vakcíny (napríklad Zostavax™ používaná na prevenciu pásového oparu).
- Predtým, ako začnete užívať liek Jyseleca, porozprávajte sa so svojím lekárom alebo lekárnikom o očkovaníach. Budú sa chcieť uistiť, že máte všetky očkovania aktuálne.

## Tehotenstvo, antikoncepcia a dojčenie

Jyseleca sa nesmie užívať počas tehotenstva:

- Počas užívania lieku Jyseleca a aspoň 1 týždeň po užití poslednej dávky lieku používajte spoľahlivú antikoncepciu.
  - Ak počas užívania lieku Jyseleca otehotniete, alebo si myslíte, že ste tehotná, okamžite prestaňte užívať liek Jyseleca a ihneď to povedzte svojmu lekárovi.
  - Ak plánujete otehotnieť, najskôr sa porozprávajte so svojím lekárom.
- Počas užívania lieku Jyseleca nedojčite.

## Ochorenia srdca

Jyseleca môže zvýšiť riziko vzniku niektorých ochorení srdca. Povedzte svojmu lekárovi, ak pocítite neprijemný pocit na hrudníku (ktorý sa môže šíriť do rúk, dolnej čeluste, krku a chrbta), dýchavičnosť alebo závraty.