

Karta pacienta

CZ

Tato karta obsahuje důležité bezpečnostní informace, které potřebujete znát, pokud se léčíte přípravkem Macitentan Teva. Noste tuto kartu stále u sebe a ukažte ji každému lékaři, který Vám bude poskytovat lékařskou péči.

Macitentan Teva 10 mg potahované tablety

macitentan

Je důležité, abyste svému předepisujícímu lékaři okamžitě hlásil(a) každé otěhotnění nebo nežádoucí účinek, které se mohou objevit během léčby přípravkem Macitentan Teva.

Léčebné centrum: _____

Jméno předepisujícího lékaře: _____

Telefonní číslo předepisujícího lékaře: _____

Těhotenství

Přípravek Macitentan Teva může narušit vývoj plodu. Proto nesmíte přípravek Macitentan Teva užívat, pokud jste těhotná, a rovněž nesmíte během užívání přípravku Macitentan Teva otěhotnět. Navíc, pokud trpíte plicní arteriální hypertenzí, může těhotenství vážně zhoršit příznaky nemoci.

Antikoncepce

Během užívání přípravku Macitentan Teva musíte používat spolehlivou formu antikoncepce. Každou případnou otázku neváhejte probrat se svým lékařem.

Před zahájením léčby přípravkem Macitentan Teva a každý měsíc léčby si musíte udělat těhotenský test, i když si myslíte, že nejste těhotná.

Podobně jako ostatní léky z této třídy může mít i přípravek Macitentan Teva vliv na játra. Lékař Vám provede krevní testy před zahájením léčby přípravkem Macitentan Teva a potom během léčby, aby ověřil, jestli Vaše játra pracují správně.

Známky toho, že játra nemusí pracovat správně, zahrnují:

- nevolnost (pocit na zvracení)
- zvracení
- horečku (vysokou teplotu)
- bolest břicha
- žloutenku (zežloutnutí kůže nebo očního bělma)
- tmavou moč
- svědění kůže
- letargii nebo únavu (neobvyklou únavu nebo vyčerpání)
- příznaky podobné chřipce (bolest kloubů a svalů s horečkou)

Pokud zaznamenáte některý z těchto příznaků, okamžitě to sdělte svému lékaři. Máte-li jakékoli otázky týkající se Vaší léčby, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Karta pacienta

SK

Macitentan Teva 10 mg

filmom obalené tablety

macitentan

Karta pacienta

CZ

Macitentan Teva 10 mg

potahované tablety

macitentan

Karta pacienta

SK

Táto karta obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, o ktorých musíte byť oboznámený pred liečbou Macitentanom Teva. Noste túto kartu vždy so sebou a ukážte ju každému lekárovi, ktorý sa podieľa na vašej zdravotnej starostlivosti.

Macitentan Teva 10 mg filmom obalené tablety

macitentan

Je dôležité, aby ste počas liečby liekom Macitentan Teva okamžite hlásili každé tehotenstvo alebo vedľajší účinok svojmu lekárovi, ktorý vám tento liek predpísal.

Liečebné centrum: _____

Meno predpisujúceho lekára: _____

Telefónne číslo predpisujúceho lekára: _____

Tehotenstvo

Macitentan Teva môže poškodiť vývoj plodu. Preto nesmiete užívať Macitentan Teva, ak ste tehotná a tiež nesmiete otehotnieť, ak užívate Macitentan Teva. Taktiež, ak máte pľúcnu artériovú hypertenziu, tehotenstvo môže vážne zhoršiť príznaky vašej choroby.

Antikoncepcia

Počas liečby Macitentanom Teva potrebujete používať spoľahlivý spôsob antikoncepcie. S každou otázkou sa neváhajte obrátiť na svojho lekára.

Pred začiatkom liečby Macitentanom Teva a každý nasledujúci mesiac si počas liečby musíte urobiť tehotenský test, a to aj vtedy, ak si myslíte, že nie ste tehotná.

Podobne ako ostatné lieky z tejto skupiny, Macitentan Teva môže mať vplyv na pečeň. Pred začiatkom liečby a počas liečby Macitentanom Teva vám váš lekár vykoná krvné testy, aby zistil či vaša pečeň pracuje správne.

Prejavy toho, že vaša pečeň nepracuje správne, môžu byť:

- nevoľnosť (nutkanie na vracanie)
- vracanie
- horúčka (vysoká telesná teplota)
- bolesti žalúdka (brucha)
- žltáčka (žltnutie kože a očných bielkov)
- tmavý moč
- svrbenie kože
- letargia alebo únava (neobvyklá únava alebo vyčerpanie)
- syndróm podobný chrípke (bolesti kĺbov, svalov, horúčka)

Ak spozorujete ktorýkoľvek z týchto prejavov, okamžite informujte svojho lekára. Ak máte akékoľvek otázky o vašej liečbe, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika.