



<p>Jméno pacienta:</p> <p>Jméno lékaře:</p> <p>Telefonní číslo lékaře:</p> <p>Datum zahájení léčby přípravkem Remsima:</p> <p>Aktuální podání přípravku:</p>	<p>Dbejte prosím na to, abyste při každé návštěvě zdravotnického pracovníka měl(a) u sebe seznam všech ostatních léků, které užíváte.</p> <p>Seznam ostatních léků:</p> <p>Seznam alergií:</p> <p> LM271107-PA001</p>	<p>Požádejte svého lékaře, aby níže vyplnil typ a datum posledního (posledních) vyšetření na tuberkulózu (TBC):</p> <p>Vyšetření:</p> <p>Datum:</p> <p>Výsledek:</p> <p>Je důležité, abyste spolu s Vaším lékařem zaznamenali název léčivého přípravku a číslo šarže Vašeho léku.</p> <p>Název přípravku:</p> <p>Číslo šarže:</p>	<p>Karta pacienta</p> <p>CS SK</p> <p>Remsima[®] infiximab</p> <p>Ukažte tuto kartu každému lékaři, který Vás léčí.</p> <p>Meno pacienta:</p> <p>Meno lékaře:</p> <p>Telefonní číslo lékaře:</p> <p>Datum začatia liečby Remsimou:</p> <p>Terajšie podania:</p> <p> LM271107-PA001</p>
			<p>Uistite sa, prosím, že pri každej návšteve akéhokolvek zdravotníckeho pracovníka máte pri sebe aj zoznam všetkých ďalších liekov, ktoré užívate.</p> <p>Zoznam ďalších liekov:</p> <p>Zoznam alergií:</p> <p>Požiadajte svojho lekára, aby sem zaznamenal typ a dátum posledného vyšetrenia (vyšetrení) na tuberkulózu (TBC):</p> <p>Vyšetrenie:</p> <p>Dátum:</p> <p>Výsledok:</p> <p>Je dôležité aby ste vy a váš lekár zaznamenali názov a číslo šarže vášho lieku.</p> <p>Obchodný názov:</p> <p>Číslo šarže:</p>

Unit(mm)

62

- Pantone 361 C
- Pantone 7496 C
- Pantone 186 C
- Black

Fold	Fold	Fold	Fold	Fold	Fold	Fold	
<p>Táto karta s pripomienkami pre pacienta obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, o ktorej potrebujete vedieť pred a počas liečby Remsimou.</p> <p>Keď začnete používať novú kartu, túto si, prosím, uchovajte 4 mesiace od svojej poslednej dávky Remsimy ako referenciu.</p> <p>Predtým, ako začnete používať tento liek, si pozorne prečítajte „Písomnú informáciu pre používateľov“ lieku Remsima.</p> <p>Túto kartu majte stále pri sebe až 4 mesiace po vašej poslednej dávke Remsimy, alebo v prípade tehotenstva počas 12 mesiacov po narodení vášho dieťaťa. Vedľajšie účinky sa môžu objaviť po dlhom čase od vašej poslednej dávky.</p>	<p> Infekcie </p> <p>Pred liečbou Remsimou</p> <ul style="list-style-type: none"> • Povedzte svojmu lekárovi, ak máte infekciu, aj keď je veľmi slabá. • Je veľmi dôležité, aby ste vášmu lekárovi povedali, ak ste v minulosti mali tuberkulózu TBC alebo ak ste boli v blízkom kontakte s niekým, kto TBC mal. Váš lekár vás vyšetří, aby zistil, či máte TBC. Požiadajte svojho lekára, aby zaznamenal typ a dátum posledného vyšetrenia (vyšetrení) na TBC do karty. • Povedzte svojmu lekárovi, ak máte hepatitídu B alebo ak ste nositeľom alebo máte podozrenie, že ste nositeľom vírusu hepatitídy B. 	<p>Počas liečby Remsimou</p> <ul style="list-style-type: none"> • Okamžite povedzte svojmu lekárovi, ak máte prejavy infekcie. Prejavy zahŕňajú horúčku, pocit únavy, (pretrvávajúci) kašeľ, dýchavičnosť, chudnutie, nočné potenie, hnačku, rany, problémy so zubami, pálenie pri močení alebo prejavy podobné chrípke. <p> Tehotenstvo, dojčenie a očkovania</p> <ul style="list-style-type: none"> • V prípade že ste dostali Remsimu počas tehotenstva alebo ak dojčíte, je dôležité aby ste o tom informovali lekára vášho dieťaťa predtým, ako vaše dieťa dostane akúkoľvek vakcínu. Vaše dieťa nesmie dostať „živú vakcínu“, ako je BCG (používa sa na prevenciu tuberkulózy), 	<p>počas 12 mesiacov po narodení alebo kým dojčíte, pokiaľ lekár vášho dieťaťa neodporučí inak.</p> <p> Dedičná fruktózová intolerancia</p> <ul style="list-style-type: none"> • Koncentrát Remsima 100 mg a 350 mg na infúziu roztok obsahuje sorbitol. Ak máte dedičnú fruktózovú intoleranciu (HFI), <u>nesmiete</u> používať túto intravenózne podávanú liekovú formu. • Informujte svojho lekára, ak máte dedičnú fruktózovú intoleranciu. V takom prípade sú k dispozícii iné vhodné intravenózne liekové formy infiximabu. 	<p>Táto karta pacienta obsahuje dôležité informácie o bezpečnosti, ktoré je treba znáť pred zahájením a v průběhu léčby přípravkem Remsima.</p> <p>Po obdržení nové karty si tuto kartu prosím uschovejte pro případné nahlédnutí po dobu 4 měsíců od Vaší poslední dávky přípravku Remsima.</p> <p>Před tím, než začnete tento lék používat, si prosím pečlivě přečtěte příbalovou informaci přípravku Remsima.</p> <p>Noste tuto kartu u sebe po dobu 4 měsíců po podání poslední dávky přípravku Remsima, nebo v případě těhotenství po dobu 12 měsíců po narození Vašeho dítěte. Nežádoucí účinky se mohou objevit za dlouhou dobu po poslední dávce přípravku.</p>	<p> Infekce </p> <p>Před zahájením léčby přípravkem Remsima</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informujte svého lékaře, pokud trpíte nějakou infekcí, i kdyby se jednalo o velmi mírnou infekci. • Je velmi důležité sdělit svému lékaři, pokud jste někdy měl(a) tuberkulózu (TBC) nebo byl(a) v blízkém kontaktu s někým, kdo měl TBC. Váš lékař Vás vyšetří, zda netrpíte TBC. Požádejte svého lékaře, aby vyplnil typ a datum posledního (posledních) vyšetření na TBC do této karty. • Sdělte svému lékaři, pokud trpíte hepatitidou B nebo zda víte, či máte podezření, že jste přenašečem viru hepatitidy B. 	<p>Během léčby přípravkem Remsima</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jestliže se u Vás objeví příznaky infekce, oznamte to neprodleně svému lékaři. Mezi tyto příznaky patří horečka, únava, (pretrvávající) kašeľ, dušnosť, úbytek tělesné hmotnosti, noční pocení, průjem, rány, problémy se zuby, pálení při močení nebo chrípkové príznaky. <p> Tehotenství, kojení a očkování</p> <ul style="list-style-type: none"> • V případě, že Vám byl přípravek Remsima podán během těhotenství, nebo v období, kdy kojíte, je důležité, abyste o tom informovala dětského lékaře předtím, než Vaše dítě dostane jakoukoli očkovací látku. Vaše dítě nesmí být očkováno 	<p>„živou vakcínou“, jako je BCG (používaná k prevenci tuberkulózy) během 12 měsíců po narození nebo během období, kdy kojíte, pokud dětský lékař nedoporučí jinak.</p> <p> Hereditární intolerancie fruktózy</p> <ul style="list-style-type: none"> • Remsima 100 mg a 350 mg koncentrát pro infúziu roztok obsahuje sorbitol. Pokud máte hereditární intolerancie fruktózy (HFI), <u>nesmí</u> Vám být podán intravenózně. • Informujte svého lékaře, pokud máte hereditární intolerancie fruktózy. V takovém případě jsou k dispozici jiné vhodné přípravky intravenózního infiximabu.

Perforation