

Formulár o ukončení liečby liekom Tysabri

Tento formulár obsahuje informácie o rizikách, ktoré si máte pozorne prečítať pred ukončením liečby liekom Tysabri. Postupujte podľa pokynov v tomto formulári, aby ste boli úplne informovaní a pochopili riziko PML (progresívnej multifokálnej leukoencefalopatie) pretrvávajúce ešte 6 mesiacov po ukončení liečby liekom Tysabri.

Pred začatím liečby liekom Tysabri ste mali dostať od vášho lekára Kartú pacienta. Túto Kartú pacienta uchováajte 6 mesiacov po ukončení liečby, pretože obsahuje pre vás dôležité informácie o PML.

PML je menej častá infekcia mozgu, ktorá sa vyskytla u pacientov liečených liekom Tysabri, a ktorá môže spôsobiť závažné postihnutie alebo smrť. PML bola hlásená do 6 mesiacov po ukončení liečby liekom Tysabri.

Medzi prejavy patria:

- psychické zmeny a zmeny sústredenia,
- zmeny správania,
- slabosť na jednej strane tela,
- problémy so zrakom,
- nové príznaky súvisiace s mozgom alebo nervovým systémom, ktoré sú pre vás nezvyčajné.

Príznaky PML môžu byť podobné relapsu roztrúsenej sklerózy. Preto, ak si myslíte, že sa vám roztrúsená skleróza zhoršuje, alebo ak ste si všimli akékoľvek nové príznaky do 6 mesiacov po ukončení liečby liekom Tysabri, je veľmi dôležité, aby ste o tom čo najskôr informovali lekára.

V priebehu 6 mesiacov po ukončení liečby liekom Tysabri vás lekár bude sledovať a rozhodne, kedy máte absolvovať vyšetrenie MR (magnetická rezonancia). Vo všeobecnosti, vyšetrenie MR budete naďalej absolvovať každých 3 – 6 mesiacov, ak máte jednu z nasledujúcich kombinácií rizikových faktorov pre PML:

- Máte protilátky proti JC vírusu, ste liečený liekom Tysabri viac ako 2 roky a kedykoľvek pred začatím liečby liekom Tysabri ste užívali imunosupresívum (liek, ktorý znižuje aktivitu imunitného systému vášho tela).
- Pred začatím liečby liekom Tysabri ste nikdy nedostávali imunosupresívnu liečbu, ale ste liečený liekom Tysabri viac ako 2 roky a máte vysoký index protilátok proti JC vírusu (zvýšené množstvo protilátok v krvi).

Ak nepatríte ani do jednej z uvedených skupín, budete naďalej absolvovať bežné vyšetrenia MR, ako určí váš lekár.

Ak máte v súvislosti s uvedenými informáciami nejaké otázky, obráťte sa na svojho lekára.

Ak nemáte Kartú pacienta, ktorú ste dostali na začiatku liečby liekom Tysabri, požiadajte svojho lekára o novú kartu. Kartú pacienta majte pri sebe, aby ste si mohli pripomenúť dôležité informácie o bezpečnosti, najmä príznaky, ktoré sa môžu u vás rozvinúť a ktoré by mohli naznačovať PML. Ak je to vhodné, Kartú pacienta ukážte vášmu partnerovi alebo opatrovateľovi.

Meno pacienta: Podpis: Dátum podpisu pacienta:

Meno lekára: Podpis: Dátum podpisu lekára:

Hlásenie podozrení na vedľajšie účinky

Ak máte podozrenie, že sa u vás vyskytol akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára, lekárnika alebo zdravotnú sestru. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v Písomnej informácii pre používateľa.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj sami priamo na:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Sekcia vigilancie

Kvetná 11, 825 08 Bratislava

tel.: + 421 2 507 01 206

e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk

Tlačivo na hlásenie podozrenia na vedľajší účinok lieku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/Hlásenie podozrení na nežiaduce účinky liekov. Formulár na elektronické podávanie hlásení: <https://portal.sukl.sk/eskadra/>.

Hlásením podozrení na vedľajšie účinky môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti tohto lieku.

V hlásení, prosím, uveďte aj názov lieku a číslo šarže, ktorá vám bola podaná, ak ho máte k dispozícii.

Podozrenia na vedľajšie účinky môžete hlásiť aj spoločnosti Biogen Slovakia s.r.o., e-mail: sk-safety@biogen.com

Dátum schválenia ŠÚKL: júl 2026