Meno lekára:

.....

Telefónne číslo lekára:

.....

MEDOCHEMIE

06 2026

MEDOCHEMIE

**KARTA PACIENTA**

# XALPEBON 2,5 mg
filmom obalené tablety
(apixabán)

# XALPEBON 5 mg
filmom obalené tablety
(apixabán)

- **Túto kartu máte / má dieťa / má opatrovateľ nosiť vždy so sebou.**
- **Ukážte túto kartu lekárnikovi, zubárovi alebo inému zdravotníckemu pracovníkovi pred ošetrením.**

## Informácie pre pacientov/opatrovateľov

- XALPEBON užívajte/podávajte pravidelne podľa pokynov. Ak vynecháte rannú dávku, užite/podajte ju ihneď, ako si na to spomeniete a môžete ju užiť/podať aj spolu s večernou dávkou. Vynechanú večernú dávku môžete užiť/podať len v ten istý večer. Nasledujúce ráno neužívajte/nepodávajte dve dávky, ale pokračujte podľa dávkovacej schémy dvakrát denne v súlade s odporúčaním.
- Neprestaňte užívať/podávať XALPEBON, ak sa najprv neporadíte s lekárom, pretože u vás/pacienta existuje riziko vzniku cievnej mozgovej príhody/krvnej zrazeniny alebo iných komplikácií.
- XALPEBON pomáha riediť krv. To však môže zvýšiť riziko krvácania.
- Prejavy a príznaky krvácania zahŕňajú tvorbu modrín a krvácanie pod kožou, dechtové sfarbenie stolice, krv v moči, krvácanie z nosa, závrat, únavu, bledosť alebo slabosť, náhlu silnú bolesť hlavy, vykašliavanie krvi alebo vracanie krvi.
- Ak sa krvácanie samo nezastaví, **okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.**

- Ak potrebujete/pacient potrebuje operáciu alebo akýkoľvek invazívny zákrok, informujte lekára, že užívate/pacient užíva XALPEBON.

## Informácie pre zdravotníckych pracovníkov

- XALPEBON (apixabán) je perorálne antikoagulancium, ktoré pôsobí priamou selektívnou inhibíciou faktora Xa.
- XALPEBON môže zvýšiť riziko krvácania. V prípade závažných krvácavých príhod sa má liečba okamžite ukončiť.
- Liečba liekom XALPEBON si nevyžaduje rutinné sledovanie expozície. Vo výnimočných situáciach môže byť prospešné kalibrované kvantitatívne stanovenie anti-faktora Xa, napr. pri predávkovaní alebo urgentnom chirurgickom zákroku (protrombínový čas (PT), medzinárodný normalizovaný pomer (INR) a aktivovaný parciálny tromboplastínový čas (aPTT) sa neodporúčajú sledovať) - pozri Súhrn charakteristických vlastností lieku.
- Pre dospelých je k dispozícii účinná látka na zvrátenie účinku apixabánu pôsobiaceho proti faktoru Xa, avšak jej bezpečnosť a účinnosť neboli stanovené u pediatrických pacientov (pozri Súhrn charakteristických vlastností lieku pre andexanet alfa).

CODE.....

**Užívam antikoagulačnú liečbu, liek XALPEBON (apixabán), na zabránenie tvorby krvných zrazenín.**
**Vyplňte nasledujúcu časť alebo o to požiadajte lekára**

Meno:.....

Dátum narodenia:.....

Indikácia:.....

.....

.....

.....

.....

Hmotnosť:.....

Dávka:.....mg dvakrát denne