

Karta pacienta

Xiltess® 2,5 mg ☐ (políčko na zaškrtnutie predpísanej dávky)

Xiltess® 10 mg ☐ (políčko na zaškrtnutie predpísanej dávky)

Xiltess® 15 mg ☐ (políčko na zaškrtnutie predpísanej dávky)

Xiltess® 20 mg ☐ (políčko na zaškrtnutie predpísanej dávky)

8854052A

- Túto kartu noste vždy so sebou
- Túto kartu ukážte pred liečbou každému lekárovi alebo zubárovi

Užívam antikoagulačnú liečbu Xiltessom (rivaroxabán)

Meno:

Adresa:

Dátum narodenia:

Hmotnosť:

Iné lieky/ochorenia

V naliehavom prípade, prosím, kontaktujte:

Meno lekára:

Telefón lekára:

Pečiatka lekára:

Informujte, prosím, aj:

Meno:

Telefón:

Vzťah k pacientovi:

Informácia pre zdravotníckych pracovníkov:

- Hodnoty INR sa nemajú používať, keďže nie sú spoľahlivé na meranie antikoagulačnej aktivity Xiltessu.

Čo mám vedieť o Xiltesse?

- Xiltess zriedi krv, čím u vás zabraňuje vzniku nebezpečných krvných zrazenín.
- Xiltess sa musí užívať presne podľa predpisu lekára. Na zabezpečenie optimálnej ochrany pred vznikom krvných zrazenín, **nikdy nevynechajte dávku.**

- Xiltess nesmiete prestať užívať bez toho, aby ste sa najprv neporadili so svojím lekárom, pretože riziko vzniku krvných zrazenín sa môže zvýšiť.
- Predtým ako začnete užívať Xiltess, povedzte svojmu lekárovi o všetkých ostatných liekoch, ktoré práve užívate, ktoré ste ešte nedávno užívali alebo ktoré sa chystáte užívať.
- Pred akýmkoľvek chirurgickým alebo invazívnym zákrokom povedzte svojmu lekárovi, že užívate Xiltess.

Kedy mám vyhľadať pomoc môjho lekára?

Keď užívate lieky na riedenie krvi, ako je Xiltess, je dôležité, aby ste si boli vedomý možných vedľajších účinkov týchto liekov. Najčastejším vedľajším účinkom je krvácanie. Ak viete, že je u vás riziko krvácania, nezačnite užívať Xiltess bez toho, aby ste to najprv neprediskutovali so svojím lekárom. Okamžite informujte lekára, ak máte akékoľvek prejavy alebo príznaky krvácania, ako sú nasledujúce:

- bolesť,
- opuch alebo zdravotné ťažkosti,
- bolesť hlavy, závrat alebo slabosť,
- nezvyčajná tvorba podliatin, krvácanie z nosa, krvácanie z ďasien, rezné rany, ktoré vyžadujú dlhší čas na zastavenie krvácania,
- menštruačné krvácanie alebo krvácanie z pošvy, ktoré je silnejšie než zvyčajne,
- krv v moči, ktorý môže mať ružové alebo hnedé sfarbenie, červená alebo čierna stolica,
- vykašliavanie krvi, alebo vracanie krvi či hmoty, ktorá vyzerá ako kávová usadenina.

Ako mám Xiltess užívať?

- Na zabezpečenie optimálnej ochrany, Xiltess:
 - 2,5 mg sa má užívať s jedlom alebo bez jedla
 - 10 mg sa má užívať s jedlom alebo bez jedla
 - 15 mg sa musí užívať s jedlom
 - 20 mg sa musí užívať s jedlom